








## Actions ciblées pour **réduire le nombre de nouvelles infections**

Le plus grand défi lié à la fourniture de services essentiels de prévention, de dépistage et de traitement consiste à atteindre les groupes marginalisés qui sont exposés à un risque élevé d'infection à VIH, mais se heurtent souvent à des barrières légales, sociales ou financières qui les empêchent d'accéder aux services de traitement du VIH. La stigmatisation et la discrimination peuvent entraver la prestation de services de prévention, de dépistage et de traitement du VIH pour ceux qui en ont besoin.

Garantir l'accès à ces services à une échelle appropriée requiert :

-  de s'engager à sauver la vie des individus et à réaliser les cibles mondiales
-  de faire tomber les barrières légales, politiques et de mise en œuvre qui empêchent les individus d'accéder aux services de traitement du VIH
-  de connaître l'épidémie et d'identifier les groupes de population les plus affectés
-  de comprendre les besoins des groupes les plus affectés afin de leur offrir les services dont ils ont besoin
-  de concentrer les ressources sur les services de prévention, de dépistage et de traitement du VIH pour les groupes les plus affectés
-  d'élaborer des approches adaptées aux besoins des groupes les plus affectés
-  de garantir la participation des communautés et de la société civile pour dépasser ces barrières.

WHO-EM/STD/199/F Conception graphique : Pledge Communications



## Journée mondiale du sida 2018

[www.emro.who.int/fr/wad2018/](http://www.emro.who.int/fr/wad2018/)  
f WHOEMRO @WHOEMRO  
#StopHIV

 Organisation mondiale de la Santé  
BUREAU RÉGIONAL DE LA Méditerranée orientale



**Halte**  
aux nouvelles infections  
par le VIH **maintenant !**

## Le VIH dans la Région de la Méditerranée orientale en 2017

**0,1 %** : valeur seuil de la prévalence du VIH

**350 000** personnes vivant avec le VIH

**12 000** enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH

**36 000** nouvelles infections

**16 000** personnes décédées du fait du VIH

**64 900** personnes bénéficiant du traitement antirétrovira

### Comparé à 2010

**28 %** d'augmentation du taux de nouvelles infections

**31 %** d'augmentation du nombre de décès dus au VIH

**8 %** d'augmentation de la couverture par le traitement antirétroviral

**44 %** d'augmentation du nombre d'enfants vivant avec le VIH

## Cibles mondiales 2020 : atteindre les trois 90

**90%**

des personnes vivant avec le VIH savent qu'elles sont infectées


**90%**

des personnes qui vivent avec le VIH et savent qu'elles sont infectées bénéficient du traitement antirétroviral

**90%**

des personnes vivant avec le VIH et bénéficiant du traitement antirétroviral présentent une suppression de la charge virale

### Progrès au niveau régional



**34 %** des personnes vivant avec le VIH savent qu'elles sont infectées

Sur ce nombre, **53 %** bénéficient du traitement antirétroviral

Sur ce nombre, **80 %** des patients présentent une suppression de la charge virale

### Prévenir

Prévenir la transmission du VIH signifie limiter l'exposition des individus non infectés au virus. Ceci peut être atteint au moyen des interventions suivantes :

- Méthodes de prévention traditionnelles, notamment l'utilisation du préservatif et les services de réduction des effets nocifs pour les personnes qui s'injectent des drogues
- Utilisation des médicaments antirétroviraux pour le traitement des femmes enceintes vivant avec le VIH de façon à prévenir la transmission de la mère à son bébé
- Élimination du virus à l'aide du traitement antirétroviral, et ainsi diminution drastique de la probabilité de transmettre le virus à d'autres individus ; le traitement de toutes les personnes vivant avec le VIH est de fait une stratégie de prévention efficace
- Prophylaxie préexposition
- Prophylaxie postexposition.

### Dépister

Le dépistage est la première étape de la prévention de l'infection à VIH ou du traitement de cette infection. Le dépistage du VIH peut être effectué :

- dans des établissements de santé existants tels que les cliniques de soins prénatals, les services pour la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles, les centres de lutte antituberculeuse et les prisons
- en milieu communautaire par des agents non médicaux tels que les pairs, les agents communautaires, les membres des unités mobiles ou les partenaires sexuels
- à domicile à l'aide de tests d'autodépistage.

### Traiter

Le traitement antirétroviral pour les personnes vivant avec le VIH réduit le virus à un niveau indétectable. Grâce au traitement antirétroviral, les personnes vivant avec le VIH peuvent mener une vie normale tout comme leurs pairs non infectés.

Prévenir  
Dépister  
Traiter

