

معلومات يجب أن يعرفها العاملون في مجال الرعاية الصحية عن فيروس



العلامات والأعراض

فيما يلي العلامات والأعراض الأكثر شيوعاً:



- الطفح الجلدي
- الحمى الخفيفة
- التهاب الملتحمة
- ألم وتورم المفاصل
- ألم العضلات

تتراوح فترة المرض بين يومين و 7 أيام.

انتقال الفيروس




- ينتقل الفيروس عن طريق البعوض الزاعج المصاب بالعدوى
- ينقل البعوض الزاعج أيضاً حمى الضنك والشيكونغونيا والحمى الصفراء
- عن طريق ممارسة الجنس
- ينتقل الفيروس من الأم إلى الجنين

العلاج

- لا يوجد حالياً لقاح مضاد لمرض فيروس زيكا.
- يمكن علاج حالات العدوى المتوسطة والمحدودة عن طريق الراحة وتناول السوائل ومسكنات الآلام.

المضاعفات المحتملة



- صغر حجم الرأس
- متلازمة غيان - باريه
- إصابة الأجنة باضطرابات عصبية

الإجراء المطلوب اتخاذه عند الاشتباه في الإصابة بفيروس زيكا



- سؤال المريض إذا كان قد سافر إلى منطقة ينتشر فيها فيروس زيكا في الوقت الحالي.
- تدوين الرد في الملاحظات الخاصة بالمريض.
- علاج المريض.
- إخطار المسؤول المعني بتصدد الأمراض خلال 24 ساعة.

التشخيص

- يمكن تأكيد التشخيص عن طريق الاختبارات المخبرية للكشف عن الحمض النووي الريبي (RNA) أو أجسام مضادة محددة لفيروس زيكا في الدم.

الوقاية

- الحماية من لدغات البعوض.
- اتخاذ التدابير الخاصة بمكافحة النواقل.

