



اَخْبُوْخ

بوسعك حماية نفسك وأسرتك ومجتمعك

WHO-EM/CSR/081/A



تعرف أكثر على المرض:

١. تبلغ مدة الحضانة أو المدة الفاصلة بين الإصابة بالعدوى وبين ظهور الأعراض يومين إلى ٢١ يوماً

٢. تنتشر الإيبولا عبر الاتصال بسوائل الجسم :




النزيف



عدم الاستجابة
للعلاج



حمى



تأكد من حصولك على التدريب
اللازم على الاستخدام السليم
لمعدات الوقاية الشخصية



على العاملين الصحيين ارتداء
معدات الوقاية الشخصية كاملة
أثناء تعاملهم مع الحالات المشتبه بها



تخلص من معدات الوقاية
الشخصية بطريقة صحيحة
أو طهرها بعد الاستعمال

لا يكون السائحون والمسافرون المنتظمون عرضة لخطر أعلى للإصابة إلا عند الاتصال
المباشر مع المصابين بالإيبولا

٣. الأعراض الشائعة:



صداع

حمى مرتفعة
مفاجئة



القيء



إعياء شديد



قيء



فقدان
الشهية



إسهال



آلام في الجسم



اللعاب



الدم



البراز



البول