




MMWRTM

التقرير الأسبوعي عن المراضة والوفيات

www.cdc.gov/mmwr

ملخصات الترصد

الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب
2007-2000



التقرير الأسبوعي عن المراضة والوفيات

www.cdc.gov/mmwr

ملخصات الترصد

الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب 2007-2000

قسم الصحة والخدمات الإنسانية
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها

© منظمة الصحة العالمية، 2008

جميع الحقوق محفوظة.

جميع الحقوق محفوظة.

إن التسميات المستخدمة في هذه المنشورة، وطريقة عرض المواد الواردة فيها، لا تعبر عن رأي الأمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني لأي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة على الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل عليها.

كما أن ذكر شركات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات أو الجهات معتمدة، أو موصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، تفضيلاً لها على سواها مما يمثلها ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، تميز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بوضع خط تحتها.

ويمكن الحصول على منشورات منظمة الصحة العالمية من إدارة التسويق والتوزيع، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ص. ب. (7608)، مدينة نصر، القاهرة 11371، مصر (هاتف رقم: +202 670 2535؛ فاكس رقم: +202 670 2492؛ عنوان البريد الإلكتروني: dsa@emro.who.int). وينبغي توجيه طلبات الحصول على الإذن باستنساخ أو ترجمة منشورات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، سواء أجزاء منها أو المنشورات كاملة: سواء كان ذلك لأغراض بيعها أو توزيعها توزيعاً غير تجاري إلى منسق إدارة المعلومات وتبادلها، على العنوان المذكور أعلاه (فاكس رقم: +202 2276 5400؛ عنوان البريد الإلكتروني: hit@emro.who.int).

تمت الطباعة في منظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

الوثيقة رقم WHO-EM/TFI/045/A/U/05.08/500

تنشر مطبوعات سلسلة "التقرير الأسبوعي عن المراضة والوفيات" من قبل مركز التنسيق للمعلومات والخدمات الصحية في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية، أطلنطا، جورجيا 30333.

مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها

جولي غيريردنج MD, MPH

المدير

تانيا بوبوفيتش MD, PhD

المسؤول العلمي الأول

جيمس سنيفس PhD

المدير المساعد للعلوم

ستيفن سولومون MD

مدير مركز تنسيق المعلومات والخدمات الصحية

ماي بيرنهارت PhD, MPh

مدير المركز الوطني للتسويق الصحي

كاترين دانييل PhD

نائب مدير المركز الوطني للتسويق الصحي

فريق التحرير والإنتاج

فريدريك شو MD, JD

رئيس التحرير لسلسلة التقرير الأسبوعي عن المراضة والوفيات

سوزان هيوت MPA

مدير تحرير سلسلة التقرير الأسبوعي عن المراضة والوفيات

تيريزا رتلدج

رئيسة المحررين والكتاب التقنيين

ديفيد جونسون

محرر المشروع

بيفرلي هولاند

كبير اختصاصيي المعلومات المرئية

ليندا كوبل

ماليبا لايت

اختصاصيا المعلومات المرتبة
كرانغ دوران MBA
إيريك شيفر
اختصاصيا تكنولوجيا المعلومات

هيئة التحرير

William L. Roper, MD, MPH, Chapel Hill, NC, Chairman
Virginia A. Caine, MD, Indianapolis, IN
David W. Fleming, MD, Seattle, WA
William E. Halperin, MD, DrPH, MPH, Newark, NJ
Margaret A. Hamburg, MD, Washington, DC
King K. Holmes, MD, PhD, Seattle, WA
Deborah Holtzman, PhD, Atlanta, GA
John K. Iglehart, Bethesda, MD
Dennis G. Maki, MD, Madison, WI
Sue Mallonee, MPH, Oklahoma City, OK
Stanley A. Plotkin, MD, Doylestown, PA
Patricia Quinlisk, MD, MPH, Des Moines, IA
Patrick L. Remington, MD, MPH, Madison, WI
Barbara K. Rimer, DrPH, Chapel Hill, NC
John V. Rullan, MD, MPH, San Juan, PR
Anne Schuchat, MD, Atlanta, GA
Dixie E. Snider, MD, MPH, Atlanta, GA
.John W. Ward, MD, Atlanta, GA

المحتويات

10		المقدمة
11		طرائق العمل
15		النتائج
20		المناقشة
23		الحدود
24		الخاتمة
25		المراجع
26		الجداول
50		الملاحق

الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب 2007-2000

د. تشارلز وارن⁽¹⁾، د. ناثان جونز⁽¹⁾، د. أرماندو بيروغا⁽²⁾، د. جيمس شوفان⁽³⁾، د. جان بيير بابتيست⁽⁴⁾،
د. فيراكوستادي سيلفا⁽⁵⁾، د. فاطمة العوا⁽⁶⁾، د. آغيس تسوروس⁽⁷⁾، د. خليل رحمن⁽⁸⁾، د. فيرك فيشبورن⁽⁹⁾،
د. دوغلاس بتشر⁽²⁾، د. سميرة أسما⁽¹⁾

(1) مكتب التدخين والصحة، المركز الوطني للوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز الصحة: مراكز مكافحة الأمراض
والوقاية منها

(2) مبادرة التحرر من التبغ، منظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرة

(3) رابطة الصحة العمومية الكندية، أوتاوا، كندا

(4) المكتب الإقليمي الإفريقي، منظمة الصحة العالمية، برزافيل، الكونغو

(5) إقليم الأمريكتين، منظمة الصحة العالمية، واشنطن

(6) المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، منظمة الصحة العالمية، القاهرة، مصر

(7) المكتب الإقليمي الأوربي، منظمة الصحة العالمية، كوبنهاغن، الدانمارك

(8) المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا، منظمة الصحة العالمية، مانيلا، الفلبين

ملخص

المشكلة: إن تعاطي التبغ هو من المسببات الرئيسية للوفاة من الأمراض المزمنة. وتشير النتائج التي انتهت إليها الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب، إلى أن احتمال تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن التدخين (من خمسة ملايين وفاة سنوياً إلى قرابة عشرة ملايين بحلول عام ألفين وعشرين) قد يكون تقديراً بخساً للواقع المنتظر، وذلك بسبب تزايد التدخين بين الفتيات بالمقارنة مع الإناث البالغات، وتزايد الاستعداد لمقارفة التدخين بين الذين لم يسبق لهم التدخين من قبل، وارتفاع مستويات التعرض للتدخين من الدرجة الثانية، والإعلان المحبّب بالتدخين بصورة غير مباشرة.

الفترة التي يغطيها التقرير: يتضمن هذا التقرير معطيات الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب والتي تم جمعها خلال الفترة بين عامي 2000 و 2007 من مئة وأربعين بلداً عضواً في منظمة الصحة العالمية؛ ومن ست مناطق أخرى هي: (ساموا الأمريكية، والجزر العذراء البريطانية، ومونتسيرات، وبورتوريكو، والجزر العذراء التابعة للولايات المتحدة الأمريكية)؛ ومن إقليمين جغرافيين هما: قطاع غزة والضفة الغربية؛ ومن إقليم كوسوفو الذي تديره الأمم المتحدة؛ ومن إقليم إداري خاص هو إقليم (ماكاو)؛ ومن إحدى مناطق الكومنولث هي (جزر ماريانا الشمالية). أما بالنسبة للبلدان التي تكرر فيها تقرير الترصد العالمي لانتشار التبغ بين الشباب، فلم يضمن في التقرير سوى أحدث المعطيات؛ وأما بالنسبة للبلدان التي أقيمت فيها مواقع متعددة للمسح أو الترصد، فقد اقتصر الأمر على المعطيات المأخوذة من العاصمة أو أكبر مدن البلاد.

وصف النظام: إن الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب هو عبارة عن عملية مسح تركز على المدرسة وتتناول إقليمياً جغرافياً محدداً، يمكن أن يكون بلداً، أو إقليمياً، أو مدينة، أو أي كيان جغرافي آخر. وتستخدم في عملية الترصد هذه منهجية معيارية يتم بمقتضاها وضع أطر محددة للاعتيان (أخذ العينات)، واختيار مدارس و صفوف بعينها، وإعداد الاستبيانات اللازمة، وتنفيذ الإجراءات الميدانية، ومعالجة المعطيات. والمنهجية المعيارية للاعتيان في عملية الترصد تستخدم نظاماً ذا مرحلتين يوفر عينات من الطلاب في السنوات الدراسية التي تخص التلاميذ بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة من العمر. ويتضمن كل من أطر الاعتيان هذه كل المدارس (العامة منها والخاصة) في منطقة محددة جغرافياً تحتوي على الفصول أو السنوات الدراسية المقصودة. ويكون احتمال اختيار المدارس في المرحلة الأولى رهناً بعدد الطلاب المسجلين في السنوات الدراسية المحددة، أما في المرحلة الثانية من عملية الاعتيان فيتم اختيار الصفوف من المدرسة المختارة، بصورة عشوائية. وكافة طلاب الصفوف المختارة الحاضرين في المدرسة يوم إجراء عملية المسح، مؤهلون للمشاركة في هذه العملية. ومشاركة الطلاب هذه هي مشاركة تطوعية وغُفِّل من الأسماء. تستخدم فيها إجراءات شخصية لجمع المعطيات. ونظام الاعتيان المعتمد في عملية الترصد يوفر لنا تقديرات مستقلة عبر القطاعات تمثل كل موقع على حدة.

النتائج: تشير الوقائع التي انتهى إليها هذا التقرير إلى أن مستوى تدخين السجائر بين الصبيان والبنات متماثل في مواقع كثيرة؛ وكذلك فإن انتشار تدخين السجائر مع استعمال منتجات تبغ أخرى متماثل أيضاً؛ ثم إن الاستعداد لبدء ممارسة التدخين في أوساط الذين لم يسبق لهم التدخين من قبل متماثل بين الصبيان والبنات، وهو أعلى من مستوى انتشار تدخين السجائر في معظم المواقع. وقد ذكر قرابة نصف الطلاب أنه سبق لهم التعرض للدخان المنبعث من تدخين الآخرين في الأماكن العامة خلال الأسبوع السابق لعملية المسح. ويفضل ثمانية من كل عشرة تقريباً فرض حظر على التدخين في الأماكن العامة. ويمتلك اثنان من كل عشرة طلاب تقريباً أداة عليها شعار أحد أنواع السجائر، كما أن واحداً من كل عشرة طلاب قد عرضت عليه سجائر مجانية من قبل أحد ممثلي شركات التبغ. وذكر سبعة من كل عشرة طلاب مدخنين تقريباً أنهم يريدون الإقلاع عن التدخين. كما ذكر سبعة من كل عشرة طلاب مدخنين تقريباً أنهم لم يجدوا صعوبة في شراء السجائر من محلات البيع خلال الشهر السابق لعملية المسح. وأخيراً، قرر حوالي ستة من كل عشرة طلاب أنهم تعلموا الكثير في المدرسة عن الآثار الضارة للتدخين، خلال العام السابق لعملية المسح.

الكاتب المراسل: د. تشارلز وارن، مكتب التدخين،
والصحة، المركز الوطني للوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز
الصحة، 4770 Bufford Highway, N.E,
MS K50, Atlanta, GA30341;
Telephone: 770-488-5739;
Fax: 770-488-5939;
Email: wcvl@cdc.gov

التفسير: تشير الوقائع في هذا التقرير، إلى أن المداخلات التي من شأنها أن تخفض معدلات استعمال التبغ بين الشباب (مثل زيادة الرسوم الضريبية، والحملات الإعلامية، والبرامج المدرسية المتصلة بالمداخلات المجتمعية، ومداخلات المجتمع التي تقلل فرص حصول القاصرين على التبغ)، ينبغي أن تقوم على قاعدة عريضة، وأن تركز على الصبيان والبنات في آن واحد، وأن يكون من مكوناتها ما يوجه نحو الوقاية من التدخين والإقلاع عنه. وما لم توضع برامج فعالة وتنفذ على وجه السرعة، فإن من المحتمل أن ترتفع معدلات المراضة والوفيات التي تعزى إلى استعمال التبغ.

إجراءات الصحة العمومية: إن التأزر بين البلدان في سن القوانين أو إرساء القواعد أو إصدار المراسيم والقرارات الخاصة بمكافحة التبغ، والتصديق على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية

حول مكافحة التبغ، وإجراء عملية الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب، تؤدي جميعاً إلى توفير فرصة فريدة من نوعها لوضع وتنفيذ وتقييم سياسة شاملة لمكافحة التبغ من شأنها أن تعين كل بلد من بلدان العالم في هذا السبيل. والتحدى الذي يواجهه كل بلد من البلدان هو المبادرة إلى وضع وتنفيذ وتقييم برنامج محدد لمكافحة التبغ وإجراء التغييرات اللازمة في هذا البرنامج كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المقدمة

يعتبر استعمال التبغ أحد الأسباب الرئيسية التي يمكن تَوَقُّيها للوفيات والأمراض المبكرة في العالم⁽¹⁾. ويقع على عاتق البلدان النامية النصيب الأوفى من العبء العالمي للتبغ، إذ يقيم في هذه البلدان أربعة وثمانون بالمئة من ألف وثلاثمئة مليون إنسان هي مجموع المدخنين في العالم في الوقت الحاضر⁽¹⁾. وتعزو منظمة الصحة العالمية قرابة خمسة ملايين وفاة سنوياً إلى التبغ. وينتظر لهذا الرقم أن يتجاوز عشرة ملايين وفاة بحلول عام ألفين وعشرين، على أن سبعين بالمئة تقريباً من هذه الوفيات سيحدث في البلدان النامية⁽²⁾.

وفي تموز/يوليو من عام ثمانية وتسعين، أطلقت المنظمة "مبادرة التحرر من التبغ"، لتركيز اهتمام دول العالم ومواردها ومساعدتها على الوفاء العالمي للتبغ. ولقد كان في طليعة أهداف هذه المبادرة، تشجيع الدول الأعضاء على المصادقة على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ التي وضعتها المنظمة وكانت أول معاهدات الصحة العمومية الدولية حول مكافحة التبغ⁽³⁾. وتحت هذه الاتفاقية بلدان العالم على وضع خطط عمل للسياسات العمومية (كحظر الإعلان المباشر وغير المباشر عن التبغ، وفرض الضرائب الخاصة بالتبغ وزيادة أسعاره، وتعزيز فكرة تحرير الأماكن العامة وأماكن العمل من التدخين واستعمال التبغ؛ ووضع رسائل صحية تحذيرية على علب التبغ). ولقد أعلنت الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في السابع والعشرين من شباط/فبراير 2005، وبلغ عدد البلدان التي أصبحت عضواً في هذه المعاهدة، مئة وتسعة وأربعين بلداً بحلول آب/أغسطس من عام 2007. وبالإضافة إلى الاتفاقية الإطارية للمنظمة، قام بعض المكاتب الإقليمية للمنظمة بوضع وتطبيق خطط عمل إقليمية لمكافحة التبغ⁽⁴⁻⁹⁾. وتقر كافة هذه الجهود المبذولة في مجال مكافحة التبغ بحاجة البلدان إلى البدء بأعمال الترصد على النحو المنصوص عليه في المادة 20 من الاتفاقية الإطارية للمنظمة:

"يقوم الفرقاء بوضع البرامج الملائمة لترصد جسامه، وأنماط، ومحددات، وعواقب استهلاك التبغ والتعرض لدخانها، على مختلف الصُّعَد الوطنية والإقليمية والعالمية. وفي سبيل ذلك، يترتب على

الفرقاء إدماج برامج ترصد التبغ في برامج الترصد الصحي الوطنية والإقليمية والعالمية، بحيث تكون المعطيات قابلة للمقارنة والتحليل في المستويات الإقليمية والدولية، بالشكل الملائم⁽³⁾.

وفي كانون الأول/ديسمبر 1998 قامت المنظمة، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، والرابطة الكندية للصحة العمومية بوضع "نظام عالمي لترصد التبغ" لمساعدة البلدان على إنشاء برامج لترصد التبغ ورصده⁽¹⁰⁻¹¹⁾. ويتضمن النظام العالمي لترصد التبغ مجموعة من المعطيات المتحصلة من أربع مسوحات هي: المسح العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب (للشباب فقط)؛ والمسح العالمي للعاملين في المدارس؛ والمسح العالمي لطلاب التخصصات الصحية؛ والمسح العالمي لتعاطي التبغ بين البالغين (للبالغين فقط). ويركز هذا التقرير على المعطيات المأخوذة من المسح العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب، الذي تستعمله البلدان لاستعزاز قدرتها على رصد تعاطي التبغ بين الشباب؛ ولإرشاد البرامج الوطنية للوقاية من التبغ ومكافحته؛ ولتيسير المقارنة بين المعطيات المتصلة بالتبغ في المستويات الوطنية، والإقليمية، والعالمية. واستطاع نظام الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب على مدى تسع سنوات فحسب، أن يحقق تغطية عالمية واسعة، ولاسيما في البلدان منخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، التي لم يسبق لها أن شهدت سوى القليل من أنشطة الترصد. ومنذ العام 1999 لا يزال نظام الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب يطبق في 140 بلداً و 11 مقاطعة وعبر كافة أقاليم المنظمة الستة. وتقوم البلدان المشاركة في العملية بتكرار المسح كل 4-5 سنوات (الملحق أ). ويلتزم نظام الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب بالتعريف المعياري للترصد في الصحة العمومية⁽¹²⁾، وأصبح أشمل نظم ترصد تعاطي التبغ بين الشباب التي وضعت ونفذت واستمر العمل بها حتى يومنا هذا.

طرائق العمل

الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب هو عملية مسح تركز على المدرسة وتتناول موقعاً جغرافياً محدداً، يمكن أن يكون بلداً، أو محافظة، أو مدينة، أو أي كيان جغرافي آخر. ويستخدم نظام الترصد هذا منهجية معيارية لتشكيل إطار اعتيادي، وانتقاء مدارس وفصول بعينها، وإعداد الاستبيانات، واتخاذ إجراءات ميدانية محددة، ومعالجة المعطيات المتحصلة. ويشتمل هذا المسح على أسئلة حول استعمال التبغ، والمعارف والمواقف المتصلة بالتبغ، والتعرض للتدخين الثانوي (القسري)

والتعرض لوسائل الإعلام الممالئة والمناوئة للتبغ، والرغبة في التوقف والإقلاع عن تعاطي التبغ، وإمكانية الوصول والحصول على منتجات التبغ، ومدى تعلم الطالب وتعرفه في المدرسة على الآثار الضارة لاستعمال التبغ.

تصميم العينة

يتم تحديد نطاق الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب في كل بلد على حدة، عن طريق التشاور بين منسق بحوث الترصد القطري، والمستشارين الإقليميين لمبادرة التحرر من التبغ، ومستشاري مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وبناء على المعطيات المطلوبة من القطر المعني، والموارد المتاحة، يمكن أن يكون نطاق عملية الترصد وطنياً، أو إقليمياً، أو مركزاً على مناطق حضرية أو ريفية بعينها. أضف إلى ذلك، أنه يتم تصميم عينات معينة بحيث يمكن أن تستخرج منها معلومات تمثل مختلف المناطق الجغرافية في القطر الواحد، وتستطيع في حال تجميعها أن تزودنا بتقديرات تمثل القطر بأكمله.

وبعد أن يتم تحديد أطر الاعتيان، يقوم منسق بحوث الترصد العالمي بتزويد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالمعلومات اللازمة عن الانتساب إلى المدارس، ويتم استنباط العينات باستعمال بروتوكول وبرمجيات حاسوبية تضعها هذه المراكز. وتعتمد منهجية الاعتيان المعياري لنظام الترصد العالمي تصميم عينات عنقودياً ذا مرحلتين ينتهي إلى تحديد عينات من الطلبة في الصفوف التي تضم طلاباً تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة. ويشمل كل إطار اعتيان كافة المدارس (العامة والخاصة عادةً) الموجودة في منطقة محددة جغرافياً، والتي تضم أيّاً من الفصول التي سبق تحديدها. وفي المرحلة الأولى، يتوقف احتمال اختيار المدارس على عدد الطلاب المنتسبين إليها في صفوف محددة. أما في المرحلة الثانية من الاعتيان، فيتم اختيار صفوف من المدارس التي وقع عليها الاختيار، بصورة عشوائية. ويعتبر كافة الطلاب المسجلين في الصفوف المختارة يوم إجراء المسح، مؤهلين للمشاركة في العملية. ومشاركة الطلاب هنا مشاركة تطوعية وغفلٌ من الأسماء ويعتمد جمع المعطيات في هذه العملية على إجراءات ذاتية. وينتج عن نظام تصميم العينات في الترصد العالمي تقديرات ممثلة ومستقلة ومستعرضة، لكل إطار من أُطر الاعتيان.

تحليل المعطيات

يطبق عامل ترجيح (weighting factor) على سجل كل طالب من أجل تصحيح عدم الاستجابة (من قبل مدرسة أو صف أو طالب)، وتباين احتمالات الانتقاء في مستوى المدرسة وفي مستوى الصف. ثم يطبق تصحيح نهائي يلخص الأوزان بحسب السنة الدراسية والجنس، مقارنة بمجموع التلاميذ في السنوات الدراسية المختارة في كل موقع من مواقع الاعتيان. ويتكون عامل الترجيح (أو عامل الوزن) من الصيغة التالية: $w = w_1 * w_2 * f_1 * f_2 * f_3 * f_4$

حيث:

w_1 = معكوس احتمال الاختيار لكل مدرسة.

w_2 = معكوس احتمال الاختيار لكل فصل دراسي في كل مدرسة مختارة.

f_1 = ضبط الاستجابة في مستوى المدرسة محسوباً على أساس فئة حجم التسجيل في المدرسة (ضئيل أو متوسط أو كبير)؛ وبحسب مقدار عدم استجابة المدرسة في كل من هذه العناصر الثلاثة.

f_2 = عامل ترجيح عدم الاستجابة في مستوى الصف، محسوباً بالنسبة لكل مدرسة.

f_3 = عامل ترجيح عدم الاستجابة في مستوى الطالب، محسوباً بالنسبة لكل صف دراسي.

f_4 = عامل ترجيح ما بعد التصنيف، محسوباً بحسب الجنس والسنة الدراسية.

SUDAAN: رمز لمضمومة برمجيات تستعمل لأغراض تحليل المعطيات الترابطية، استعملت

لحساب التقديرات الموزونة لمدى الانتشار والأخطاء المعيارية في هذه التقديرات (وتم حساب 95% من فترات الثقة من خلال الأخطاء المعيارية (13)). واعتبرت الاختلافات في النسب ذات أهمية إحصائية عند المستوى الذي تكون فيه $p > 0.05$.

الاستبيان

يتضمن الاستبيان المحوري للترصد العالمي أربعة وخمسين سؤالاً تغطي سبعة أبواب هي: استعمال التبغ؛ والمعرفة والمواقف المتخذة حيال التبغ؛ والتعرض للتدخين الثانوي (القسري)؛ والرغبة في التوقف والإقلاع عن التدخين؛ توافر التبغ وتيسر الحصول عليه؛ والتعلم في المدرسة حول الآثار

الضارة لاستعمال التبغ (الملحق ب). ولضمان الحد الأقصى من إمكانية المقارنة بين البلدان التي تطبق نظام الترصد العالمي، لا ينصح منسقا البحوث بتعديل الأسئلة المحورية في الاستبيان. ولا يمكن قبول أي تغيير في هذه النقاط المحورية إلا إذا لم تكن ذات صلة ببلد بعينه. ولا ضير في أن يقوم منسقا البحوث باقتراح وإضافة أسئلة إلى الاستبيان المحوري بهدف جمع معلومات تهم بلدانهم أو أحد أقاليم المنظمة.

وتتم ترجمة الاستبيانات القطرية النهائية إلى اللغات المحلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ثم تترجم مرة أخرى إلى اللغة الأصلية للتحقق من الدقة في النقل. ويقوم منسقا البحوث القطريون بتوجيه مجموعات من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة للتأكد من دقة الترجمة وحسن استيعاب الطلاب لمضمون الأسئلة.

ويشتمل هذا التقرير على المؤشرات الرئيسية التالية، المتصلة بانتشار استعمال التبغ بين المراهقين، وبمختلف مكونات البرامج الشاملة لمكافحة التبغ: تدخين السجائر في الوقت الراهن؛ واستعمال منتجات التبغ الأخرى (غير السجائر) في الوقت الراهن؛ واستعداد غير المدخنين أصلاً للبدء بالتدخين⁽¹⁴⁾. يضاف إلى ذلك، الإبلاغ عن عدة عوامل تؤثر في عملية تعاطي التبغ، بما في ذلك التعرض للتدخين الثانوي أو القسري (في مجالس المدخنين)، والتعرض للإعلان غير المباشر عن التبغ؛ والرغبة في التوقف عن التدخين؛ وتيسر الحصول على منتجات التبغ؛ والتعلم والإحاطة بأخطار استعمال التبغ، في المدارس (الجدول 1).

التغطية

في عام 1999 نجح اثنا عشر بلداً في إجراء اختبار ارتيادي لنظام الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب وهي (باربادوس، والصين، وكوستاريكا، وفيجي، والأردن، وبولندا، والاتحاد الروسي، وجنوب إفريقيا، وسري لانكا، وأوكرانيا، وفيترويل، وزيمبابوي) وهي تمثل كافة أقاليم المنظمة. وهذه الأقاليم هي: الإقليم الإفريقي، وإقليم الأمريكتين، وإقليم شرق المتوسط، والإقليم الأوروبي، وإقليم جنوب شرق آسيا، وإقليم غرب المحيط الهادئ. وعلى أثر النجاح المبدئي الذي حققه الترصد العالمي، اتسعت رقعته بسرعة ملحوظة بين دول المنظمة في كافة الأقاليم والمناطق الإدارية وسائر المناطق الجغرافية. ولقد استكمل تطبيق نظام الترصد العالمي في مئة وأربعين بلداً عضواً بمنظمة

الصحة العالمية، وفي ست مناطق إدارية هي (ساموا الأمريكية، والجزر العذراء، والجزر العذراء البريطانية، وغوام، ومونتسيرات، وبويرتوريكو)، وفي منطقتين جغرافيتين هما: قطاع غزة والضفة الغربية، وفي إقليم تديره الأمم المتحدة هو إقليم كوسوفو، وفي إقليم ذي إدارة خاصة هو: إقليم ماكاو، وبلد كومنولث واحد هو: جزر ماريانا الشمالية (الجدول 2). وتكرر تطبيق الترخيص العالمي في ستة وستين بلداً؛ وينتظر أن تقوم ثمانية وأربعون بلداً آخر بتكرار عملية المسح، وأن تبادر ستة وعشرون بلداً جديداً إلى البدء بتطبيق النظام قبل نهاية عام 2008. ويتم تكرار التطبيق على فترات تتراوح بين أربع سنوات وخمس سنوات. وبالنسبة للبلدان الستة والستين التي كررت تطبيق النظام لم تضمن في هذا التقرير سوى أحدث المعطيات (الملحق ج)، وأما بالنسبة للبلدان التي تحتوي على مواقع مسح متعددة يتعذر تجميعها في تقديرات وطنية شاملة، فقد اقتصر الأمر على المعطيات المأخوذة من العاصمة أو من أكبر المدن في البلد المعني. وسوف يشار إلى بلدان المنظمة المئة والأربعين وأحد عشر بلداً آخر في هذا التقرير بكلمة "مواقع".

وتشمل معطيات الترخيص في هذا التقرير 29 دولة عضواً في الإقليم الإفريقي (معطيات قطرية من 19 بلداً، ومعطيات دون قطرية من 10 بلدان)؛ و34 دولة عضواً وأربع مناطق إدارية في الإقليم الأمريكي (25 منها معطيات قطرية، و13 معطيات دون قطرية)؛ و21 دولة عضواً ومنطقتين جغرافيتين في إقليم شرق المتوسط (17 منها معطيات قطرية و6 دون قطرية)؛ و28 دولة عضواً وإقليماً تحت إدارة الأمم المتحدة في الإقليم الأوربي (28 منها قطرية، وواحد دون قطري)؛ و10 دول أعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا (8 منها قطرية، واثنان دون قطريين)؛ و18 دولة عضواً، ومنطقتين إداريتين، وإقليماً ذا إدارة خاصة وبلداً واحداً من بلدان الكومنولث في إقليم غرب المحيط الهادئ (19 منها قطرية و3 دون قطرية).

وأما معدل الاستجابة المدرسية فقد تم حسابه على أساس عدد المدارس المشاركة مقسوماً على عدد المدارس المختارة. وحُسِبَ معدل استجابة الصفوف الدراسية بتقسيم عدد الصفوف المشاركة على عدد الصفوف المختارة. وحسب معدل الاستجابة الطلابية بتقسيم عدد الطلاب المشاركين على عدد الطلاب المسجلين في الصف. أما معدل الاستجابة الإجمالي فقد حسب على أساس ناتج معدل الاستجابة المدرسية، مع معدل استجابة الصفوف الدراسية، مع معدل الاستجابة الطلابية. ومن بين "المواقع" المئة وواحد وخمسين، كانت معدلات استجابة الصفوف الدراسية في

خمسة مواقع دون 80%، وفي أربعة وثمانين منها بلغت معدلات الاستجابة المدرسية 100% (الجدول 3). كما أن من بين مجموع "المواقع" المئة وواحد وخمسين، كانت معدلات استجابة الصفوف الدراسية في أربعة مواقع دون 100%. أما معدل الاستجابة الطلابية فقد كان $80\% >$ في 17 موقعاً (وتدنى إلى 53.2% في ساموا)؛ وبالتالي كان معدل الاستجابة الشامل أكثر من 80% في 119 موقعاً، وأقل من 60% في ثمانية مواقع.

النتائج

الانتشار

تبلغ النسبة العامة للطلاب الذين يدخنون السجائر في الوقت الراهن 9.5% من مجموع الطلاب. أما أعلى المعدلات المسجلة فكان في الإقليم الأوربي حيث بلغ 19.2%، وكان أدناها في إقليم شرق المتوسط حيث بلغ 4.9% (الجدول 4). وبلغ معدل الطلبة الذين يدخنون السجائر قرابة 15% في أربعة من 29 موقعاً في الإقليم الإفريقي؛ وفي 13 موقعاً من 38 موقعاً في الإقليم الأمريكي؛ وفي موقع واحد من 23 موقعاً في إقليم شرق المتوسط؛ وفي 15 موقعاً من 29 موقعاً من الإقليم الأوربي؛ وفي موقع واحد من 10 مواقع في إقليم جنوب شرق آسيا؛ وفي 13 موقعاً من 22 موقعاً في إقليم غرب المحيط الهادئ. وكان معدل تدخين السجائر في الوقت الراهن أكثر من 30% في بلغاريا، وتشيلي (سانتياغو)، وكولومبيا (بوغوتا)، وجزر كوك، وجمهورية التشيك، وتيمور الشرقية، ولاتفيا، وبابوا نيو غينيا. وكان الصبيان أشد إقبالاً على تدخين السجائر من البنات في كل من الإقليم الإفريقي، وإقليم شرق المتوسط، وإقليم جنوب شرق آسيا، وإقليم غرب المحيط الهادئ؛ ولم يكن هنالك فرق كبير بين الجنسين في كل من الإقليم الأمريكي والإقليم الأوربي. ومن أصل مجموع المواقع المئة والواحد والخمسين، لم يلاحظ فرق بين الجنسين في الإقبال على التدخين في 87 موقعاً؛ وكان الصبيان أكثر إقبالاً بكثير من البنات على تدخين السجائر في 59 موقعاً؛ أما البنات فكانن أشد إقبالاً على التدخين من الصبيان في خمسة مواقع.

ويتعاطى واحد من كل عشرة طلاب (10.1%) في الوقت الحاضر منتجات تبغ أخرى غير السجائر (كالغليون، والنارجيلة، والتبغ غير المدخن، وسجائر اللف الرخيصة (البديدز)). وأعلى معدلات استعمال هذه المنتجات هو في إقليم شرق المتوسط (12%)، وأدناها في إقليم غرب المحيط الهادئ (6.6%) (الجدول 4). وقد استعمل قرابة 15% من الطلاب منتجات تبغ أخرى في خمسة من مجموع 28 موقعاً في الإقليم الإفريقي، الأمر الذي لم يحدث مطلقاً في الإقليم الأمريكي؛ بينما حدث ذلك في ستة من 23 موقعاً في إقليم شرق المتوسط؛ وفي موقع واحد من 29 موقعاً في الإقليم الأوربي؛ وفي موقع واحد من 10 مواقع في إقليم جنوب شرق آسيا؛ وفي ستة مواقع من 19 موقعاً في إقليم غرب المحيط الهادئ. وبلغ معدل استعمال منتجات تبغ أخرى أكثر من 30% في كل من لاوتيا، ولبنان، وميكرونيسيا، وجزر ماريانا الشمالية. وكان الصبيان أشد ميلاً بكثير من الفتيات إلى استعمال منتجات تبغ أخرى بصورة عامة وفي كل من الإقليم الأمريكي والإقليم الأوربي، وإقليم جنوب شرق آسيا؛ ولم يسجل اختلاف يذكر بين الجنسين في الأقاليم الأخرى. ومن بين المواقع المئة والسبعة والأربعين التي أمكن الحصول على معطيات منها، لم تسجل أي اختلافات بين الجنسين في 98 موقعاً؛ غير أن الصبيان قد أظهروا ميلاً أشد من البنات إلى استعمال منتجات تبغ أخرى في 49 موقعاً؛ ولم يسجل في أي موقع على الإطلاق وجود ميل لدى الفتيات أشد منه لدى الصبيان إلى استعمال منتجات تبغ أخرى.

ومن بين مجموع الطلاب الذين لم يسبق لهم أن دخنوا السجائر من قبل، أفاد 19.1% أنهم مستعدون للشروع في التدخين في السنة التالية. وكان أعلى معدل لهؤلاء في الإقليم الأوربي (حيث بلغ 29.8%) وأدنى معدل في إقليم غرب المحيط الهادئ، حيث لم يتجاوز 13.4% (الجدول 4). وأفاد قرابة 15% من الطلاب أنهم مستعدون للشروع في التدخين في السنة التالية في 12 موقعاً من 29 موقعاً في الإقليم الإفريقي؛ وفي 26 موقعاً من 38 موقعاً في الإقليم الأمريكي؛ وفي 13 موقعاً من 22 موقعاً في إقليم شرق المتوسط؛ وفي 22 موقعاً من 24 موقعاً في الإقليم الأوربي؛ وفي ثلاثة مواقع من المواقع التسعة في إقليم جنوب شرق آسيا؛ وفي 14 موقعاً من 22 موقعاً في إقليم غرب المحيط الهادئ. ولم تسجل اختلافات كبيرة بين الجنسين في أي إقليم من الأقاليم. ومن مجموع المواقع المئة والأربعة والأربعين التي أخذت منها المعطيات، لم تسجل أي اختلافات بين الجنسين في الاستعداد للتدخين في 122 موقعاً؛ مع أن الصبيان أظهروا استعداداً أشد مما هو عند الفتيات

للبشروع في التدخين في 16 موقعاً، كما أن البنات أظهرن استعداداً أشد مما هو عند الصبيان في ستة مواقع.

وكان معدل تدخين السجائر أعلى بكثير من معدل استعمال منتجات التبغ الأخرى في كل من الإقليم الإفريقي، والإقليم الأوروبي، وإقليم غرب المحيط الهادئ. ومن الثابت أن معدل استعمالات التبغ الأخرى كانت أعلى بكثير من تدخين السجائر في كل من إقليم شرق المتوسط وإقليم جنوب شرق آسيا؛ ولم تسجل أي اختلافات في الإقليم الإفريقي أو بصورة عامة عبر كافة المواقع. أما معدل الاستعداد للتدخين فقد كان أعلى بكثير من المعدل الحالي لتدخين السجائر بصورة عامة وفي كل إقليم على حدة، باستثناء إقليم غرب المحيط الهادئ، حيث لم يسجل أي اختلاف بين المعدلين.

العوامل المؤثرة في استعمال التبغ

التعرض للتدخين الثانوي أو التدخين القسري (استنشاق الدخان الناجم عن تدخين الآخرين) على العموم، تعرض أربعة من كل عشرة طلاب (42.5%) لدخان التبغ في منازلهم خلال الأسبوع السابق على إجراء المسح (الجدول 5). ومن بين أقاليم المنظمة الستة كان معدل التعرض للتدخين الثانوي في المنزل على هذا النحو أعلى في الإقليم الأوروبي منه في أي إقليم آخر (77.8%)؛ وكان الأدنى في الإقليم الإفريقي (27.6%). أما في الأقاليم الأربعة الأخرى، فقد تراوح معدل التعرض للتدخين الثانوي بين 50.6% (في إقليم غرب المحيط الهادئ) و34.3% (في إقليم جنوب شرق آسيا). وتعرض قرابة نصف الطلاب للتدخين الثانوي في المنزل في موقع واحد من المواقع التسعة والعشرين في الإقليم الإفريقي؛ وفي خمسة مواقع من 38 موقعاً في الإقليم الأمريكي؛ وفي خمسة مواقع من 23 موقعاً في إقليم شرق المتوسط؛ وفي 27 موقعاً من 29 موقعاً في الإقليم الأوروبي؛ وفي أربعة مواقع من 10 مواقع في إقليم جنوب شرق آسيا، وفي 13 موقعاً من 22 موقعاً في إقليم غرب المحيط الهادئ.

ولقد تعرض قرابة نصف مجموع الطلاب (55.1%) للتدخين القسري في الأماكن العامة خلال الأسبوع السابق للمسح (الجدول 5). وكان التعرض للتدخين القسري في الأماكن العامة أعلى ما يكون في الإقليم الأوروبي (86.1%). أما في الأقاليم الخمسة الأخرى، فقد تراوح معدل التعرض للتدخين الثانوي في الأماكن العامة بين 64.1% (في إقليم غرب المحيط الهادئ) و43.7%

(في الإقليم الإفريقي). وعبر كافة الأقاليم، كان قرابة 50% من الطلاب معرضين للتدخين الثانوي في الأماكن العامة في 13 موقعاً من 29 موقعاً في الإقليم الإفريقي؛ وفي 25 موقعاً من 38 موقعاً في الإقليم الأمريكي؛ وفي ستة مواقع من 23 موقعاً في إقليم شرق المتوسط؛ وفي كافة المواقع التسعة والعشرين في الإقليم الأوروبي؛ وفي سبعة مواقع من 10 مواقع في إقليم جنوب شرق آسيا؛ وفي 18 موقعاً من 21 موقعاً في إقليم غرب المحيط الهادئ. ويرى ثلاثة أرباع الطلاب (78.3%) في كافة الأقاليم، أنه ينبغي حظر التدخين في الأماكن العامة (الجدول 5). فقد رأى ستة من كل 10 طلاب (58.9%) في الإقليم الإفريقي أنه يجب حظر التدخين في الأماكن العامة، مقارنة بأكثر من سبعة من كل عشرة طلاب (77.5%) في إقليم جنوب شرق آسيا، وأكثر من ثمانية من كل عشرة طلاب في الأقاليم الأخرى. وأيد قرابة 80% من الطلاب جعل الأماكن العامة خالية من التدخين في سبعة مواقع من 29 موقعاً في الإقليم الإفريقي؛ وفي 18 موقعاً من 35 موقعاً في الإقليم الأمريكي؛ وفي 13 موقعاً من 23 موقعاً في إقليم شرق المتوسط؛ وفي 13 موقعاً من 29 موقعاً في الإقليم الأوروبي؛ وفي موقعين اثنين من 9 مواقع في إقليم جنوب شرق آسيا؛ وفي سبعة من 16 موقعاً في إقليم غرب المحيط الهادئ.

الإعلان المؤيد للتبغ بصورة غير مباشرة:

تبين على وجه العموم أن 14.9% من الطلاب يفتنون شيئاً (أداة) عليه شعار صنف من أصناف السجائر. وكان أعلى معدل لهؤلاء في الإقليمين الإفريقي والأوروبي (18% و 17.8% على التوالي)، أما أدنى معدل فكان في إقليم جنوب شرق آسيا (9.2%) (الجدول 5). وعبر كافة الأقاليم، تبين أن قرابة 20% من الطلاب يفتنون شيئاً أو أداة موسومة بشعار أحد أصناف السجائر في 11 موقعاً من 28 موقعاً في الإقليم الإفريقي؛ وفي موقعين من 38 موقعاً في الإقليم الأمريكي؛ وفي ثلاثة من 23 موقعاً في إقليم شرق المتوسط؛ وفي 13 موقعاً من 29 موقعاً في الإقليم الأوروبي؛ وفي موقعين من 9 مواقع في إقليم جنوب شرق آسيا؛ وفي ستة مواقع من 18 موقعاً في إقليم غرب المحيط الهادئ.

وإجمالاً، تبين أن طالباً من كل 10 طلاب (10%) قد عرضت عليه سجائر مجانية من قبل ممثلي شركات التبغ. وكان أعلى معدل لحالات العرض المجاني في الإقليم الإفريقي (12.2%)، وأدنى

معدل في إقليم غرب المحيط الهادئ (8%) (الجدول 5). وعبر كافة الأقاليم تلقى قرابة 15% من الطلاب عروض سجنائر مجانية من قبل ممثلي شركات التبغ في ثلاثة مواقع من 27 موقعاً في الإقليم الإفريقي؛ وفي موقعين اثنين من 35 موقعاً في الإقليم الأمريكي؛ وفي موقعين اثنين من 23 موقعاً في إقليم شرق المتوسط؛ وفي خمسة مواقع من 29 موقعاً في الإقليم الأوربي؛ وفي ثلاثة مواقع من 10 مواقع في إقليم جنوب شرق آسيا؛ وفي موقع واحد من 16 موقعاً في إقليم غرب المحيط الهادئ.

الإقلاع (عن التدخين)

بصورة عامة، أفاد 68.7% من الطلاب الذين يدخنون حالياً، أنهم يرغبون في الامتناع عن التدخين (الجدول 6). وكانت الرغبة في التوقف عن التدخين أقوى ما تكون في إقليم غرب المحيط الهادئ (80.7%)، وأدنى ما تكون في الإقليم الأمريكي (53.3%). وعبر كافة الأقاليم، أعرب قرابة 80% من الطلاب الذين يدخنون حالياً، عن رغبتهم في التوقف عن التدخين في ثمانية مواقع من 21 موقعاً في الإقليم الإفريقي؛ وفي ثلاثة مواقع من 30 موقعاً في الإقليم الأمريكي؛ وفي موقعين اثنين من 17 موقعاً في إقليم شرق المتوسط؛ وفي موقع واحد من 28 موقعاً في الإقليم الأوربي؛ وفي موقعين اثنين من 8 مواقع في إقليم جنوب شرق آسيا؛ وفي 11 موقعاً من 19 موقعاً في إقليم غرب المحيط الهادئ.

الحصول على التبغ وتوافره

بصورة عامة، اعتاد خمسة من كل 10 طلاب (46.7%) يدخنون السجائر في الوقت الحاضر، أن يشتروا سجائرهم من محلات تجارية (الجدول 6). وكانت أعلى معدلات هؤلاء في الإقليم الأوربي (61.7%) وأدناها في الإقليم الأمريكي (20.2%). وعبر كافة الأقاليم، اعتاد قرابة 50% من الطلاب الذين يدخنون السجائر في الوقت الحاضر، أن يشتروا سجائرهم من المحلات التجارية في ثلاثة مواقع من 25 موقعاً في الإقليم الإفريقي؛ وفي تسعة مواقع من 35 موقعاً في الإقليم الأمريكي؛ وفي موقع واحد من 20 موقعاً في إقليم شرق المتوسط؛ وفي 20 موقعاً من 28 موقعاً في الإقليم الأوربي؛ وفي خمسة مواقع من ثمانية مواقع في إقليم جنوب شرق آسيا؛ وفي أربعة مواقع من 19 موقعاً في إقليم غرب المحيط الهادئ.

ولم ترفض المحلات التجارية بيع السجائر لسبعة من كل عشرة طلاب (70.5%) خلال الشهر الذي سبق عملية المسح بسبب سنهم (الجدول 6). وكان أدنى معدل للطلاب الذين لم ترفض طلبات شرائهم في إقليم غرب المحيط الهادئ (47.9%)؛ وقرابة 75% في كل من الإقليم الأوربي؛ وإقليم شرق المتوسط، والإقليم الأمريكي. وعبر كافة الأقاليم، لم ترفض طلبات 75% من الطلاب المدخنين لشراء السجائر من المحلات التجارية خلال الشهر الذي سبق عملية المسح بسبب سنهم، في ثلاثة مواقع من 13 موقعاً في الإقليم الإفريقي؛ وفي 16 موقعاً من 21 موقعاً في الإقليم الأمريكي؛ وفي تسعة مواقع من 12 موقعاً في إقليم شرق المتوسط؛ وفي 20 موقعاً من 27 موقعاً في الإقليم الأوربي، وفي ثلاثة مواقع من سبعة مواقع في إقليم جنوب شرق آسيا، وفي موقعين اثنين من 10 مواقع في إقليم غرب المحيط الهادئ.

المنهج المدرسية

بصورة عامة، أفاد أكثر من نصف الطلاب (57.6%) أنهم تعلموا في المدرسة عن أخطار التبغ خلال العام الدراسي المنصرم (الجدول 6). وكان أعلى معدل لهؤلاء الطلاب في إقليم غرب المحيط الهادئ (68.8%)، وأدنى معدل في إقليم شرق المتوسط (47.5%). وعبر كافة الأقاليم تلقى قرابة 60% من الطلاب تعليمًا حول أخطار التبغ في سبعة مواقع من 29 موقعاً في الإقليم الإفريقي؛ وفي ثمانية مواقع من 38 موقعاً في الإقليم الأمريكي؛ وفي ثلاثة مواقع من 23 موقعاً في إقليم شرق المتوسط؛ وفي 15 موقعاً من 28 موقعاً في الإقليم الأوربي؛ وفي أربعة مواقع من 10 مواقع في إقليم جنوب شرق آسيا؛ وفي 12 موقعاً من 21 موقعاً في إقليم غرب المحيط الهادئ.

المناقشة

يتضمن هذا التقرير معطيات ترصد التبغ المأخوذة من 151 موقعاً. وعلى الرغم من التباين الواضح بين كل موقع وموقع آخر وبين إقليم من أقاليم المنظمة وإقليم آخر، في درجة انتشار

استعمال التبغ بين الطلاب، وبين العوامل المرتبطة بعملية استعمال التبغ (تعاطيه)، فإن صيغاً عديدة تتكون في نهاية المطاف وتترتب عليها نتائج بالغة التأثير في مجال مكافحة العالمية للتبغ.

وفي إطار هذه المواقع المئة والواحد والخمسين، لم يلحظ أي اختلاف في انتشار التبغ بين الصبيان عنه بين البنات في 87 موقعاً؛ بينما ترتفع معدلات الانتشار بين الصبيان عنها بين البنات في 59 موقعاً؛ وترتفع معدلات الانتشار بين البنات عنها بين الصبيان في خمسة مواقع.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن معدل انتشار تدخين السجائر بين الفتيات بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة من العمر في مصر (وفقاً لمعطيات الترخيص العالمي)، يفوق معدل الانتشار بين البالغات من الإناث في 60 من 117 بلداً يمكن إجراء المقارنات فيه⁽¹⁵⁾. وعلاوة على ذلك، فإن نسبة غير المدخنين، المستعدين لممارسة التدخين، متماثلة لدى الصبيان والبنات في 122 موقعاً، كما أنها أعلى من نسبة تدخين السجائر الفعلي في الوقت الحاضر في كافة الأقاليم باستثناء إقليم غرب المحيط الهادئ. وتوحي هذه النتائج بأن معدل تدخين السجائر يرتفع بين البنات مقارنة مع المعدلات التي لوحظت بين الإناث البالغات في دراسات أخرى. ولقد تم تعيين سببين محددتين يؤيدان هذه المفارقة⁽¹⁶⁻¹⁷⁾. أولهما أن صناعة التبغ قد دأبت لعقود طويلة على استهداف الإناث ولا تزال تسعى لتوسيع رقعة سوقها في هذا القطاع⁽¹⁸⁻¹⁹⁾. وتستهدف صناعة التبغ المرأة من خلال الإعلانات التي تظهر ارتباط التدخين بالاستقلالية، والأناقة، وضبط الوزن، وتكثف الثقافة والمعرفة، والسلطة⁽²⁰⁾. أضف إلى ذلك، أن أصناف السجائر غير المخصصة لجنس بعينه، مثل "المارلبورو" يتم تسويقها للنساء باستخدام تصاوير محبة لمنتجات الشركة. والأمر الثاني هو أنه على الرغم من أن معدلات التدخين بين الإناث البالغات قد تكون متدنية بالمقارنة مع نظيراتها بين الذكور البالغين، فإن ملايين النساء يمارسن التدخين. وقد يسهم هذا الأمر في إحداث تغيير في التقاليد الثقافية والمؤثرات الاجتماعية، مما يجعل التدخين بين الصبايا والفتيات الصغيرات مقبولاً بدرجة أكثر من ذي قبل.

كما تشير النتائج التي انتهت إليها هذا التقرير إلى الحاجة إلى بذل الجهود اللازمة للتقليل من تأثير العوامل الفاعلة في نشر تعاطي التبغ بين المراهقين. ولقد أفاد قرابة نصف الطلاب أنهم قد تعرضوا للتدخين الثانوي في الأماكن العامة خلال الأسبوع السابق لعملية المسح، مع أن ما يقارب من ثمانية من كل عشرة طلاب يفضلون فرض حظر على التدخين في الأماكن العامة. وثمة اثنان من كل 10 طلاب يملكان أداة موسومة بشعار أحد أصناف السجائر، وواحد من كل 10 طلاب قد

تلقى عرضاً للحصول على السجائر مجاناً من قبل ممثلي شركات التبغ. وعلى الرغم من اتساع نطاق التسويق الذي تنفذه صناعة التبغ، فإن حوالي سبعة من كل 10 طلاب يدخنون في الوقت الحاضر قد أفادوا بأنهم يودون الإقلاع والتوقف عن التدخين. ومع أن في بعض البلدان قوانين وأنظمة تمنع بيع منتجات التبغ للمراهقين، فإن نتائج التقصي العالمي تشير إلى أن قرابة سبعة من كل عشرة طلاب مدخنين، لم يمنعوا من شراء هذه المنتجات من المحلات التجارية. وأخيراً، أفاد ستة فقط من كل عشرة طلاب أنهم تلقوا تعليماً صريحاً في المدرسة حول مضار التدخين، خلال العام السابق لعملية المسح.

وفي يوم 27 شباط/فبراير من عام 2005، أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة الإتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، ووافقت الأطراف الموقعة على هذه المعاهدة على الالتزام القوي بتحسين إجراءات مكافحة التبغ. والمطلوب من البلدان المئة والتسعة والأربعين التي صادقت على ميثاق المنظمة الإطاري لمكافحة التبغ هو أن تسن تشريعاً شاملاً يقيّد الإعلان عن التبغ؛ ويفرض مستوى أعلى من التحذيرات الصحية التي تُثبت على أغلفة المنتجات؛ ويقلل من التعرض للتدخين الثانوي بفرض حظر على التدخين في الأماكن العامة؛ ويرفع الضرائب المفروضة على التبغ لزيادة أسعاره؛ ويحد من تهريب السجائر؛ وينزع الزراعات البديلة للتبغ⁽³⁾. وبغية دعم الإتفاقية الإطارية للمنظمة، تعكف المكاتب الإقليمية للمنظمة على وضع خطط عمل لمكافحة التبغ من شأنها التوصل إلى استراتيجيات واضحة تمكن البلدان من خفض وضبط استعمال التبغ⁽⁴⁻⁹⁾. وتحت هذه الجهود البلدان على استنباط وفرض وتطبيق برامج لمكافحة التبغ، من شأنها أن تحسن صحة السكان بتشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين؛ وأن تلغي إمكانية التعرض للتدخين الثانوي؛ وأن تثني الناس عن الشروع في استعمال التبغ. هذا، وتتضمن البرامج الشاملة لمكافحة التبغ عادةً، حملات التثقيف الجماهيري التي تهدف إلى إبطال مفعول إعلانات التبغ؛ كما تتضمن برامج مجتمعية المركز من شأنها خفض حجم استعمال التبغ، وبرامج تعين على الإقلاع عن التدخين، وبرامج أخرى تعتمد على المدرسة؛ وتتضمن كذلك كيفية وضع القيود المفروضة على تعاطي التبغ موضع التنفيذ، بالإضافة إلى بيان كيفية رصد وتقييم برنامج مكافحة، وما يتصل بكل ذلك من جهود استراتيجية لدعم البرنامج (مثل زيادة الرسوم الضريبية؛ وبرامج الأمراض المزمنة، التي تستهدف المشكلات الصحية المرتبطة بالتبغ، والقيود البيئية المفروضة على تدخين التبغ)^(1، 22، 23). ويمكن للمعطيات التي توصل إليها الترصد العالمي، أن تزود البلدان

معلومات ارتباطية قيّمة تساعد على رصد وتقييم خطط العمل الخاصة بمكافحة التبغ، وعلى استنباط الخطط اللازمة في حال عدم وجودها.

وما الإتفاقية الإطارية للمنظمة، وبرنامج الترصد العالمي، سوى جزءٍ من نفس الهدف الرامي إلى وضع وتطبيق وتقييم برامج فعالة لمكافحة التبغ. فالإتفاقية الإطارية تسهم في تقوية أنشطة مكافحة التبغ في مختلف البلدان، سواء من حيث الدعوة إلى الحفاظ على الصحة العمومية، ومن حيث تشجيع التعاون بين الوكالات الحكومية والوكالات اللاحكومية. ومن شأن برنامج الترصد العالمي أن يقيس عوامل معينة تتطلب الإتفاقية الإطارية من البلدان أن ترصدها بين الشباب (الجدول 7)، كما أنها توفر المؤشرات اللازمة لقياس مدى التقدم نحو تحقيق مضمون سبع من مواد الإتفاقية الإطارية للمنظمة. وتدعو هذه الإتفاقية الإطارية كافة البلدان إلى استخدام طرائق وإجراءات متساوقة في ما تبذله من جهود في عملية الترصد. ويوفر برنامج الترصد العالمي إطاراً ثابتاً يطبق عالمياً في إجراء عملية الترصد هذه، بما في ذلك الإجراءات القياسية لعمليات الاعتيان، والبنود الرئيسية في الاستبيان المستخدم في الترصد؛ والتدريب على الإجراءات الميدانية؛ وتحليل المعطيات المتساوقة الواردة من كافة المواقع. كما أن الترصد العالمي يعزز دور القطاع اللاحكومي من خلال دعم مشاركة هيئات المجتمع المدني في الترصد وفي الرصد وفي وضع السياسات والبرامج اللازمة في هذا المجال.

الحدود

تخضع النتائج التي انتهى إليها هذا التقرير لأربعة حدود أو قيود على أقل تقدير. وأول هذه الحدود يتمثل في أن الترصد العالمي مقصور على الطلاب، والمسح لا يمثل كافة الشباب بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة من العمر في البلدان المشاركة. على أن الأمر في معظم هذه البلدان، أن غالبية الأشخاص في هذه الفئة العمرية يداومون في مدارس خاصة أو تقنية منتظمة⁽²⁴⁾. والحد الثاني، هو أن هذه المعطيات لا تنطبق إلا على الشباب الذين كانوا في المدرسة يوم إجراء عملية المسح وأتموا الإجراءات التي تطلبها هذه العملية. غير أن معدلات استجابة الطلاب كانت مرتفعة (فقد كانت معدلات استجابة الطلاب في 146 موقعاً من 151 موقعاً 80% أو أكثر)، مما يوحي بأن الخطأ

الإحصائي الناجم عن الغياب أو عن عدم الاستجابة كان ضئيلاً ومحدوداً. أما الحَد الثالث فهو أن عملية التقصي العالمي لم تستكمل في بلدان في أوربا الغربية، وفي كندا، وأستراليا، واليابان، وبعض بلدان وسط القارة الإفريقية. على أن سبعة عشر بلداً من بلدان وسط إفريقيا تعتزم إجراء التقصي العالمي خلال عام 2008. والحد الرابع والأخير، هو أن المعطيات استندت على الإفادة الذاتية للطلاب الذين قد انتقصوا أو زادوا في وصف سلوكهم أو مواقفهم. ولذلك فإنه لا يمكن تحديد المدى الحقيقي للخطأ من خلال هذه المعطيات. غير أن الدراسات الخاصة بمسألة التعويل والاعتماد على المعطيات في الولايات المتحدة، قد انتهت إلى نتائج اختبارية طيبة لأسئلة مماثلة تتعلق بالتبغ⁽²⁵⁾. وعلى الرغم من أن الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب قد حقق تغطية جغرافية واسعة في وقت قصير، فإن التوسع المستقبلي لهذا الترصد ينبغي أن يركز الاهتمام على هدفين اثنين: أولهما هو أن ينبغي تشجيع البلدان التي لم تطبق هذا الترصد على إجراء عملية المسح. والإقليم الإفريقي والإقليم الأوربي يعتزمان توسيع دائرة الترصد عام 2008 ليشمل 21 بلداً جديداً. والثاني هو ضرورة تشجيع البلدان التي استكملت مسوحات دون وطنية (في مناطق إدارية مختارة في البلد)، على أن توسع التغطية لتشمل البلد بأكمله.

الخاتمة

تبين النتائج التي انتهى إليها التقرير أن المداخلات الكفيلة بخفض نسبة تعاطي التبغ بين الشباب (مثل زيادة الرسوم الضريبية، وحملات وسائل الإعلام، والبرامج المدرسية المتصلة بمداخلات المجتمع، ومداخلات المجتمع التي تقلل فرص حصول الأحداث على التبغ) ينبغي توسيع قاعدتها، كما ينبغي التركيز على الصبيان والبنات في آن واحد، وأن تشتمل العملية على مكونات موجهة نحو الوقاية من التبغ والإقلاع عن تعاطيه. وما لم توضع وتنفذ برامج فعالة في هذا السياق على نحو السرعة، فإن من المحتمل أن ترتفع أكثر فأكثر معدلات المراضة والوفيات الناجمة عن استعمال التبغ، في المستقبل. وما من شك في أن الإتفاقية الإطارية للمنظمة، وخطط العمل الإقليمية التي اعتمدتها المنظمة لمكافحة التبغ، وخطط العمل القطرية لمكافحة التبغ، توفر أطر عمل مفيدة لتطبيق هذا

الأسلوب الشامل. ثم إن التآزر بين البلدان التي تسن القوانين والتشريعات والقرارات الخاصة بمكافحة التبغ؛ وتصادق على الإتفاقية الإطارية للمنظمة وتلتزم بها؛ وتنفذ الترصد العالمي، يهيئ فرصة فريدة لوضع وتطبيق وتقييم سياسة شاملة لمكافحة التبغ، تعود بالفائدة على كل بلد من البلدان المعنية.

المراجع

1. Jha P, Chaloupka FJ. Tobacco control in developing countries. Oxford, UK: Oxford University Press; 2000.
2. Peto R, Lopez AD, Boreham J, Thun M, Heath C Jr. Mortality from smoking in developed countries 1950-2000; indirect estimation from National Vital Statistics. Oxford, UK: Oxford University Press; 1994.
3. World Health Organization. WHO Framework Convention on Tobacco Control. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2003.
4. World Health Organization, African Regional Office. Implementation of the Framework Convention on Tobacco Control in the African Region: current status and the way forward. Brazzaville, Congo: World Health Organization; 2005.
5. Anon. Details available at <http://www.smokefreeamericas.org>.
6. World Health Organization, Eastern Mediterranean Regional Office. Plan of action for tobacco control in the Eastern Mediterranean Region. Cairo, Egypt: World Health Organization; 2003.
7. World Health Organization, European Regional Office. European strategy for tobacco control. Copenhagen, Denmark: World Health Organization; 2002.
8. World Health Organization, South-East Asia Regional Office. Regional strategy for utilization of global youth tobacco survey data. New Delhi, India: World Health Organization; 2005.
9. World Health Organization, Western Pacific Regional Office. Tobacco free initiative regional action plan 2005-2009. Manila, Philippines: World Health Organization; 2005.
10. The Global Tobacco Surveillance System Collaborating Group. The global tobacco surveillance system (GTSS): purpose, production and potential. J Sch Health 2005;75:15-24.
11. Warren CW, Jones NR, Eriksen MP, Asma S. Patterns of global tobacco use in young people and implications for future chronic disease burden in adults. Lancet 2006;367:749-53.

12. Brownson RC, Remington PL, Davis JR, eds. Chronic Disease Epidemiology and Control [Chapter 3]: Chronic Disease Surveillance. Washington, DC: American Public Health Association; 1993.
13. Shah BV, Barnwell BG, Bieler GS. Software for the Statistical Analysis of Correlated Data (SUDAAN): User's Manual. Release 7.5. 1997 (software documentation). Research Triangle Park, NC: Research Triangle Institute; 1997.
14. Pierce JP, Choi WS, Gilpin EA, Farkas AJ, Merritt RK. Validation of susceptibility as a predictor of which adolescents take up smoking in the United States. *Health Psychol* 1999;15:355-61.
15. Mackay J, Eriksen M, Shafey O. The Tobacco Atlas. Atlanta, GA: American Cancer Society; 2006.
16. Morrow M, Barraclough S. Tobacco control and gender in Southeast Asia. Part I: Malaysia and the Philippines. *Health Promotion International* 2003;18:255-64.
17. Morrow M, Barraclough S. Tobacco control and gender in Southeast Asia. Part II: Singapore and Vietnam. *Health Promotion International* 2003;18:373-80.
18. Pierce J. Tobacco industry promotion of cigarettes and adolescent smoking. *JAMA* 1998;279:505-11.
19. Hochberg A. Critics fume over marketing of "Camel No. 9". United States: National Public Radio, March 16, 2007. Available at www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=8909745.
20. Campaign for Tobacco-Free Kids. Tobacco Industry Targeting of Women and girls. CTFK Factsheet, May 7, 2007.
21. Waldron I, Bratelli G, Carriker L, Sung WC, Vogeli C, Waldman E. Gender differences in tobacco use in Africa, Asia, the Pacific and Latin America. *Soc Sci Med* 1988;27:1269-75.
22. Jha P, Chaloupka FJ. Curbing the epidemic: governments and the economics of tobacco control. Washington, DC: World Bank; 1999.
23. Task Force on Community Preventive Services. Recommendations regarding interventions to reduce tobacco use and exposure to environmental tobacco smoke. *Am J Prev Med* 2001;20:10-5.
24. United Nations Children's Fund. The state of the world's children, 2002. New York, NY: United Nations Children's Fund; 2002. Available at <http://www.unicef.org/sowc02/fullreport.htm>.
25. Brener ND, Kann L, McManus T, Kinchen SA, Sundberg EC, Ross JG. Reliability of the 1999 Youth Risk Behavior Survey questionnaire. *J Adolesc Health* 2002;31:336-42.

الجدول 1- تعريف المؤشرات في المسح العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب

تدخين السجائر في الوقت الحاضر	الطلاب الذين دخنوا السجائر يوماً واحداً على الأقل خلال الشهر السابق للمسح
استعمال منتجات التبغ الأخرى غير السجائر	الطلاب الذين تعاطوا منتجات تبغ أخرى غير السجائر يوماً واحداً على الأقل خلال الشهر السابق للمسح
الشروع في التدخين لدى الذين لديهم	الطلاب الذين لم يسبق لهم أن دخنوا مطلقاً، وتنوعت إجاباتهم باستثناء عبارة (حتماً لا!)، عن السؤالين التاليين:
الاستعداد لتعاطي التبغ	● إذا عرض عليك أفضل أصدقائك سيجارة، فهل تدخنها؟ ● هل تظن أنك سوف تحاول تدخين سيجارة خلال العام القادم؟
التعرض للتدخين الثانوي، وتأنييد حظر التدخين في المناطق العامة	● الطلاب الذين أفادوا بأنهم تعرضوا للتدخين القسري في منازلهم خلال الأيام السبعة السابقة للمسح. ● الطلاب الذين أفادوا بأنهم تعرضوا للتدخين القسري في الأماكن العامة خلال الأيام السبعة السابقة للمسح. ● الطلاب الذين أفادوا بأنهم يؤيدون فرض حظر على التدخين في الأماكن العامة.
التعرض للإعلان غير المباشر لصالح منتجات التبغ	● الطلاب الذين أفادوا بأنهم يحملون أداة موسومة بشعار إحدى شركات التبغ. ● الطلاب الذين أفادوا بأنه عرضت عليهم سجائر مجانية من قبل أحد ممثلي شركات التبغ.
الإقلاع (عن التدخين)	المدخنون الحاليون الذين أفادوا بأنهم راغبون في التوقف عن التدخين الآن.
إتاحة السجائر وتيسر الحصول عليها	● المدخنون الحاليون الذين أفادوا بأنهم اعتادوا الحصول على السجائر بشرائها من المحلات التجارية. ● المدخنون الحاليون الذين أفادوا بأنهم اعتادوا الحصول على سجائرهم بشرائها من المحلات التجارية، وبأنه لم يرفض طلبهم شراءها بسبب سنهم خلال الشهر السابق لعملية المسح.
الذين تعلموا في المدرسة عن أخطار تدخين التبغ	الطلاب الذين أجابوا بـ "نعم" عند سؤالهم حول ما إذا كانوا قد تلقوا في المدرسة تعليماً حول أخطار تدخين التبغ، خلال السنة الدراسية السابقة لعملية المسح.

الجدول 2- المواقع التي استكملت عملية الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب، بحسب أقاليم منظمة الصحة العالمية، 2007-2000			
إقليم المنظمة	الدول الأعضاء في المنظمة	الدول الأعضاء التي استكملت الترصد العالمي	المناطق والأقاليم الجغرافية، والمقاطعات التي تديرها الأمم المتحدة، والأقاليم الإدارية الخاصة، أو الكومنولث، التي استكملت الترصد العالمي
الإفريقي	46	29	0
إقليم الأمريكتين	35	34	4 (الجزر العذراء البريطانية*، مونتسيراتا، برتوريكو†، الجزر العذراء التابعة للولايات المتحدة†)
شرق المتوسط	21	21	2 (قطاع غزة والضفة الغربية)
الأوربي	53	28	1 (كوسوفو§)
جنوب شرق آسيا	11	10	0
غرب المحيط الهادئ	27	18	4 (ساموا الأمريكية†، غوام، مكاو¶، جزر ماريانا الشمالية**)
المجموع	193	140	11
* ممتلكات المملكة المتحدة			
† ممتلكات الولايات المتحدة			
§ إقليم تديره الأمم المتحدة			
¶ إقليم إداري خاص تابع للصين			
** كومنولث في حالة اتحاد سياسي مع الولايات المتحدة			

الجدول 3- معدلات الاستجابة بحسب أقاليم منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في المنظمة والمناطق والأقاليم الجغرافية والأقاليم الخاصة لإدارة الأمم المتحدة والأقاليم ذات الإدارة الخاصة أو الكومنولث وبحسب السن والجنس - الترخيد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب، 2000-2007

إقليم المنظمة والدولة العضو أو المنطقة أو الإقليم ذو الإدارة الخاصة، والسنة	معدلات الاستجابة				العدد سن 13 إلى 15 سنة	الجنس	
	المدرسة*	الصف†	الطبيب§	الاجمعي		البنات	الصبين
	%	%	%	%		%	%
الاقليم الإفريقي							
الجزائر (فلسطينية)، 2007	100.0	100.0	97.5	97.5	1,565	54.3	45.7
بنين (أنتيليت ليونزال)، 2003	100.0	100.0	84.6	84.6	1,019	40.7	59.3
بوتسوانا، 2001	96.0	97.4	89.6	89.3	1,004	33.0	44.4
بوركينافاسو (أوغاندوغو)، 2006	100.0	100.0	94.7	94.7	1,356	50.4	49.6
كوموروس، 2007	100.0	100.0	80.8	80.8	811	52.4	47.6
الكونغو، 2006	100.0	100.0	57.0	57.0	1,347	48.4	51.6
كوت ديفوار (أندجان)، 2003	100.0	100.0	86.1	86.1	2,068	45.4	54.6
إريتريا، 2006	100.0	100.0	87.8	87.8	4,813	39.8	60.2
إثيوبيا (أديس أبابا)، 2003	100.0	100.0	82.0	82.0	979	56.7	43.3
غانا، 2006	96.7	100.0	88.5	85.6	5,185	45.4	54.6
كينيا، 2001	100.0	100.0	97.1	97.1	3,093	49.3	50.7
ليسوتو، 2002	100.0	100.0	88.5	88.5	1,989	58.3	41.7
مالاوي، 2005	96.8	100.0	84.2	81.6	2,957	50.1	49.9
مالي (باماكو)، 2001	100.0	100.0	86.3	86.3	1,079	43.1	56.9
موريتانيا، 2006	94.3	100.0	88.3	83.3	2,040	46.0	54.0
موريتانيوس، 2003	95.8	100.0	92.7	88.9	1,609	51.5	48.5
موزمبيق، 2002	100.0	100.0	88.3	88.3	912	53.9	46.1
ناميبيا، 2004	94.0	100.0	85.1	80.0	3,646	55.5	44.5
النيجر، 2006	100.0	100.0	84.0	84.0	1,055	49.0	51.0
نيجيريا (ولاية كادونا - يفر)، 2000	90.0	100.0	85.7	77.1	914	48.6	51.4
النيجال، 2007	92.0	100.0	89.3	82.1	1,611	50.4	49.6
ميشيفو، 2002	100.0	100.0	90.9	90.9	942	50.5	49.5
جيبوتي (بورديبا)، 2002	99.3	100.0	68.1	62.9	4,325	52.9	47.1
سوازيلاند، 2005	100.0	99.8	86.5	86.2	7,628	53.6	46.4
تنزانيا (أروشا)، 2003	100.0	100.0	92.6	92.6	1,253	54.8	45.2
توغو، 2007	100.0	100.0	91.5	91.5	1,947	38.0	62.0
أوغندا، 2007	96.1	100.0	84.5	81.2	2,551	45.1	54.9
زامبيا (لوساكا)، 2002	96.0	100.0	87.5	84.0	1,241	48.2	51.8
زيمبابوي (هراري)، 2003	100.0	100.0	85.4	85.4	1,433	51.0	49.0

الاقليم الأمريكي

51.1	48.9	1,089	91.8	91.8	100.0	100.0	أنتيغوا وباربودا، 2004
52.0	48.0	1,295	75.2	82.0	100.0	91.7	الأرجنتين (العاصمة الفيدرالية)، 2003
44.1	55.9	1,018	83.5	86.9	100.0	96.0	الباهاماس، 2004
49.0	51.0	1,097	84.6	85.7	98.7	100.0	باربادوس، 2002
48.4	51.6	1,016	86.5	91.9	100.0	94.1	بليز، 2002
52.5	47.5	3,246	87.3	91.8	100.0	95.0	بوليفيا (الآن)، 2003
45.3	54.7	1,858	75.7	86.5	100.0	87.5	البرازيل (ريو دي جانيرو)، 2005
40.8	59.2	368	64.2	85.6	100.0	75.0	الجزر العذراء البريطانية**، 2001
49.9	50.1	1,539	88.9	88.9	100.0	100.0	تنزانيا (سانتياغو)، 2003
50.6	49.4	2,016	92.1	92.1	100.0	100.0	كولومبيا (بوغوتا)، 2001
50.9	49.1	2,698	74.3	80.8	100.0	92.0	كوستاريكا، 2002
49.8	50.2	1,663	91.5	91.5	100.0	100.0	كوبا (هافانا)، 2004
45.3	54.7	990	89.2	89.2	100.0	100.0	دومينيكا، 2004
48.5	51.5	3,600	83.9	86.2	100.0	97.3	جمهورية الدومينيكان، 2004
53.9	46.1	1,672	96.3	96.3	100.0	100.0	الإكوادور (كويتو)، 2001
41.1	58.9	1,797	44.2	88.5	100.0	50.0	إلسلفادور، 2003
44.3	55.7	1,216	89.3	89.3	100.0	100.0	غرينادا، 2004
40.0	60.0	1,482	67.3	80.1	100.0	84.0	غواتيمالا (مدينة غواتيمالا)، 2002
48.7	51.3	890	78.6	78.6	100.0	100.0	غويانا، 2004
48.3	51.7	767	42.3	62.2	100.0	68.0	هايتي (بورت أو برنس)، 2005
44.6	55.4	1,119	74.6	81.7	100.0	91.3	هندوراس (تيجوسيغالبا)، 2003
49.5	50.5	1,398	79.9	79.9	100.0	100.0	جامايكا، 2006
40.8	60.2	1,412	81.2	94.6	100.0	96.0	المكسيك (مexico سيتي)، 2006
49.7	50.3	129	100.0	100.0	100.0	100.0	مونتسرات**، 2000
47.4	51.6	881	86.4	86.4	100.0	100.0	نيكاراغوا (منسترو مانيغوا)، 2003
49.0	50.4	1,290	87.3	89.1	100.0	96.0	بناما، 2002
50.9	49.1	1,300	87.0	90.6	100.0	96.0	الباراغواي (أسونسيون)، 2003
50.2	49.8	1,045	86.7	90.3	100.0	96.0	البيرو (ليما)، 2003
47.1	52.9	521	43.4	83.4	100.0	52.0	بورتو ريكو، 2004
43.4	56.6	843	56.9	56.9	100.0	100.0	سانت كيتس ونيفيس، 2002
44.4	55.6	836	77.7	77.7	100.0	100.0	سانت لوسيا، 2007
45.8	54.2	872	84.5	84.5	100.0	100.0	سانت هينرييت ودي غرينادين، 2007
47.9	52.1	1,020	94.4	94.4	100.0	100.0	سورينام، 2004
49.4	50.6	1,802	74.5	74.5	100.0	100.0	ترينيداد وتوباغو، 2007
49.6	50.4	13,515	81.8	88.0	100.0	93.0	الولايات المتحدة الأمريكية، 2004
44.3	55.7	2,483	74.9	74.9	100.0	100.0	الأوروغواي، 2007
48.0	52.0	1,433	84.6	89.8	100.0	94.3	الجزر العذراء الأمريكية††، 2004
44.7	55.3	2,237	92.9	99.7	100.0	93.2	فنزويلا، 1999
إقليم شرق المتوسط							
61.4	38.6	331	68.2	71.0	100.0	96.0	أفغانستان (كابول)، 2004
49.0	51.0	1,445	95.2	95.2	100.0	100.0	ألبانيا، 2002
60.0	40.0	847	92.5	92.5	100.0	100.0	الجبل الأسود، 2003
56.4	43.6	2,898	77.0	85.4	100.0	90.2	مصر، 2005
49.7	50.3	1,395	94.5	94.5	100.0	100.0	قطر، 2005
47.0	53.0	3,841	87.9	95.4	100.0	92.2	إيران، 2003
58.1	41.9	957	95.6	95.6	100.0	100.0	العراق (كربلا)، 2006
49.1	50.9	1,550	91.6	91.6	100.0	100.0	الأردن، 2007

46.1	53.9	2,636	88.7	88.7	100.0	100.0	الكويت، 2005
47.4	52.6	2,431	97.2	99.2	100.0	98.0	لبنان، 2005
50.1	48.9	1,243	94.1	94.1	100.0	100.0	ليبيا، 2007
55.3	44.7	1,991	91.6	93.5	100.0	98.0	المغرب، 2006
36.9	63.1	943	87.3	90.9	100.0	96.0	عمان، 2007
41.2	48.8	1,130	82.3	85.1	100.0	96.8	باكستان (إسلام آباد)، 2003
36.9	63.1	943	87.3	90.9	100.0	96.0	قطر، 2007
52.7	47.3	2,574	82.1	87.4	100.0	94.0	السعودية، 2007
68.4	31.6	897	86.6	90.2	100.0	96.0	الصومال (أديس أبابا)، 2007
48.3	51.7	2,831	85.7	93.2	100.0	92.0	السودان، 2005
58.2	41.8	3,278	98.3	98.3	100.0	100.0	سوريا، 2002
49.8	50.2	1,499	92.4	92.4	100.0	100.0	تونس، 2007
50.1	49.9	10,821	93.1	93.1	100.0	100.0	الإمارات، 2005
49.3	50.7	1,305	95.6	95.6	100.0	100.0	الصفحة العربية، 2005
62.2	37.8	9,040	84.3	84.3	100.0	100.0	اليمن، 2003
الإقليم الأوربي							
45.8	54.2	3,213	91.1	91.1	100.0	100.0	ألبانيا، 2004
45.8	54.2	1,300	84.7	84.7	100.0	100.0	أرمينيا، 2004
50.3	49.7	3,909	86.5	86.5	100.0	100.0	بيلاروسيا، 2004
51.3	48.7	6,960	91.8	91.8	100.0	100.0	البوسنة والهرسك، 2003
49.9	50.1	1,763	91.1	91.1	100.0	100.0	بلغاريا، 2002
51.3	48.7	3,531	90.9	90.9	100.0	100.0	كرواتيا، 2007
48.4	51.6	10,000	92.0	92.0	100.0	90.4	فرنس، 2005
53.1	46.9	3,191	84.7	84.7	100.0	100.0	جمهورية التشيك، 2007
45.9	54.1	4,307	78.2	81.7	100.0	95.7	إستونيا، 2003
62.6	47.4	3,410	95.3	95.3	100.0	100.0	جورجيا، 2003
51.5	48.5	5,204	79.8	88.7	100.0	90.0	اليونان، 2005
45.4	54.6	3,205	85.9	87.2	100.0	98.5	هنغاريا، 2003
47.0	53.0	9,871	89.4	89.4	100.0	100.0	كازاخستان، 2004
51.0	49.0	2,444	87.4	89.0	100.0	98.2	كوسوفو، 2004
41.8	58.2	3,434	98.8	98.8	100.0	100.0	قرغيزستان، 2004
45.6	54.4	2,476	81.4	83.0	100.0	98.0	لاتفيا، 2007
47.5	52.5	1,646	82.8	82.8	100.0	100.0	ليتوانيا، 2005
50.4	49.6	2,987	84.5	88.0	100.0	96.0	مقدونيا، 2003
46.4	53.6	3,977	89.1	89.1	100.0	100.0	مولدوفا، 2004
44.6	55.4	1,966	87.0	87.0	100.0	100.0	مونتينيغرو، 2004
47.0	53.0	2,429	72.4	78.5	100.0	92.2	بولندا، 2003
48.2	51.8	2,504	58.0	58.0	100.0	100.0	رومانيا، 2004
51.5	48.5	10,956	85.9	87.9	100.0	97.7	روسيا الاتحادية، 2004
50.7	49.3	3,506	89.8	89.8	100.0	100.0	صربيا، 2003
49.4	50.6	3,639	85.9	87.4	100.0	98.3	سلوفاكيا، 2003
44.2	55.8	3,817	84.6	89.1	100.0	95.0	سلوفينيا، 2003
52.5	47.5	5,121	96.6	96.6	100.0	100.0	طاجيكستان، 2004
54.1	45.9	11,441	92.1	92.1	100.0	100.0	تركيا، 2003
50.0	50.0	6,579	72.4	84.3	100.0	85.9	أوكرانيا، 2005
إقليم جنوب شرق آسيا							
71.8	28.2	1,189	55.4	55.4	100.0	100.0	بنغلاديش (دكا)، 2004

49.8	50.2	1,130	89.1	95.5	100.0	93.3	يوتان، 2006
51.8	48.2	899	81.1	84.5	100.0	96.0	تيجور الشرقية، 2006
57.9	42.1	11,789	81.6	82.3	100.0	99.4	الهند، 2006
47.3	52.7	3,737	94.3	94.3	100.0	100.0	إندونيسيا، 2006
54.1	45.9	700	75.8	83.4	100.0	90.9	المالديف، 2004
47.4	52.6	2,042	84.7	88.2	100.0	96.0	ميانمار، 2001
55.3	44.7	1,995	93.7	93.7	100.0	100.0	نيبال (براهمانغار)، 2004
51.6	48.4	1,667	79.1	79.1	100.0	100.0	سريلانكا، 2003
46.0	54.0	15,420	99.9	99.9	100.0	100.0	تايلاند، 2005
إقليم غرب المحيط الهادئ							
50.4	49.6	1,293	96.0	96.0	100.0	100.0	ساموا الأمريكية ++، 2005
63.6	36.4	752	87.4	89.2	100.0	98.0	كمبوديا، 2003
49.1	50.9	2,202	98.9	98.9	100.0	100.0	الفلبين (شنتيان)، 2005
47.9	52.1	604	84.8	84.8	100.0	100.0	جزر كوك، 2003
49.4	50.6	1,687	80.9	80.9	100.0	100.0	فيجي، 2005
51.3	48.7	1,400	81.9	81.9	100.0	100.0	غوام ++، 2002
53.1	46.9	1,642	93.6	93.6	100.0	100.0	لاوس (بلدية فيتيان)، 2003
54.0	46.0	1,366	88.2	93.8	100.0	94.0	ميكرونيا، 2005
50.6	49.4	3,302	87.9	87.9	100.0	100.0	ماليزيا، 2003
50.2	49.8	1,363	84.7	84.7	100.0	100.0	مكرونيسيا، 2007
45.1	54.9	3,521	92.6	92.6	100.0	100.0	منغوليا، 2003
54.1	45.9	1,157	61.1	83.3	100.0	73.3	نيوزيلندا، 2007
51.6	48.4	2,061	70.1	70.3	100.0	88.4	جزر مارشال (البحر)، 2004
47.6	52.4	928	94.9	94.9	100.0	100.0	بالاو، 2005
54.5	45.5	1,368	82.1	82.1	100.0	100.0	بابوا غينيا الجديدة، 2007
40.0	59.2	3,270	80.9	83.1	100.0	97.3	الفلبين، 2007
48.0	52.0	900	53.2	53.2	100.0	100.0	ساموا، 2007
49.7	50.3	9,064	84.0	93.3	100.0	90.0	سنغافورة، 2000
48.8	51.2	4,765	87.7	95.3	100.0	92.0	توربا الجنوبية، 2005
40.6	59.4	393	91.1	91.1	100.0	100.0	توفالو، 2006
44.7	55.3	1,355	70.0	74.8	97.7	95.8	فانواتو، 2007
43.6	56.4	1,151	96.4	96.4	100.0	100.0	فيتنام (هانوي)، 2003

*م حساب معدل استجابة المدرسة بتقسيم عدد المدارس المشتركة على عدد المدارس المختارة
†م حساب معدل استجابة الصف بتقسيم عدد الصفوف المشتركة على عدد الصفوف المختارة
§م حساب معدل استجابة الطالب بتقسيم عدد الطلاب المشتركين على عدد الطلاب المسجلين في الصف
||م حساب المعدل الإجمالي للاستجابة بضم معدل استجابة المدرسة بمعدل استجابة الصف، وضرب الناتج بمعدل استجابة الطالب
**ممتلكات المملكة المتحدة
++ممتلكات الولايات المتحدة
§§معلم خاص لإدارة الأمم المتحدة
|||معلم خاص لإدارة صينية خاصة
***متمولت في اتحاد سياسي مع الولايات المتحدة

الجدول 4- معدل انتشار استعمال التبغ بحسب الجنس وإقليم المنظمة والدولة العضو أو المنطقة أو الإقليم الجغرافي أو الإقليم الخاضع لإدارة الأمم المتحدة أو الإقليم ذي الإدارة الخاصة أو الكومنولث - الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب، 2000-2007

إقليم المنظمة أو الدولة العضو أو المنطقة أو الإقليم ذو الإدارة الخاصة، والسنة	% السجائر المدخنة حالياً						% منتجات التبغ المستعملة حالياً غير السجائر						% غير المدخنين أصلاً المعرضون لمنتجات أخرى غير السجائر					
	المجموع			الصبيان			البنات			المجموع			الصبيان			المجموع		
	(CI*)	%	(CI)	(CI)	%	(CI)	(CI)	%	(CI)	(CI)	%	(CI)	(CI)	%	(CI)	(CI)	%	(CI)
الإقليم الإفريقي	8.0	(6.2-10.5)	13.5	(11.3-16.1)	5.2	(3.5-7.9)	11.3	(9.0-14.1)	11.9	(9.2-15.2)	10.6	(7.8-14.3)	15.1	(11.5-19.5)	16.6	(11.7-23.0)	13.8	(10.7-17.8)
الجزائر (مستطيمة)، 2007	8.3	(6.4-10.7)	18.3	(14.1-23.5)	1.5	(0.6-3.6)	8.0	(6.4-10.0)	12.7	(10.2-15.6)	4.8	(3.2-7.2)	14.9	(12.8-17.3)	22.7	(17.4-29.0)	11.5	(9.5-13.8)
بسن (أنتليث ليورال)، 2003	7.2	(5.1-10.1)	11.2	(7.4-16.5)	1.8	(0.9-3.6)	5.6	(4.3-7.3)	6.7	(5.0-9.0)	4.2	(2.5-6.9)	13.1	(10.3-16.6)	12.4	(9.6-15.8)	13.7	(9.7-18.9)
بوتسوانا، 2001	2.9	(1.9-4.5)	3.9	(2.5-5.9)	2.1	(1.1-4.1)	9.5	(7.6-12.0)	10.1	(7.2-13.9)	9.2	(7.0-12.0)	6.8	(5.2-8.8)	8.6	(6.2-11.8)	5.7	(3.9-8.2)
بوركتينا فاسو (أوغانديغو)، 2006	8.4	(6.3-11.1)	14.1	(10.4-18.7)	2.4	(1.3-4.3)	7.2	(5.6-9.1)	9.3	(7.1-12.1)	4.8	(3.0-7.5)	9.4	(6.8-12.7)	15.0	(10.7-20.6)	5.1	(3.5-7.4)
كوموروس، 2007	9.6	(6.8-13.4)	13.5	(8.3-21.3)	6.9	(3.7-12.6)	11.4	(8.5-15.1)	12.5	(8.3-18.4)	9.9	(6.5-14.8)	9.9	(6.8-14.2)	11.3	(6.3-19.4)	9.5	(6.1-14.4)
الكونغو، 2006	11.4	(7.7-16.6)	15.0	(9.8-22.2)	8.1	(4.3-14.7)	16.7	(12.7-21.6)	15.6	(12.1-19.9)	17.7	(12.5-24.4)	15.1	(12.0-18.8)	17.7	(12.7-24.0)	12.9	(9.4-17.3)
كوت ديفوار (أبيدجان)، 2003	13.6	(11.4-16.2)	19.3	(16.1-23.0)	7.1	(5.1-9.9)	5.1	(4.3-6.1)	5.6	(4.6-6.9)	4.4	(3.4-5.6)	11.2	(9.3-13.4)	13.0	(9.9-16.9)	9.9	(7.8-12.4)
ليبيريا، 2006	1.6	(1.2-2.0)	2.0	(1.5-2.7)	0.6	(0.2-1.4)	5.5	(4.4-6.9)	6.4	(5.0-8.2)	4.2	(3.0-5.8)	12.8	(11.1-14.8)	15.1	(12.9-17.7)	9.5	(7.7-11.7)
ليبيريا (أديس أمانا)، 2003	1.9	(0.8-4.3)	2.5	(1.1-5.3)	0.7	(0.2-2.4)	6.6	(4.1-10.6)	8.4	(4.8-14.3)	4.4	(2.6-7.4)	12.0	(10.0-14.3)	12.8	(10.1-16.0)	11.0	(8.8-13.6)
غانا، 2006	2.7	(1.9-4.0)	2.8	(1.7-4.7)	2.3	(1.4-3.5)	10.4	(7.8-13.7)	10.1	(7.3-13.8)	10.1	(7.6-13.2)	14.2	(11.1-18.1)	13.8	(10.5-17.9)	14.1	(11.1-17.8)
كينيا، 2001	6.6	(4.5-9.5)	8.7	(5.9-12.6)	4.7	(2.4-8.7)	8.9	(6.7-11.9)	9.0	(6.2-12.7)	8.9	(6.3-12.3)	21.2	(15.4-28.4)	22.8	(14.3-34.5)	19.8	(16.1-24.1)
ليسوتو، 2002	9.2	(6.6-12.6)	16.6	(12.4-21.9)	4.8	(3.4-6.9)	14.8	(12.7-17.2)	12.3	(9.5-15.7)	14.8	(12.6-17.3)	33.2	(27.9-38.9)	34.1	(27.0-42.0)	32.9	(27.5-38.7)
مالاوي، 2005	2.9	(1.8-4.7)	3.8	(2.2-6.4)	2.2	(1.3-3.6)	17.1	(13.0-22.2)	17.1	(14.0-20.8)	17.1	(10.8-25.9)	2.8	(2.0-3.9)	3.6	(2.2-5.7)	2.1	(1.1-3.8)
مالديف، 2001	23.5	(19.6-27.9)	41.8	(34.0-50.0)	4.6	(2.7-7.7)	9.1	(7.0-11.7)	13.1	(9.5-17.9)	4.8	(2.6-8.4)	7.9	(4.6-13.3)	9.2	(5.4-15.3)	7.1	(3.3-14.6)
موريتانيا، 2006	19.5	(16.3-23.2)	20.3	(17.5-23.4)	18.3	(13.4-24.5)	18.0	(14.4-22.2)	18.4	(14.3-23.4)	17.3	(12.1-24.1)	19.9	(16.8-23.4)	18.8	(15.6-22.5)	20.6	(16.2-26.0)
موريشيوس، 2003	13.2	(8.6-19.8)	19.8	(14.4-26.5)	7.7	(4.3-13.4)	NA†	NA	NA	NA	NA	NA	7.7	(5.7-10.2)	8.2	(5.7-11.6)	7.3	(4.1-12.7)
موزمبيق، 2002	3.1	(2.0-4.7)	5.0	(2.0-8.6)	1.4	(0.6-3.3)	5.8	(4.7-7.2)	5.4	(3.0-7.6)	6.0	(4.6-8.0)	28.1	(23.2-33.6)	26.1	(21.1-31.0)	20.3	(23.7-35.7)
ناميبيا، 2004	18.8	(16.5-21.4)	21.9	(18.9-25.2)	16.1	(13.3-19.3)	15.0	(12.6-17.6)	15.1	(12.3-18.4)	14.0	(11.5-16.9)	36.4	(32.2-40.7)	37.4	(31.3-44.0)	35.5	(30.8-40.5)
النيجر، 2006	6.3	(4.2-9.2)	11.7	(7.6-17.4)	1.1	(0.3-3.9)	6.6	(4.4-9.6)	6.1	(3.8-9.5)	7.0	(4.6-10.5)	11.5	(6.7-19.0)	15.6	(8.3-27.3)	8.1	(5.0-13.0)
نيجيريا (ولاية كروس وغيره)، 2000	7.0	(4.5-10.9)	7.7	(4.4-13.3)	3.3	(1.9-5.6)	14.0	(11.0-17.7)	18.6	(14.2-24.0)	9.4	(6.5-13.5)	19.8	(15.8-24.4)	20.1	(15.0-20.3)	17.7	(13.5-23.0)
السنگال، 2007	7.5	(4.6-12.1)	12.1	(7.6-18.9)	2.7	(1.3-5.4)	9.3	(5.5-15.3)	11.7	(8.4-15.9)	7.7	(3.0-18.0)	31.0	(20.0-44.6)	37.2	(24.4-52.2)	27.7	(17.6-40.8)

(11.2-21.4)	15.6 (12.1-25.2)	17.7 (12.9-20.9)	16.5 (3.5-8.4)	5.5 (9.5-17.4)	13.0 (7.0-12.3)	9.3 (18.7-30.0)	23.9 (23.3-37.4)	29.9 (21.9-32.2)	26.8
(12.3-17.2)	14.6 (12.2-21.4)	16.3 (12.7-18.1)	15.2 (10.1-14.0)	11.9 (12.6-17.3)	14.8 (11.6-14.7)	13.1 (8.3-13.4)	10.6 (16.7-26.1)	21.0 (12.9-17.0)	14.8
(6.5-8.3)	7.4 (7.4-11.0)	9.1 (7.0-9.0)	8.0 (5.8-8.2)	6.9 (7.1-10.1)	8.5 (6.5-8.7)	7.5 (2.5-4.2)	3.2 (7.8-10.2)	8.9 (4.9-6.4)	5.6
(1.2-4.3)	2.3 (1.3-4.4)	2.4 (1.8-3.6)	2.5 (3.6-5.8)	4.6 (3.4-8.6)	5.5 (4.2-6.0)	5.0 (0.2-0.8)	0.4 (2.0-7.6)	4.0 (1.0-3.7)	1.9
(5.9-11.2)	8.2 (6.6-13.6)	9.6 (6.7-12.2)	9.1 (5.2-10.4)	7.4 (9.3-15.7)	12.1 (8.5-12.8)	10.4 (1.1-2.6)	1.7 (5.1-15.6)	9.1 (3.6-10.2)	6.2
(3.5-7.5)	5.1 (6.3-10.4)	8.1 (5.4-8.3)	6.7 (11.0-16.5)	13.5 (11.5-16.4)	13.8 (11.9-16.2)	13.9 (2.7-5.8)	4.0 (5.2-8.5)	6.6 (4.2-7.1)	5.5
(24.2-44.7)	33.7 (29.1-45.4)	36.9 (28.4-43.0)	35.4 (12.2-23.9)	17.3 (12.7-22.8)	17.1 (14.0-22.0)	17.7 (4.6-15.9)	8.7 (6.3-13.9)	9.4 (6.7-12.6)	9.2
(14.2-21.0)	17.4 (17.0-24.8)	20.7 (16.4-21.1)	18.6 (3.4-6.8)	4.8 (5.2-13.5)	8.4 (4.5-9.6)	6.6 (1.8-5.7)	3.2 (4.0-9.4)	6.1 (3.1-7.0)	4.7
(22.0-28.0)	24.8 (20.4-25.7)	22.9 (21.9-26.1)	23.9 (5.6-8.2)	6.8 (10.5-14.7)	12.3 (8.2-11.0)	9.5 (12.8-17.7)	15.0 (11.3-16.1)	13.5 (12.4-16.6)	14.3
(7.5-12.1)	9.6 (9.4-16.7)	12.6 (9.5-13.9)	11.5 (8.0-14.7)	10.9 (10.1-17.5)	13.4 (9.9-15.4)	12.4 (2.3-8.2)	4.4 (1.7-4.3)	2.7 (2.4-5.4)	3.6
(26.3-45.3)	35.2 (15.7-25.5)	20.1 (22.0-32.7)	27.0 (1.6-6.1)	3.2 (6.8-12.4)	9.2 (4.4-8.8)	6.2 (22.1-32.1)	26.8 (13.3-22.0)	17.2 (18.3-26.0)	21.9
(13.7-25.9)	19.1 (16.2-27.1)	21.1 (16.9-23.9)	20.2 (5.5-9.9)	7.4 (7.4-11.8)	9.4 (6.9-10.3)	8.4 (2.1-6.6)	3.7 (3.8-10.1)	6.2 (4.0-6.7)	5.2
(10.7-18.0)	13.9 (17.9-25.8)	21.6 (15.3-19.7)	17.4 (6.8-11.0)	8.7 (8.2-16.8)	11.9 (7.8-13.4)	10.3 (4.3-9.4)	6.4 (5.5-10.4)	7.6 (5.6-8.7)	7.0
(13.1-23.6)	17.7 (16.9-23.2)	19.9 (15.8-21.8)	18.6 (3.8-8.9)	5.9 (6.7-15.3)	10.2 (6.1-10.4)	8.0 (7.1-15.0)	10.4 (15.0-23.5)	18.9 (11.6-18.5)	14.7
(18.8-28.2)	23.2 (22.6-31.9)	27.0 (22.0-28.3)	25.0 (5.7-8.3)	6.9 (7.8-11.5)	9.5 (7.0-9.7)	8.2 (9.3-15.3)	12.0 (16.5-24.7)	20.3 (13.4-19.6)	16.3
(19.7-26.0)	22.7 (7.9-15.0)	11.0 (15.2-21.0)	17.9 (2.2-5.0)	3.3 (7.0-14.0)	10.0 (4.8-7.7)	6.1 (9.6-17.1)	12.9 (6.5-12.5)	9.1 (10.0-15.1)	12.3
(6.5-15.3)	10.1 (4.7-17.0)	9.1 (6.8-14.0)	9.9 (5.5-12.8)	8.4 (4.5-15.0)	8.3 (5.5-12.0)	8.2 (1.1-6.7)	2.8 (1.7-9.2)	4.1 (2.0-5.9)	3.5
(38.2-58.3)	48.2 (35.1-45.6)	40.3 (38.7-49.3)	43.9 (2.8-5.4)	3.9 (3.7-8.9)	5.8 (3.6-6.6)	4.9 (32.1-46.9)	39.2 (21.7-34.5)	27.6 (27.6-40.7)	33.9
(27.3-40.3)	33.5 (19.2-29.1)	23.8 (24.5-33.2)	28.6 (2.9-6.3)	4.3 (4.7-7.6)	5.9 (4.2-6.2)	5.1 (29.5-37.5)	33.4 (27.5-34.8)	31.0 (29.0-35.6)	32.2
(18.7-26.1)	22.2 (13.7-20.1)	16.7 (17.5-21.4)	19.4 (3.3-5.6)	4.2 (5.3-8.4)	6.7 (4.8-6.4)	5.5 (14.4-19.6)	16.8 (12.9-19.0)	15.7 (14.3-18.8)	16.4
(8.5-16.0)	11.7 (4.8-10.8)	7.3 (7.1-12.6)	9.5 (3.3-9.7)	5.7 (3.0-11.8)	6.0 (3.3-10.0)	5.8 (6.5-11.9)	8.8 (8.3-15.1)	11.2 (7.6-13.1)	10.0
(8.5-15.4)	11.5 (11.9-20.7)	15.8 (11.3-16.7)	13.8 (4.5-8.9)	6.3 (9.0-15.9)	12.0 (7.6-11.4)	9.3 (7.0-13.0)	9.6 (8.1-16.9)	11.8 (9.0-14.7)	11.5
(10.2-18.4)	13.8 (11.2-19.3)	14.4 (11.0-17.0)	14.1 (6.0-9.0)	7.4 (10.6-16.8)	12.0 (9.6-11.9)	10.0 (4.0-8.2)	6.8 (6.0-9.0)	7.3 (6.4-7.9)	6.6
(14.0-22.5)	17.8 (17.5-37.3)	26.2 (17.9-25.2)	21.3 (5.7-8.7)	7.1 (9.0-16.0)	12.1 (8.2-12.1)	10.0 (9.0-17.4)	12.6 (23.0-31.8)	27.2 (17.1-24.5)	20.5
(6.0-16.4)	10.0 (6.1-21.8)	11.8 (7.6-17.5)	10 (5.0-9.9)	7.0 (8.4-13.0)	10.5 (6.4-10.9)	8.4 (6.8-17.1)	10.9 (13.4-24.8)	18.4 (9.7-19.7)	14.0
(7.5-13.5)	10.2 (9.4-10.1)	11.7 (8.0-13.0)	10.9 (7.1-12.1)	9.5 (9.0-14.0)	11.0 (8.3-12.9)	10.5 (7.4-12.2)	9.5 (7.4-15.0)	10.9 (8.2-12.0)	10.2
(12.1-19.9)	15.6 (9.0-16.5)	12.3 (12.5-18.6)	15.3 (2.2-5.0)	3.3 (4.2-10.1)	6.6 (4.2-7.4)	5.6 (8.5-14.5)	11.2 (12.8-22.8)	17.3 (11.7-17.5)	14.3
(5.8-13.5)	8.9 (7.3-17.7)	11.5 (7.2-13.4)	9.9 (4.9-11.9)	7.7 (6.3-12.9)	9.1 (6.4-10.7)	8.3 (3.1-9.3)	5.4 (7.4-16.0)	11.0 (5.3-12.3)	8.1
(19.2-36.0)	26.8 (14.1-37.1)	23.7 (16.7-35.3)	24.9 (7.4-16.3)	11.1 (6.5-12.3)	9.0 (8.3-13.1)	10.4 (13.3-23.0)	17.7 (12.4-23.5)	17.2 (13.6-22.6)	17.6
(23.1-39.6)	30.7 (13.6-27.7)	19.7 (20.8-31.6)	25.9 (5.8-10.9)	8.0 (9.3-15.6)	12.1 (8.2-11.9)	9.9 (9.8-19.9)	14.1 (10.9-18.8)	14.4 (10.6-18.8)	14.2
(12.5-21.0)	16.3 (15.7-29.4)	21.8 (14.4-23.8)	18.7 (4.8-10.8)	7.2 (7.1-14.5)	10.2 (6.5-11.9)	8.9 (6.5-17.7)	10.9 (14.1-29.3)	20.6 (10.2-22.6)	15.4
(24.5-35.2)	29.6 (26.6-36.8)	31.5 (28.2-35.1)	31.5 (3.0-5.3)	4.0 (3.3-9.0)	5.5 (3.6-6.4)	4.8 (23.7-30.8)	27.1 (22.0-31.0)	26.3 (23.8-30.8)	27.1
	11.3	15.6	13.1	7.7	10.2	9.4	6.3	3.5	5.6
(12.3-23.4)	17.1 (20.1-35.3)	27.0 (17.0-26.3)	21.3 (3.9-11.3)	6.7 (9.8-16.5)	12.8 (7.0-12.9)	9.6 (12.6-23.6)	17.4 (21.4-30.3)	25.6 (17.2-25.8)	21.2
(11.7-17.9)	14.5 (10.1-17.2)	13.3 (11.4-16.7)	13.8 (6.0-10.1)	7.8 (8.3-14.6)	11.0 (8.4-11.5)	9.8 (7.8-15.6)	11.1 (10.4-20.2)	14.7 (9.7-17.7)	13.2
(23.1-30.5)	26.7 (17.8-26.4)	21.8 (21.5-26.8)	24.1 (7.9-12.8)	10.1 (7.1-13.5)	9.9 (8.0-12.4)	10.0 (15.0-22.7)	18.5 (14.3-25.3)	19.2 (15.5-23.4)	19.1
(22.3-40.8)	30.8 (23.3-38.5)	30.4 (24.2-37.8)	30.5 (4.4-11.3)	7.1 (5.0-13.0)	8.2 (5.9-10.4)	7.9 (13.1-21.7)	17.0 (15.3-27.7)	20.8 (15.1-24.0)	19.2
(15.5-28.8)	21.4 (14.9-30.7)	21.8 (15.6-28.8)	21.4 (2.8-10.4)	5.5 (6.0-15.2)	9.6 (4.9-11.7)	7.7 (5.0-15.8)	9.0 (2.8-11.0)	5.7 (4.3-12.3)	7.3
(9.7-16.6)	12.8 (13.8-25.9)	19.2 (12.5-19.3)	15.6 (9.6-15.2)	12.1 (10.5-20.0)	14.6 (11.2-16.5)	13.7 (0.9-4.1)	1.9 (4.2-11.3)	7.0 (3.0-7.0)	4.6
(12.4-20.7)	16.1 (11.8-24.2)	17.1 (13.6-20.7)	16.8 (5.7-12.2)	8.4 (8.4-19.6)	13.0 (7.2-14.3)	10.2 (7.4-12.4)	9.6 (12.2-23.1)	17.0 (10.4-15.3)	12.7
(14.2-21.2)	17.4 (17.9-28.6)	22.8 (16.8-23.0)	19.7 (7.1-12.9)	9.6 (8.2-15.2)	11.2 (8.2-13.0)	10.3 (6.6-13.4)	9.5 (9.8-21.7)	14.8 (9.0-15.9)	12.0
(14.9-23.3)	18.7 (13.0-26.5)	18.8 (14.8-23.4)	18.7 (3.2-6.2)	4.4 (2.7-7.1)	4.4 (3.3-6.0)	4.4 (2.7-8.2)	4.7 (6.3-13.5)	9.3 (5.2-9.1)	6.9
(11.9-20.6)	15.8 (8.5-16.3)	11.9 (11.6-17.7)	14.4 (6.1-12.1)	8.7 (6.2-12.6)	8.9 (6.8-11.5)	8.9 (6.9-15.1)	10.3 (10.9-19.6)	14.7 (9.9-16.7)	12.9
(23.7-27.4)	25.5 (22.8-26.0)	24.4 (23.7-26.2)	24.9 (6.4-8.4)	7.4 (12.4-15.9)	14.0 (9.5-11.9)	10.6 (12.2-15.8)	13.9 (10.5-13.9)	12.1 (11.5-14.6)	13.0
(28.9-37.5)	33.0 (15.0-21.0)	17.8 (23.0-28.8)	25.8 (4.6-8.0)	6.1 (8.1-13.0)	10.3 (6.6-9.4)	7.9 (20.1-26.0)	22.9 (13.5-19.8)	16.4 (18.0-22.6)	20.2
(11.5-18.6)	14.7 (14.6-20.8)	17.5 (14.0-18.6)	16.2 (2.3-5.7)	3.7 (6.8-11.4)	8.8 (4.9-7.7)	6.1 (2.4-5.5)	3.6 (2.0-4.6)	3.0 (2.5-4.6)	3.4
(10.7-17.1)	13.6 (8.4-14.0)	10.9 (10.5-14.8)	12.5 (5.5-8.3)	6.8 (8.3-13.3)	10.5 (7.3-10.4)	8.7 (6.6-10.7)	8.4 (4.3-8.4)	6.0 (5.8-9.3)	7.4

سيشلر، 2002
جنوب إفريقيا، 2002
موزمبيق، 2005
توانزيا وأروشا، 2003
ترغوا، 2007
أوغندا، 2007
زامبيا (لوساكا)، 2002
زامبيوي (هراري)، 2003
الأقليم الأمريكي
أنغولا وباربودا، 2004
الارخبنتين (العاصمة القبرالية)، 2003
أرهابا، 2004
بادوس، 2002
بنيزو، 2002
بريقيا (الاز)، 2003
أدازيل (روني جانزو)، 2005
أخو العنراء البريطانية، 2001
تشيلي (سانتياغو)، 2003
كولومبيا (بوغوتا)، 2001
كوسنا، 2002
كوبا (هافانا)، 2004
دومينيكا، 2004
جمهورية (الولايات)، 2004
الأكادور (كويت)، 2001
إلسلفادور، 2003
غريما، 2004
غواتيمالا (مدينة غواتيمالا)، 2002
هايتي، 2004
هايتي (بورتو برينس)، 2005
هندوراس (تيفوسيغال)، 2003
جماريكا، 2006
إدسليك (مدينة مكسيكو)، 2006
مونتسواتو، 2000
نكاراغوا (مسترو ماناغوا)، 2003
بنزما، 2002
الدراغواي (أسونسيون)، 2003
الدو (ليما)، 2003
بورتو ريكو، 2004
مدنت كينس ونيفيس، 2002
مدنت لوشيا، 2007
مدنت فيست وذي غرياديز، 2007
ساريتام، 2004
تو نيداد وتوباغو، 2007
الولايات المتحدة الأمريكية، 2004
الأوروغواي، 2007
أخو العنراء الأمريكية، 2004
فويلا، 1999

(10.9-17.8)	13.9 (16.9-23.6)	20.0 (14.5-19.8)	17.0 (7.1-11.7)	9.1 (11.7-17.7)	14.3 (10.1-14.3)	12.0 (1.2-3.5)	2.0 (5.4-10.1)	7.3 (3.5-6.9)	4.9
(5.0-15.4)	8.9 (4.8-16.2)	9.0 (5.6-13.6)	8.8 (1.6-6.4)	3.2 (3.8-12.3)	7.0 (3.6-9.5)	5.9	0 (4.5-12.7)	7.6 (2.7-8.6)	4.8
(17.5-24.7)	20.9 (19.7-33.4)	20.0 (19.0-27.1)	23.1 (8.0-13.8)	10.5 (10.3-24.0)	19.9 (12.6-18.3)	15.3 (2.2-6.7)	3.9 (14.5-20.8)	17.5 (8.3-13.4)	10.6
(12.4-22.1)	16.7 (17.9-27.4)	22.3 (16.6-23.2)	19.7 (6.4-14.3)	9.6 (9.4-16.0)	12.3 (8.8-14.0)	11.1 (1.3-5.4)	2.6 (5.3-13.6)	8.6 (4.0-9.0)	6.1
(10.9-18.0)	14.1 (18.7-26.5)	22.3 (15.7-21.3)	18.3 (5.1-8.6)	6.7 (9.5-15.8)	12.3 (8.1-12.4)	10.1 (0.9-2.3)	1.4 (4.4-7.9)	5.9 (2.7-5.8)	4.0
(12.0-18.4)	14.9 (12.3-20.8)	16.1 (13.0-18.5)	15.5 (6.9-14.3)	10.0 (9.3-17.2)	12.8 (9.1-14.9)	11.7 (1.6-5.4)	3.0 (6.3-14.6)	9.7 (3.9-10.9)	6.6
(7.5-10.5)	8.9 (14.5-19.8)	17.0 (10.8-13.7)	12.2 (6.9-11.0)	8.7 (13.0-19.5)	16.0 (10.2-14.4)	12.1 (0.6-1.6)	1.0 (2.3-4.5)	3.2 (1.4-2.8)	2.0
(7.1-17.1)	11.2 (13.4-22.4)	17.4 (10.9-18.4)	14.2 (5.9-12.5)	8.7 (10.5-17.4)	13.5 (9.2-14.0)	11.4 (1.1-3.9)	2.1 (13.6-31.0)	21.0 (6.6-20.4)	11.9
(17.2-23.9)	20.3 (15.9-27.5)	21.1 (17.6-24.1)	20.7 (6.3-10.4)	8.1 (8.2-13.4)	10.5 (8.3-10.9)	9.5 (4.9-10.3)	7.1 (9.9-17.5)	13.2 (7.9-13.3)	10.3
(13.8-18.3)	15.9 (16.2-23.2)	19.5 (15.3-19.4)	17.3 (9.9-13.9)	11.7 (15.0-20.1)	17.4 (12.3-16.9)	14.5 (3.0-6.9)	4.5 (14.2-21.7)	17.7 (7.7-15.1)	10.8
(16.9-22.9)	19.7 (17.3-27.1)	21.8 (17.4-24.2)	20.6 (32.5-39.1)	35.7 (40.8-48.6)	44.7 (37.8-42.3)	40.0 (4.2-7.5)	5.6 (8.5-16.3)	11.8 (6.8-10.8)	8.6
(11.5-19.3)	15.0 (18.0-26.9)	22.1 (15.2-22.3)	18.5 (4.1-7.7)	5.6 (5.2-14.0)	8.6 (5.4-9.5)	7.2 (0.3-2.5)	0.9 (4.9-11.9)	7.7 (2.9-7.2)	4.6
NA	NA	NA	(5.5-8.7)	6.9 (7.8-13.5)	10.3 (7.5-10.8)	9.0 (1.1-3.9)	2.1 (2.9-6.4)	4.3 (2.7-4.6)	3.5
(6.6-16.7)	10.7 (10.6-18.7)	14.2 (9.3-16.5)	12.5 (8.1-13.7)	10.6 (12.8-22.0)	16.9 (11.4-18.0)	14.4 (0.3-4.1)	1.2 (1.8-6.6)	3.5 (1.1-4.8)	2.3
(3.5-9.8)	5.9 (9.5-18.4)	13.3 (6.7-12.5)	9.2 (5.3-10.1)	7.3 (7.9-15.6)	11.2 (7.4-12.1)	9.5 (0.2-1.9)	0.6 (0.9-5.4)	2.3 (0.6-3.3)	1.4
(7.8-13.9)	10.4 (12.5-27.8)	19.0 (10.4-16.4)	13.1 (9.3-16.8)	12.6 (15.7-23.8)	19.4 (13.1-18.6)	15.6 (1.0-5.1)	2.3 (9.5-18.7)	13.4 (4.7-8.9)	6.5
(14.1-20.9)	17.3 (17.4-22.7)	19.9 (17.1-21.5)	19.2 (6.8-12.9)	9.4 (12.2-14.4)	13.3 (10.3-13.8)	11.9 (1.3-5.4)	2.6 (7.9-13.2)	10.2 (5.2-8.7)	6.7
(15.4-30.8)	22.2 (18.1-33.8)	25.1 (17.8-31.8)	24.1 (5.2-17.6)	9.8 (10.2-15.8)	12.7 (10.1-15.4)	12.5 (1.6-11.8)	4.5 (3.2-7.4)	4.9 (4.0-8.4)	5.8
(8.4-20.3)	13.2 (12.4-16.7)	14.4 (10.5-18.3)	13.9 (7.0-12.2)	9.3 (7.8-15.4)	11.0 (8.0-12.9)	10.2 (1.4-3.2)	2.1 (6.6-15.5)	10.2 (3.6-10.0)	6.0
(6.2-11.1)	8.3 (7.4-14.0)	10.3 (7.3-12.0)	9.4 (11.0-18.9)	14.5 (16.0-22.9)	19.2 (15.0-20.6)	17.6 (1.8-5.4)	3.1 (5.7-11.4)	8.1 (4.8-8.1)	6.3
(11.8-20.3)	15.5 (21.9-32.1)	26.7 (16.5-23.9)	19.9 (5.8-10.4)	7.8 (16.1-24.3)	19.9 (11.6-16.5)	13.9 (0.8-3.1)	1.6 (12.3-18.4)	15.1 (6.6-10.4)	8.3
(9.6-12.8)	11.1 (13.1-15.7)	14.3 (11.4-13.7)	12.5 (21.9-27.7)	24.7 (30.4-35.1)	32.7 (26.7-30.9)	28.8 (2.9-4.4)	3.6 (10.3-14.1)	12.1 (6.6-9.7)	8.0
(14.0-22.5)	17.8 (18.4-30.4)	23.9 (17.0-23.7)	20.2 (9.8-16.3)	12.7 (17.2-24.8)	20.8 (14.2-19.5)	16.7 (6.8-12.8)	8.7 (21.3-36.1)	27.6 (12.6-26.3)	19.0
(23.5-30.7)	26.9 (36.0-41.1)	38.5 (31.3-36.1)	33.7 (10.5-13.9)	12.1 (14.4-17.2)	15.7 (13.5-15.8)	14.6 (1.9-4.5)	3.0 (5.5-7.6)	6.5 (4.4-6.3)	5.3
(27.6-38.1)	32.7 (21.8-31.3)	26.3 (26.1-33.7)	29.8 (6.0-9.5)	7.5 (10.0-14.8)	12.1 (8.5-11.7)	10.0 (14.6-20.4)	17.4 (17.8-24.6)	21.0 (17.0-21.7)	19.2
(10.3-16.6)	13.1 (12.2-10.3)	16.5 (11.4-17.1)	14.0 (6.4-9.2)	6.7 (9.0-14.0)	11.5 (7.3-10.7)	8.9 (4.5-7.0)	5.0 (9.0-10.0)	11.9 (0.0-10.3)	8.3
NA	NA	NA	(0.9-4.3)	1.9 (6.9-14.4)	10.0 (4.4-7.0)	5.6 (0.4-2.2)	0.9 (7.7-13.5)	10.3 (3.9-6.6)	5.0
NA	NA	NA	(8.7-12.4)	10.4 (13.1-17.6)	15.2 (11.3-14.6)	12.9 (19.0-24.8)	21.7 (27.7-35.0)	31.2 (24.0-29.1)	26.5
(16.0-29.4)	23.5 (24.1-31.5)	27.7 (22.2-29.6)	23.8 (4.0-7.3)	5.4 (7.7-13.2)	10.1 (6.9-10.0)	8.3 (6.0-11.1)	8.4 (11.3-19.5)	15.0 (9.3-15.1)	11.9
(27.8-41.3)	34.3 (20.8-30.8)	25.5 (25.0-33.8)	29.2 (2.2-5.1)	3.3 (3.6-7.7)	5.3 (3.1-5.9)	4.3 (34.2-44.9)	39.4 (21.6-30.8)	26.0 (30.1-36.3)	33.1
(19.5-30.9)	24.7 (12.2-18.9)	15.3 (16.4-23.6)	19.7 (10.0-16.9)	13.0 (13.1-16.2)	14.6 (11.9-16.2)	13.9 (20.6-31.2)	25.6 (17.9-26.0)	21.7 (19.9-28.7)	24.1
(14.5-16.6)	15.5 (13.9-16.2)	15.0 (14.6-16.1)	15.3 (1.1-1.7)	1.3 (4.7-5.8)	5.2 (3.0-3.6)	3.3 (7.5-8.9)	8.2 (11.5-13.2)	12.3 (9.7-10.8)	10.3
(30.1-42.2)	35.9 (14.3-23.4)	18.4 (23.0-31.0)	26.8 (8.4-15.0)	11.2 (14.3-20.7)	17.2 (12.0-17.3)	14.5 (27.6-38.1)	32.7 (25.1-35.0)	29.8 (27.2-35.3)	31.1
(32.0-45.0)	38.3 (27.2-39.4)	33.1 (32.6-40.9)	36.6 (10.3-14.5)	12.2 (13.4-18.0)	15.5 (12.1-16.3)	14.1 (24.1-30.9)	27.4 (26.6-33.2)	29.8 (25.8-32.3)	28.9
(22.1-28.9)	25.4 (11.8-25.2)	17.5 (18.7-26.8)	22.5 (2.8-4.9)	3.7 (7.6-12.0)	9.6 (5.5-7.8)	6.5 (10.2-16.2)	12.9 (30.9-40.3)	35.5 (21.0-26.7)	23.7
(17.0-22.1)	19.4 (17.1-22.0)	19.4 (17.5-21.7)	19.5 (7.2-11.0)	8.9 (10.1-13.8)	11.8 (9.4-12.5)	10.9 (7.2-11.3)	9.0 (9.4-13.6)	11.3 (8.8-12.4)	10.4
(25.0-35.1)	29.8 (11.9-20.3)	15.6 (20.9-27.1)	23.9 (2.3-3.9)	3.0 (6.0-11.0)	8.2 (4.2-7.1)	5.5 (22.9-31.2)	26.8 (22.7-31.2)	26.7 (24.6-30.1)	27.2
(33.2-44.3)	38.6 (29.0-39.0)	33.8 (31.5-41.9)	36.5 (3.2-5.6)	4.2 (7.8-11.0)	9.3 (5.5-7.9)	6.6 (5.1-8.5)	6.6 (10.5-15.3)	12.7 (7.7-11.4)	9.4
(7.3-15.6)	10.8 (9.1-17.0)	12.5 (8.4-15.5)	11.5 (3.7-6.1)	4.8 (7.4-12.3)	9.6 (5.9-8.7)	7.2 (4.2-7.4)	5.6 (5.8-10.6)	7.9 (5.5-8.2)	6.7
(21.0-35.7)	27.8 (17.7-38.4)	26.8 (20.2-35.9)	27.4 (1.7-5.0)	2.9 (4.8-11.9)	7.6 (3.4-6.9)	4.8 (3.0-5.8)	4.2 (5.6-10.2)	7.6 (4.2-7.2)	5.5
(13.9-27.8)	20.0 (17.0-37.2)	25.8 (16.0-30.2)	22.3 (29.2-38.4)	33.6 (36.1-48.1)	42.0 (32.8-42.5)	37.5 (24.1-37.0)	30.2 (30.9-42.1)	36.3 (27.2-39.0)	32.9
(14.0-22.9)	18.1 (11.3-28.4)	18.3 (14.2-23.0)	18.2 (3.7-8.7)	5.7 (9.9-17.2)	13.2 (7.1-11.6)	9.1 (21.2-31.2)	25.9 (29.4-38.6)	33.8 (26.5-32.8)	29.6
(13.5-23.0)	17.7 (11.2-18.3)	14.4 (13.2-19.9)	16.3 (1.8-5.0)	3.0 (3.2-5.7)	4.3 (2.6-5.0)	3.6 (4.2-10.6)	6.8 (5.3-13.2)	8.5 (5.1-11.4)	7.7
NA	NA	NA	(3.2-5.6)	4.2 (9.5-17.0)	12.8 (6.4-10.5)	8.3 (4.4-8.2)	6.0 (18.5-28.2)	23.0 (11.0-16.9)	13.7
(13.9-20.2)	16.8 (16.2-24.4)	19.9 (15.9-20.9)	18.2 (2.8-5.8)	4.1 (2.9-5.6)	4.1 (3.2-5.3)	4.1 (3.2-7.6)	5.0 (4.2-8.6)	6.0 (4.1-7.7)	5.6
(22.2-31.5)	26.6 (16.5-25.4)	20.6 (20.6-27.6)	24.0 (3.6-6.5)	4.8 (6.6-12.2)	9.0 (5.6-8.7)	7.0 (14.1-20.5)	17.1 (15.1-25.1)	19.6 (15.7-22.0)	18.6
(22.6-46.9)	33.7 (12.9-28.9)	19.7 (19.4-39.7)	28.5 (3.4-5.3)	4.3 (5.4-10.8)	7.7 (4.5-7.6)	5.9 (11.4-17.7)	14.3 (16.1-28.0)	21.5 (14.0-21.9)	17.6

إقليم شرق المتوسط
أفغانستان (كابل)، 2004
البحرين، 2002
جيبوتي، 2003
مصر، 2005
قطاع غزة، 2005
إيران، 2003
العراق (كرديستان)، 2006
الأردن، 2007
الكويت، 2005
لبنان، 2005
ليبيا، 2007
المغرب، 2006
عمان، 2007
الباكستان (إسلام آباد)، 2003
قطر، 2007
السعودية، 2007
الصومال (أرض الصومال)، 2007
السودان، 2005
سوريا، 2002
تونس، 2007
الإمارات، 2005
السلطنة العمانية، 2006
اليمن، 2003
الإقليم الأوروبي
ألبانيا، 2004
أرمينيا، 2004
بيلاروسيا، 2004
البوسنة والهرسك، 2003
بلغاريا، 2002
كرواتيا، 2007
قبرص، 2005
جمهورية التشيك، 2007
إستونيا، 2003
جورجيا، 2003
اليونان، 2005
هنغاريا، 2003
كازاخستان، 2004
كوسوفو**، 2004
قرغيزستان، 2004
لاتفيا، 2007
ليتوانيا، 2005
مقدونيا، 2003
مولدوفا، 2004
مونتينيغرو، 2004
بولندا، 2003
رومانيا، 2004

(43.7-57.0)	50.3 (36.0-48.8)	42.3 (42.3-51.3)	46.8 (9.1-13.5)	11.1 (16.0-20.4)	18.1 (13.3-16.2)	14.7 (20.6-27.4)	23.9 (23.5-30.6)	26.9 (23.2-27.8)	25.4
(18.4-25.7)	21.8 (13.1-20.6)	16.5 (16.7-21.9)	19.2 (5.0-8.9)	6.7 (4.1-6.7)	5.3 (5.0-7.3)	6.0 (10.5-16.2)	13.1 (10.1-14.6)	12.2 (10.8-15.2)	12.8
(21.7-31.8)	26.4 (17.4-26.3)	21.5 (21.2-28.5)	24.7 (9.6-13.0)	11.2 (12.4-17.5)	14.7 (11.6-14.7)	13.1 (22.0-26.8)	24.3 (25.1-31.4)	28.1 (24.3-28.1)	26.4
(27.1-35.7)	31.3 (20.4-28.0)	24.0 (24.6-31.6)	28.0 (4.0-6.9)	5.2 (8.5-12.4)	10.3 (6.3-9.2)	7.6 (19.9-28.5)	23.9 (18.4-24.7)	21.4 (20.1-26.6)	23.2
NA	NA	NA	(1.8-6.3)	3.4 (4.9-12.9)	6.0 (3.9-9.2)	6.0 (0.3-0.9)	0.5 (0.9-2.5)	1.5 (0.7-1.7)	1.1
(4.6-6.1)	5.3 (7.3-9.2)	8.2 (6.5-7.5)	7.0 (1.1-1.9)	1.5 (3.8-5.1)	4.4 (3.0-3.9)	3.4 (2.9-4.3)	3.5 (8.2-10.9)	9.4 (6.1-7.9)	6.9
NA	NA	NA	(8.0-13.8)	10.5 (10.8-20.9)	15.2 (9.6-17.3)	12.9 (16.9-24.8)	20.6 (24.0-31.5)	27.6 (21.0-27.3)	24.0
(10.4-17.2)	13.4 (13.5-19.0)	16.1 (12.8-17.5)	14.9 (5.3-9.6)	7.1 (10.1-15.2)	12.5 (8.3-12.3)	10.1 (1.3-3.0)	2.0 (7.5-11.9)	9.5 (4.8-7.2)	5.9
(4.3-11.2)	7.0 (10.8-17.0)	13.6 (9.2-15.1)	11.8 (3.4-6.4)	4.7 (2.5-5.0)	3.6 (3.1-5.2)	4.0	0.0 (1.4-3.9)	2.3 (1.2-2.8)	1.8
(4.9-12.2)	7.8 (11.1-20.6)	15.2 (8.4-14.1)	11.0 (6.7-12.3)	9.1 (14.7-25.8)	19.7 (11.7-17.0)	14.2 (4.1-9.6)	6.3 (13.8-23.8)	18.3 (9.6-15.2)	12.1
(39.4-55.2)	47.2 (40.5-62.0)	51.3 (41.4-56.1)	48.8 (14.4-27.6)	20.2 (22.6-36.4)	29.0 (18.9-30.1)	24.1 (10.7-26.8)	17.3 (41.6-59.6)	50.6 (25.5-40.2)	32.4
(10.7-16.8)	13.5 (13.8-19.3)	16.4 (13.1-17.4)	15.1 (6.4-11.3)	8.5 (11.8-17.2)	14.3 (9.8-14.3)	11.9 (1.1-2.8)	1.8 (4.7-7.4)	5.9 (3.4-5.1)	4.2
NA	NA	NA	(1.5-3.7)	2.4 (3.6-7.7)	5.3 (2.8-5.1)	3.8 (1.2-2.8)	1.9 (18.5-30.3)	23.9 (9.5-14.5)	11.8
(6.0-14.3)	9.3 (7.3-15.3)	10.6 (7.5-13.3)	10.1 (2.5-10.5)	5.2 (6.5-15.9)	10.2 (5.5-12.3)	8.3 (1.1-8.5)	3.1 (6.4-12.6)	9.0 (4.8-9.8)	6.9
(18.0-25.2)	21.4 (20.0-29.6)	24.5 (19.5-26.2)	22.7 (1.6-6.0)	3.1 (6.7-12.0)	9.0 (4.1-7.8)	5.7 (2.3-4.5)	3.2 (15.5-23.2)	19.0 (8.3-12.6)	10.2
(1.5-10.2)	4.0 (0.8-8.7)	2.8 (1.3-8.6)	3.3 (0.0-0.3)	0.1	0.0 (0.0-0.6)	0.1 (0.2-0.9)	0.4 (13.1-16.1)	14.5 (7.0-9.7)	8.2
(2.1-5.4)	3.4 (4.0-8.4)	5.8 (3.5-6.1)	4.6 (4.4-7.6)	5.8 (5.6-11.2)	7.9 (5.4-8.9)	7.0 (0.6-2.9)	1.3 (1.8-4.9)	3.0 (1.5-3.7)	2.4
(4.0-23.0)	10.0 (7.6-9.9)	8.7 (5.5-17.3)	10.0 (3.9-6.0)	4.9 (8.7-12.3)	10.4 (6.6-9.0)	7.7 (3.6-6.4)	4.8 (15.2-20.0)	17.4 (10.0-13.7)	11.7
(10.1-15.7)	12.6 (11.7-18.6)	14.9 (11.3-15.8)	13.4 (4.7-8.0)	6.1 (5.4-9.7)	7.2 (5.4-8.3)	6.6 (6.6-11.0)	8.4 (15.4-22.2)	18.5 (11.2-16.0)	13.4
(12.7-22.4)	17.0 (10.5-32.2)	25.3 (16.7-25.2)	20.7 (4.0-8.3)	6.8 (0.3-15.6)	12.1 (7.2-11.4)	9.1 (11.7-10.2)	15.1 (14.6-22.8)	18.3 (12.9-10.9)	16.7
(2.1-7.1)	3.9 (7.5-14.0)	10.3 (5.4-9.2)	7.1 (1.5-5.9)	3.0 (1.9-5.6)	3.3 (2.0-4.8)	3.1 (0.0-1.6)	0.2 (2.4-8.6)	4.6 (1.3-4.6)	2.5
(2.0-5.0)	3.2 (4.9-9.9)	7.0 (3.4-7.0)	4.9 (1.7-6.5)	3.4 (3.4-5.9)	4.5 (2.9-5.4)	3.9 (0.3-1.8)	0.8 (1.4-5.2)	2.7 (1.0-3.0)	1.7
(19.2-37.9)	27.2 (7.4-21.3)	12.9 (14.2-20.9)	19.0 NA	NA	NA	(42.0-57.2)	49.0 (32.9-47.4)	99.9 (99.0-50.6)	45.1
(13.1-21.8)	17.0 (8.5-30.7)	16.9 (11.1-25.0)	16.9 (4.6-12.3)	7.6 (3.8-11.4)	6.7 (4.8-12.2)	7.7 (1.6-6.0)	3.1 (3.8-11.6)	6.7 (2.9-8.5)	5.0
(20.1-30.2)	24.8 (18.3-28.6)	23.0 (20.4-28.0)	24.0 (8.0-12.8)	10.1 (14.3-21.6)	17.7 (11.9-16.6)	14.1 (16.3-23.5)	19.7 (21.7-29.2)	25.3 (19.9-25.5)	22.6
(1.7-3.3)	2.4 (7.2-18.0)	11.0 (4.5-9.3)	6.5 (1.0-3.0)	2.2 (4.2-9.5)	6.3 (3.1-6.0)	4.3 (0.2-2.3)	0.7 (7.1-14.3)	10.2 (4.2-7.2)	5.5
(11.7-22.2)	16.3 (11.2-17.3)	14.0 (12.6-18.0)	15.1 (0.9-3.1)	1.7 (1.5-3.9)	2.4 (1.4-3.0)	2.1 (7.0-13.6)	9.8 (8.1-14.8)	11.0 (8.1-13.4)	10.4
(10.0-15.2)	12.4 (17.2-26.3)	21.4 (13.0-18.2)	15.5 (6.1-9.2)	7.5 (6.8-11.3)	8.8 (6.6-10.1)	8.1 (3.0-5.9)	4.2 (30.6-42.5)	36.3 (16.6-24.3)	20.2
(23.9-31.3)	27.4 (25.9-43.5)	34.1 (26.3-34.3)	30.1 (27.3-37.4)	32.1 (34.6-49.3)	41.8 (32.2-42.1)	37.0 (15.9-24.5)	19.8 (29.9-44.5)	36.9 (23.9-33.2)	28.3
(10.6-16.0)	13.1 (15.2-19.5)	17.2 (12.5-16.5)	14.4 (5.4-8.6)	6.8 (7.9-11.4)	9.5 (6.7-9.5)	8.0 (2.7-5.7)	4.0 (10.9-18.7)	14.4 (6.4-11.2)	8.5
(17.6-43.6)	28.9 (14.2-20.2)	17.0 (17.7-27.5)	22.2 (4.4-10.4)	6.8 (3.4-9.1)	5.6 (4.1-9.3)	6.2 (18.2-30.8)	23.9 (9.4-17.7)	13.0 (13.9-23.0)	18.0
(15.7-26.2)	20.4 (16.4-28.6)	21.9 (17.2-25.6)	21.1 (34.6-42.2)	38.3 (48.6-55.9)	52.3 (42.2-48.4)	45.3 (28.2-34.9)	31.5 (23.6-29.9)	26.6 (26.6-31.7)	29.1
(11.9-24.6)	17.4 (14.7-28.5)	20.7 (14.4-24.0)	18.8 NA	NA	NA	(18.1-27.8)	22.6 (26.9-35.5)	31.0 (23.3-30.3)	26.7
(10.4-20.8)	14.8 (12.1-25.5)	17.8 (12.2-20.8)	16.0 (9.1-13.5)	11.1 (17.3-25.6)	21.1 (13.2-18.9)	15.9 (30.0-42.0)	35.8 (47.3-56.8)	52.1 (39.4-48.2)	43.8
(9.6-13.8)	11.5 (11.9-18.5)	14.9 (11.0-14.9)	12.8 (5.7-9.2)	7.2 (6.2-11.0)	8.2 (6.3-9.5)	7.7 (9.3-14.9)	11.8 (19.7-27.5)	23.4 (14.7-20.4)	17.3
(18.5-31.9)	24.6 (21.8-36.5)	28.6 (22.3-32.0)	26.9 (9.5-19.0)	13.5 (13.6-27.1)	19.5 (12.4-20.6)	16.1 (8.2-19.2)	12.7 (10.3-24.0)	16.0 (11.5-19.8)	15.2
(7.5-9.7)	8.6 (7.8-10.8)	9.2 (8.1-9.8)	8.9 NA	NA	NA	(6.2-9.1)	7.5 (8.8-12.4)	10.5 (8.1-10.3)	9.1
(15.5-22.8)	18.9 (12.1-18.6)	15.1 (14.8-19.9)	17.2 (3.5-5.4)	4.3 (3.2-6.6)	4.6 (3.9-5.7)	4.7 (3.9-7.3)	5.3 (6.4-9.7)	7.9 (5.7-8.1)	6.8
(12.6-13.1)	12.8 (18.0-18.7)	18.4 (14.4-14.8)	14.6 (22.1-22.6)	22.4 (33.0-33.7)	33.3 (26.9-27.3)	27.1 (21.9-22.4)	22.1 (32.9-33.6)	33.2 (26.4-26.8)	26.6
(34.3-38.5)	36.4 (39.8-45.6)	42.7 (37.0-40.4)	38.7 (18.1-21.2)	19.6 (32.0-36.3)	34.1 (24.4-26.9)	25.6 (10.1-12.7)	11.4 (26.1-30.3)	28.2 (17.0-19.4)	18.2
(1.7-4.9)	2.8 (5.5-12.1)	8.2 (3.2-7.3)	4.8 (0.1-2.2)	0.5 (0.5-6.4)	1.9 (0.5-2.9)	1.2 (0.3-2.1)	0.8 (0.8-3.0)	1.5 (0.8-2.0)	1.2
(15.5-22.7)	18.8 (16.2-23.0)	19.3 (16.6-22.0)	19.1 (5.8-9.8)	7.5 (9.9-15.0)	12.2 (8.4-12.1)	10.1 (5.4-8.7)	6.8 (9.8-14.9)	12.1 (7.9-11.3)	9.5

2004	روسيا الاتحادية،
2003	سوريا،
2003	بنغلاديش،
2003	بنغلاديش،
2004	باكستان،
2003	تركيا،
2005	أوكرانيا،
	إقليم جنوب شرق آسيا
2004	بنغلاديش (دكا)،
2006	بنغلاديش،
2006	بنغلاديش،
2006	بنغلاديش،
2004	بنغلاديش،
2001	بنغلاديش،
2004	بنغلاديش،
2003	بنغلاديش،
2005	بنغلاديش،
	إقليم غرب المحيط الهادئ
2005	بنغلاديش،
2003	بنغلاديش،
2005	بنغلاديش،
2005	بنغلاديش،
2003	بنغلاديش،
2005	بنغلاديش،
2002	بنغلاديش،
2003	بنغلاديش،
2005	بنغلاديش،
2003	بنغلاديش،
2007	بنغلاديش،
2003	بنغلاديش،
2007	بنغلاديش،
2004	بنغلاديش،
2005	بنغلاديش،
2007	بنغلاديش،
2007	بنغلاديش،
2007	بنغلاديش،
2000	بنغلاديش،
2005	بنغلاديش،
2006	بنغلاديش،
2007	بنغلاديش،
2003	بنغلاديش،
	الجموع

*95% من فترة الاستبيان

أَسْوَال لَمْ يُطْرَح

§ ممتلكات المملكة المتحدة

¶ ممتلكات الولايات المتحدة

****** إقليم خاضع لإدارة الأمم المتحدة
†† إقليم خاضع لإدارة صينية خاصة
§§ كومنولث في اتحاد سياسي مع الولايات المتحدة

الجدول 5 - معدل التعرض لدخان الآخرين، ودعم إجراءات الحظر على التدخين في الأماكن العامة والتعرض للإعلان عن التبغ بصورة غير مباشرة بحسب إقليم المنظمة والدولة العضو أو المنطقة أو الإقليم الجغرافي أو الإقليم الذي تديره الأمم المتحدة، أو الإقليم ذي الإدارة الخاصة، أو الكومنولث - الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب، 2000-2007

إقليم المنظمة والدولة العضو والمنطقة أو الإقليم ذو الإدارة الخاصة والسنة	المتعرضون للدخان الناجم عن الآخرين في المنزل خلال الأسبوع السابق للمسح	المتعرضون للدخان في الأماكن العامة خلال الأسبوع السابق من المسح	الذين يفضلون حظر التدخين في الأماكن العامة	الذين يحملون أداة موسومة بشعار السجارة أو التبغ	الذين سبق أن غرض عليهم سيجارة مجانية من قبل أحد ممثلي شركات التبغ
% (CI*)	% (CI)	% (CI)	% (CI)	% (CI)	% (CI)
الإقليم الإفريقي	27.6 (23.8-31.9)	43.7 (39.6-47.9)	58.9 (53.0-64.6)	18.0 (15.1-21.3)	12.2 (9.8-15.1)
الجزائر (م.م.م.م.م.م.)، 2007	38.7 (35.8-41.6)	60.2 (56.4-63.9)	87.3 (84.5-89.7)	7.0 (6.1-10.0)	6.4 (5.6-7.4)
بنين (أنتيك ليتورال)، 2003	21.5 (18.3-25.0)	38.0 (34.4-41.8)	76.5 (71.4-81.0)	20.0 (16.3-24.3)	5.1 (4.0-6.5)
بوتسوانا، 2001	33.0 (29.8-36.3)	52.5 (48.1-56.8)	70.3 (65.4-74.8)	12.2 (9.8-15.0)	12.8 (10.4-15.7)
بوركينافاسو (أوغادوغو)، 2006	32.9 (20.9-37.1)	40.0 (44.1-53.5)	89.2 (86.0-91.4)	23.0 (19.7-26.7)	8.7 (6.4-11.7)
كوموروس، 2007	35.2 (30.4-40.2)	58.3 (50.3-65.9)	78.8 (68.1-86.6)	20.1 (16.4-24.3)	6.4 (4.1-9.9)
الكونغو، 2006	22.8 (19.2-26.9)	44.8 (39.9-49.8)	70.3 (65.1-75.1)	21.7 (17.4-26.8)	11.0 (8.8-13.7)
كوت ديفوار (أبيدجان)، 2003	44.2 (41.0-47.5)	69.7 (65.8-73.3)	84.9 (82.3-87.3)	15.4 (13.3-17.9)	7.1 (5.7-8.8)
إريتريا، 2006	18.4 (16.6-20.3)	37.3 (33.7-41.0)	57.9 (54.1-61.5)	18.1 (16.6-19.7)	9.9 (8.1-12.1)
إثيوبيا (أديس أبابا)، 2003	14.9 (11.3-19.3)	41.2 (37.4-45.0)	95.7 (93.4-97.3)	12.6 (9.3-16.9)	NA†
غانا، 2006	15.9 (13.7-18.5)	31.6 (29.7-33.5)	54.2 (45.2-63.0)	12.5 (11.2-14.0)	11.1 (9.4-13.1)
كينيا، 2001	27.2 (23.1-31.7)	43.2 (39.3-47.1)	39.8 (31.7-48.6)	21.6 (18.1-25.5)	15.0 (11.3-19.6)
ليسوتو، 2002	39.5 (36.7-42.3)	60.4 (57.7-63.1)	32.9 (25.5-41.1)	14.2 (11.2-17.9)	13.7 (10.4-17.9)
مالاوي، 2005	10.4 (8.4-12.8)	24.2 (20.2-28.7)	84.8 (80.5-88.3)	20.6 (17.4-24.2)	11.3 (9.3-13.6)
مالي (باماكو)، 2001	59.9 (54.8-64.9)	75.9 (69.0-81.7)	77.0 (68.4-83.7)	28.5 (20.9-37.6)	13.3 (10.2-17.1)
موريتانيا، 2006	42.7 (38.2-47.3)	53.6 (49.6-57.5)	58.2 (52.2-63.9)	27.8 (23.9-32.0)	23.3 (20.7-26.1)
موريشيوس، 2003	42.0 (36.8-47.3)	68.2 (62.3-73.5)	61.8 (56.0-67.3)	NA	9.3 (6.6-13.0)

(4.6-7.8)	6.0	(11.1-16.2)	13.5	(73.1-81.2)	77.4	(34.5-44.5)	39.4	(19.4-31.2)	24.8	موزمبيق، 2002
(17.9-22.0)	19.8	(13.7-18.6)	16.0	(30.5-37.9)	34.1	(55.8-61.1)	58.5	(36.9-43.7)	40.3	ناميبيا، 2004
	NA	(25.0-35.3)	29.9	(50.8-65.7)	58.4	(45.5-59.0)	52.3	(24.6-36.8)	30.3	النيجر، 2006
(10.9-17.1)	13.7	(21.9-27.8)	24.7	(55.2-64.9)	60.2	(43.9-55.4)	49.6	(29.2-39.9)	34.3	نيجيريا (ولاية أكروس ريفر)، 2000
(6.4-14.9)	9.8	(12.8-27.0)	18.9	(81.4-89.4)	85.9	(37.4-59.3)	48.3	(37.6-57.7)	47.6	السعودية، 2007
(5.4-10.6)	7.6	(15.5-21.1)	18.2	(56.6-72.2)	64.8	(56.9-64.8)	60.9	(40.0-46.7)	43.3	سبيلنر، 2002
(11.8-16.2)	13.9	(14.4-18.8)	16.5	(55.3-63.5)	59.4	(40.4-46.6)	43.4	(31.3-38.6)	34.9	جنوب إفريقيا، 2002
(10.0-11.7)	10.9	(9.3-10.7)	10.0	(22.1-30.5)	26.0	(48.3-53.4)	50.9	(21.4-24.7)	23.0	سوازيلاند، 2005
(2.7-5.5)	3.9	(14.4-19.2)	16.6	(64.5-75.2)	70.2	(18.1-29.5)	23.3	(14.8-22.1)	18.2	توانيا (أروشا)، 2003
(5.1-9.2)	6.8	(19.7-30.8)	24.8	(80.5-90.4)	86.2	(36.3-47.0)	41.6	(17.4-23.4)	20.2	توغو، 2007
(8.3-12.8)	10.3	(10.5-14.2)	12.3	(43.3-53.4)	48.3	(42.3-49.0)	45.6	(16.5-24.1)	20.0	أوغندا، 2007
(11.4-18.6)	14.7	(14.6-21.8)	17.9	(42.6-57.0)	49.8	(37.3-44.6)	40.9	(25.2-33.9)	29.4	زامبيا (نوساكا)، 2002
(6.0-9.5)	7.6	(6.7-10.4)	8.3	(36.4-51.4)	43.7	(53.6-59.2)	56.4	(24.6-30.4)	27.4	زيمبابوي (هراري)، 2003
(9.2-13.1)	11.0	(15.3-18.2)	16.8	(79.0-84.6)	82.0	(52.1-57.8)	54.9	(38.2-44.1)	41.1	الاقليم الأمريكي
(7.6-10.9)	9.2	(9.6-14.3)	11.8	(68.6-75.7)	72.3	(36.1-44.7)	40.3	(15.3-21.0)	18.0	أنغيوا وباربودا، 2004
(10.4-15.1)	12.6	(12.2-16.1)	14.0	(64.0-67.5)	65.8	(79.9-85.2)	82.7	(57.5-64.6)	61.1	الأرجنتين (العاصمة الفيدرالية)، 2003
(6.9-12.6)	9.3	(13.1-18.4)	15.6	(64.3-78.0)	71.6	(45.7-56.4)	51.1	(17.5-26.4)	21.6	البحرين، 2004
(7.9-11.7)	9.7	(12.8-18.9)	15.6	(71.6-82.0)	77.2	(48.2-54.4)	51.3	(19.3-25.9)	22.4	باربادوس، 2002
(6.7-11.7)	8.9	(10.8-18.8)	14.4	(42.8-61.4)	52.2	(56.3-64.2)	60.3	(28.0-37.5)	32.6	بيرو، 2002
(11.7-14.4)	13.0	(12.7-18.2)	15.3	(78.3-85.1)	82.0	(40.5-56.3)	62.9	(31.1-37.7)	34.3	بنينا (لاز)، 2003
(5.8-9.3)	7.4	(4.6-7.2)	5.8	(83.8-89.3)	86.8	(47.2-52.8)	50.0	(31.2-39.0)	35.0	البرازيل (ريو دي جانيرو)، 2005
(4.0-10.6)	6.5	(6.8-13.8)	9.8	(71.5-85.6)	79.5	(37.8-48.9)	43.3	(7.3-14.5)	10.4	الجزر العذراء البريطانية، 2001
(7.1-10.6)	8.7	(7.0-11.5)	9.6	(67.2-74.7)	71.1	(67.1-72.3)	69.8	(57.0-64.2)	60.0	بنمالي (سانتيمو)، 2003
(20.5-26.0)	23.2	(14.0-18.5)	16.1	(76.6-81.1)	78.9	(58.0-63.1)	60.6	(41.1-46.1)	43.6	كولومبيا (بوغوتا)، 2001
(5.2-7.2)	6.1	(11.3-14.3)	12.7	(78.8-84.1)	81.6	(48.4-53.5)	51.0	(27.2-31.7)	29.4	كوستاريكا، 2002
(5.0-7.0)	6.2	(12.0-15.9)	13.5	(81.4-87.2)	84.5	(60.2-69.4)	65.0	(58.1-66.6)	62.4	كوبا (هافانا)، 2004
(9.0-14.0)	11.2	(13.7-18.6)	16.0	(68.5-77.1)	73.0	(56.8-63.6)	60.2	(23.0-29.8)	26.3	دومينيكا، 2004
(7.4-9.9)	8.6	(9.3-12.2)	10.7	(83.9-87.5)	85.8	(38.7-45.1)	41.9	(29.9-36.4)	33.1	جمهورية الدومينيكان، 2004
(10.7-14.8)	12.6	(11.4-20.1)	15.2	(75.9-83.7)	80.1	(52.9-60.7)	56.9	(31.9-40.6)	36.1	الإكوادور (كويتو)، 2001
(8.3-10.9)	9.5	(7.8-10.8)	9.1	(84.5-91.2)	88.3	(27.6-52.7)	39.5	(10.8-20.0)	14.8	إلسلفادور، 2003
(11.7-15.4)	13.4	(9.3-14.4)	11.6	(73.6-81.2)	77.7	(58.0-65.5)	61.8	(24.7-30.1)	27.3	غواتمالا، 2004
(11.2-15.9)	13.4	(10.6-15.5)	12.9	(74.3-81.7)	78.2	(45.7-53.1)	49.4	(31.8-41.1)	36.3	غواتيمالا (مدينة غواتيمالا)، 2002
(9.4-16.4)	12.5	(10.4-16.1)	13.0	(63.6-77.2)	70.9	(56.4-65.6)	61.1	(29.2-37.9)	33.4	غوايانا، 2004
(11.6-16.6)	13.9	(10.8-22.8)	15.9	(58.8-76.6)	68.4	(38.0-48.6)	43.2	(27.0-38.1)	32.3	هايتي (بورت أوبريس)، 2005
(9.8-14.2)	11.8	(9.8-16.5)	12.8	(78.4-85.2)	82.1	(36.5-48.2)	42.2	(26.2-33.3)	29.6	هندوراس (تيفوسيجالبا)، 2003
(8.7-13.0)	10.6	(10.9-17.8)	14.0	(57.6-80.7)	70.5	(56.6-64.4)	60.5	(28.1-37.4)	32.5	جامايكا، 2006
(8.7-14.6)	11.3	(18.2-23.8)	20.9	(83.3-88.6)	86.2	(57.2-63.1)	60.2	(42.5-50.0)	46.2	المكسيك (مدينة مكسيكو)، 2006
	11.0		12.6		88.3		43.4		18.1	مونتسرات، 2000
(11.7-16.9)	14.1	(10.2-15.2)	12.5	(80.5-86.8)	83.9	(51.5-56.7)	54.1	(38.0-49.5)	43.7	نيكاراغوا (منترومانغو)، 2003
(6.1-10.8)	8.1	(10.0-14.5)	12.0	(76.4-84.0)	80.5	(49.0-54.6)	51.8	(29.1-35.0)	32.0	بناما، 2002
(21.4-27.1)	24.1	(18.1-24.2)	21.0	(74.4-81.2)	78.0	(63.7-68.9)	66.3	(40.0-44.8)	42.4	الباراغواي (أسونسيون)، 2003
(7.3-12.8)	9.7	(9.9-15.8)	12.5	(81.3-89.5)	85.9	(36.2-47.5)	41.7	(22.4-27.9)	25.1	البيرو (ليما)، 2003
	NA	(6.5-12.2)	8.9	NA		(30.3-39.2)	34.6	(28.0-37.3)	32.5	بوليفيا (ليكا)، 2004
(5.6-10.5)	7.7	(14.6-21.0)	17.6	(71.7-81.7)	77.1	(44.8-52.9)	48.8	(13.4-20.1)	16.5	سانت كيتس ونيفيس، 2002
(8.2-13.2)	10.4	(10.9-15.7)	13.1	(78.1-85.3)	81.9	(59.3-68.5)	64.0	(21.5-29.2)	25.2	سانت لوسيا، 2007
(9.5-14.2)	11.7	(10.3-14.9)	12.4	(64.9-78.1)	72.0	(54.8-64.4)	59.7	(27.8-35.3)	31.5	سانت فنسنت وجزر غرينادين، 2007
(7.5-15.6)	10.9	(15.2-22.2)	18.5	(87.8-93.5)	91.0	(59.0-69.0)	64.2	(45.5-53.9)	49.7	سورينام، 2004

(3.5-6.9)	4.9	(9.5-14.6)	11.8	(78.5-83.1)	80.9	(59.7-68.5)	64.2	(34.1-46.3)	40.1
	NA	(17.1-19.2)	18.2		NA	(52.4-57.4)	54.9	(38.5-43.9)	41.1
(5.8-7.9)	6.8	(9.5-12.2)	10.7	(82.4-85.8)	84.2	(66.0-71.1)	68.6	(47.7-53.3)	50.5
	NA	(12.1-16.6)	14.2		NA	(57.9-64.3)	61.2	(58.5-65.3)	61.9
(9.1-11.4)	10.2	(13.0-17.0)	14.9	(85.7-88.7)	87.3	(44.8-50.8)	47.8	(41.3-45.8)	43.5
(7.6-10.7)	9.0	(12.8-16.4)	14.5	(81-85.9)	83.6	(41.7-49.8)	45.7	(35.2-41.6)	38.3
(6.8-15.8)	10.5	(8.4-15.2)	11.4	(79.8-87.3)	83.9	(32.5-58.1)	45.0	(32.9-45.1)	38.8
(6.9-10.9)	8.7	(21.7-25.0)	23.3	(80.3-84.9)	82.7	(41.4-49.2)	45.3	(35.3-42.1)	38.7
(12.4-17.9)	14.9	(22.1-29.3)	25.5	(67.3-76.5)	72.1	(36.7-49.8)	43.2	(34.3-45.0)	39.5
(8.7-12.4)	10.4	(11.8-14.8)	13.2	(85.4-89.3)	87.5	(39.5-47.9)	43.7	(35.7-41.7)	38.7
(6.9-10.8)	8.6	(11.8-19.3)	15.2	(77.0-82.4)	79.8	(38.7-53.6)	46.1	(41.8-53.1)	47.4
(5.5-7.8)	6.5	(15.6-18.9)	17.2	(87.9-90.9)	89.5	(47.9-53.3)	50.6	(39.3-44.2)	41.7
(5.7-9.7)	7.4	(12.4-28.6)	19.2	(73.5-82.1)	78.1	(21.7-40.9)	30.4	(41.1-51.9)	46.5
(12.0-15.2)	13.5	(16.3-21.1)	18.6	(80.7-84.4)	82.6	(59.2-65.9)	62.6	(63.4-68.6)	66.0
(8.2-11.8)	9.9	(14.5-17.6)	16.0	(81.3-86.2)	83.9	(53.0-59.4)	56.2	(41.7-47.2)	44.4
(9.0-12.0)	10.4	(17.3-21.9)	19.5	(83.2-87.0)	85.2	(72.5-76.1)	74.4	(75.4-81.1)	78.4
(6.9-10.7)	8.6	(9.8-13.0)	11.3	(73.1-80.6)	77.1	(38.5-44.5)	41.5	(34.2-41.6)	37.8
(4.3-6.0)	5.0	(8.1-11.6)	9.7	(78.7-84.4)	81.7	(37.7-44.5)	41.1	(24.6-29.7)	27.1
(5.1-8.8)	6.7	(10.5-14.6)	12.4	(76.7-85.2)	81.3	(23.4-31.8)	27.4	(11.2-17.1)	13.9
(12.3-17.7)	14.8	(6.2-10.1)	7.0	(82.2-86.1)	84.6	(28.0-30.2)	33.0	(22.7-30.8)	26.6
(5.8-10.9)	8.0	(14.2-19.7)	16.8	(77.2-84.8)	81.3	(41.6-50.2)	45.9	(31.6-40.0)	35.7
(6.6-9.4)	7.9	(10.2-13.5)	11.7	(70.9-75.5)	73.2	(34.8-41.7)	38.2	(24.4-31.6)	27.9
(14.2-22.2)	17.9	(15.4-23.7)	20.1	(70.4-79.9)	75.4	(39.5-56.0)	40.7	(24.2-34.5)	29.1
(7.3-10.8)	8.9	(16.4-19.8)	18.0	(79.4-87.4)	83.8	(35.4-47.6)	41.4	(24.4-31.0)	27.5
(6.0-9.1)	7.4	(8.7-12.5)	10.5	(75.6-83.8)	80.0	(43.9-55.5)	49.7	(47.7-61.2)	54.5
(3.8-6.2)	4.8	(8.5-12.1)	10.1	(82.9-87.4)	85.3	(61.6-68.6)	65.2	(48.5-55.3)	51.9
(8.2-10.1)	9.1	(10.6-12.3)	11.4	(69.3-72.9)	71.2	(29.5-33.8)	31.6	(23.9-26.8)	25.3
(6.7-14.3)	9.9	(15.2-21.8)	18.2	(75.8-80.7)	78.3	(55.7-63.0)	59.4	(57.4-67.1)	62.4
(18.1-21.3)	19.6	(17.1-19.8)	18.4	(76.8-79.4)	78.1	(45.2-50.1)	47.6	(41.8-46.2)	44.0
(9.4-12.3)	10.7	(16-19.7)	17.8	(81.2-84.7)	83.1	(84.4-87.7)	86.1	(75.3-80.0)	77.8
(8.5-11.4)	9.9	(16.4-19.1)	17.7	(92.9-94.4)	93.7	(78.0-83.0)	80.6	(81.8-87.3)	84.8
(2.9-5.4)	4.0	(12.7-19.0)	15.6	(87.8-92.3)	90.3	(81.5-88.1)	85.1	(87.8-91.6)	89.8
(4.5-6.2)	5.3	(12.1-15.0)	13.5	(85.0-87.7)	86.4	(88.7-91.3)	90.1	(73.2-77.3)	75.3
(6.5-8.7)	7.6	(17.8-21.4)	19.5	(84.7-88.2)	86.6	(90.5-92.3)	91.4	(95.8-97.2)	96.5
(5.3-9.8)	7.2	(19.0-23.3)	21.0	(59.7-65.2)	62.5	(73.0-78.3)	75.7	(64.9-70.4)	67.7
(9.0-12.1)	10.5	(12.7-16.0)	14.3	(63.9-70.5)	67.3	(89.7-92.5)	91.2	(90.4-93.4)	92.0
(13.9-15.2)	14.6	(14.7-16.0)	15.3	(85.8-87.1)	86.5	(87.2-88.4)	87.8	(87.3-88.5)	87.9
(6.1-9.3)	7.5	(14.3-19.8)	16.9	(67.0-72.9)	70.1	(73.2-77.2)	75.2	(34.2-42.1)	38.0
(13.4-17.2)	15.2	(24.5-28.3)	26.3	(76.1-80.5)	78.3	(89.8-91.6)	90.7	(78.9-82.2)	80.6
(9.2-12.7)	10.8	(25.7-30.0)	27.8	(73.8-78.2)	76.1	(92.5-94.9)	93.8	(94.0-95.8)	95.0
(15.3-18.1)	16.7	(18.3-21.0)	19.6	(82.7-86.6)	84.8	(93.2-94.9)	94.1	(88.3-91.1)	89.8
(4.9-7.2)	5.9	(21.7-27.9)	24.7	(66.6-72.5)	69.7	(90.8-94.4)	92.8	(82.2-85.6)	84.0
(5.3-7.0)	6.1	(13.6-16.2)	14.8	(88.7-91.0)	89.9	(68.5-74.8)	71.8	(69.8-75.3)	72.7
(9.4 _ 13.9)	11.4	(15.9-21.2)	18.4	(92.2-94.6)	93.5	(69.6-75.7)	72.8	(81.7-86.4)	84.2
(8.2-13.4)	10.5	(10.6-15.7)	12.9	(89.1-92.8)	91.1	(60.5-69.1)	64.9	(59.4-69.1)	64.4
(5.3-8.9)	6.9	(25.8-29.8)	27.8	(76.2-82.4)	79.4	(70.5-74.9)	72.7	(52.1-58.1)	55.2
(4.1-6.5)	5.2	(14.4-18.2)	16.2	(63.5-68.7)	66.1	(62.4-66.7)	64.6	(40.0-46.3)	43.1

ترينيداد وتوباغو، 2007
الولايات المتحدة الأمريكية، 2004
الأوروغواي، 2007
الجزر العذراء الأمريكية، 2004
فنزويلا، 1999
إقليم شرق المتوسط
أفغانستان (كابل)، 2004
ألبانيا، 2002
ألبانيا، 2003
مصر، 2005
قطر، 2005
إيران، 2003
العراق (كركوك)، 2006
الأردن، 2007
الكويت، 2005
لبنان، 2005
ليبيا، 2007
المغرب، 2006
عمان، 2007
الأكسوتان (لام أباد)، 2003
قطر، 2007
السعودية، 2007
السنغال وأرض الصومال، 2007
السودان، 2005
سوريا، 2002
تونس، 2007
الإمارات، 2005
الضفة الغربية، 2005
اليمن، 2003
الإقليم الأوربي
ألبانيا، 2004
أرمينيا، 2004
بيلاروسيا، 2004
البوسنة والهرسك، 2003
بلغاريا، 2002
كرواتيا، 2007
قبرص، 2005
جمهورية التشيك، 2007
إستونيا، 2003
جورجيا، 2003
اليونان، 2005
هنگاري، 2003
كازاخستان، 2004
كمبوديا، 2004
قرغيزستان، 2004
لاتفيا، 2007
ليتوانيا، 2005

(8.1-11.6)	9.7	(28.7-35.2)	31.8	(82.8-89.7)	86.7	(76.9-83.0)	80.2	(90.2-93.2)	91.9	مقدونيا، 2003
(5.1-7.4)	6.1	(10.0-12.8)	11.3	(91.0-93.5)	92.4	(94.8-97.9)	96.7	(59.3-65.2)	62.3	مولدوفا، 2004
(19.7-23.7)	21.6	(23.5-27.9)	25.6	(84.3-88.9)	86.8	(84.6-87.8)	86.3	(95.0-96.9)	96.1	مونتينيغرو، 2004
(23.4-28.2)	25.7	(23.9-29.3)	26.5	(72.7-77.1)	75.0	(88.5-92.0)	90.4	(83.9-89.1)	86.7	بولندا، 2003
(9.3-14.2)	11.5	(17.1-27.4)	21.8	(83.1-88.7)	86.1	(78.6-84.1)	81.5	(88.2-92.2)	90.4	رومانيا، 2004
(8.2-11.3)	9.6	(13.4-16.1)	14.7	(80.9-84.1)	82.6	(88.3-90.4)	89.4	(73.4-79.1)	76.4	روسيا الاتحادية، 2004
(20.3-24.2)	22.2	(27.4-30.8)	29.1	(76.2-81.5)	79.0	(89.3-91.7)	90.6	(97.0-98.2)	97.7	صربيا، 2003
(6.3-8.8)	7.5	(23.9-28.5)	26.2	(73.4-77.6)	75.6	(84.5-86.9)	85.7	(77.1-81.7)	79.5	سلوفاكيا، 2003
(5.4-7.9)	6.5	(18.8-21.5)	20.1	(68.3-74.5)	71.5	(87.6-90.3)	89.0	(63.2-68.4)	65.9	سلوفينيا، 2003
(3.8-7.8)	5.5	(7.6-13.7)	10.2	(89.5-95.7)	93.2	(63.8-75.0)	69.7	(44.3-58.6)	51.5	طاجيكستان، 2004
(7.0-8.2)	7.6	(9.3-11.0)	10.1	(90.6-92.1)	91.4	(84.8-87.0)	85.9	(80.6-82.5)	81.6	تركيا، 2003
(8.8-11.6)	10.1	(24.0-28.2)	26.0	(81.5-84.7)	83.2	(82.0-86.5)	84.4	(67.3-72.8)	70.1	أوكرانيا، 2005
(8.4-11.6)	9.9	(7.8-10.9)	9.2	(74.2-80.4)	77.5	(45.3-51.6)	48.5	(31.3-37.4)	34.3	إقليم جنوب شرق آسيا
(6.6-8.9)	7.7	(5.7-9.0)	7.2	(92.8-95.6)	94.4	(42.7-50.8)	46.7	(31.6-36.0)	33.8	نمقلاند، (دكا)، 2004
(8.0-15.1)	11.1	(8.7-12.6)	10.5	(37.2-57.1)	47.0	(47.2-61.6)	54.5	(29.0-35.1)	31.9	بوتان، 2006
(15.7-29.6)	21.9	(28.0-41.3)	34.3	(35.9-44.0)	39.9	(64.3-74.8)	69.8	(56.4-69.6)	63.2	تيمور الشرقية، 2006
(7.8-11.0)	9.3	NA		(70.6-77.1)	74.0	(37.2-43.4)	40.3	(23.9-29.4)	26.6	الهند، 2006
(11.8-15.6)	13.6	(8.8-12.0)	10.3	(86.3-90.6)	88.6	(78.1-84.3)	81.4	(60.3-68.8)	64.7	إندونيسيا، 2006
(6.9-15.9)	10.6	(9.3-17.8)	13.0	(86.2-92.0)	89.5	(64.8-73.2)	69.2	(41.5-49.4)	45.4	مالديف، 2004
(15.3-19.1)	17.1	(12.2-16.6)	14.3	(79.7-85.0)	82.5	(40.5-48.2)	44.3	(37.2-44.3)	40.7	سنغافورة، 2001
NA		NA		(58.8-70.5)	64.7	(52.8-69.5)	61.5	(75.7-90.7)	84.7	نيبال (بيوتانغار)، 2004
(4.7-7.5)	5.9	(9.3-12.9)	11.0	(90.9-94.7)	93.0	(64.9-71.4)	68.3	(47.6-54.2)	50.9	سريلانكا، 2003
(1.7-3.6)	2.6	(0.3-1.6)	0.7	(89.1-91.8)	90.1	(64.0-71.4)	60.2	(45.9-52.0)	49.0	تايلاند، 2005
(6.8-9.5)	8.0	(11.1-14.5)	12.7	(81.6-85.5)	83.6	(61.3-66.8)	64.1	(47.7-53.6)	50.6	إقليم غرب المحيط الهادئ
	NA	(12.1-16.6)	14.2		NA	(57.9-64.3)	61.2	(58.5-65.3)	61.9	ساموا الأمريكية، 2005
(7.3-14.5)	10.3	(35.7-43.9)	39.7	(79.0-86.1)	82.9	(52.6-64.1)	56.5	(41.6-53.1)	47.0	كمبوديا، 2003
(4.2-7.0)	5.5	(7.2-12.3)	9.5	(55.9-61.4)	58.7	(31.9-38.8)	35.2	(44.0-50.0)	47.0	الفلبين (شنتهان)، 2005
(10.3-15.4)	12.6	(15.6-22.0)	18.6	(70.4-80.3)	75.7	(69.8-76.0)	73.0	(53.2-61.8)	57.6	جزر كوك، 2003
(5.4-9.5)	7.2	(10.6-16.1)	13.1	(35.4-43.0)	39.1	(51.4-62.1)	56.8	(43.2-51.0)	47.1	فيجي، 2005
	NA	(19.4-24.4)	21.8		NA	(68.6-74.2)	71.5	(56.3-62.4)	59.4	غوام، 2002
(8.1-12.7)	10.2		NA	(54.3-65.8)	60.2	(53.3-60.6)	57.0	(40.8-45.7)	43.2	لاوس (بلدية مينتيان)، 2003
(2.6-5.0)	3.6	(12.4-16.0)	14.1	(59.8-66.3)	63.1	(64.0-70.4)	67.3	(38.7-45.5)	42.1	ميكرونيا، 2005
(3.7-5.9)	4.7	(13.0-16.7)	14.7	(78.5-83.6)	81.2	(72.9-78.3)	75.7	(54.7-63.2)	59.0	مايزيا، 2003
(18.8-24.8)	21.7	(20.9-29.8)	25.1	(27.2-38.3)	32.5	(68.8-73.6)	71.3	(56.6-64.5)	60.7	ميكرونيسيا، 2007
(6.4-8.8)	7.5	(6.8-9.9)	8.2	(81.3-84.9)	83.2	(45.5-51.2)	48.4	(60.2-67.0)	63.7	منغوليا، 2003
	NA		NA		NA	(61.3-67.9)	64.6	(28.9-46.5)	37.3	نيوزيلندا، 2007
	NA		NA		NA	(70.6-75.2)	72.9	(55.6-60.3)	58.0	جزر مارشال الشمالية، 2004
	NA	(33.1-39.4)	36.2		NA	(25.7-32.3)	28.9	(43.9-51.2)	47.6	بالاو، 2005
(9.1-12.0)	10.5	(16.1-22.1)	18.9	(47.2-56.8)	52.0	(84.0-88.4)	86.4	(71.1-76.6)	73.9	بابوا غينيا الجديدة، 2007
(4.6-6.5)	5.5	(9.8-12.6)	11.1	(89.4-92.2)	90.9	(62.3-67.5)	65.0	(52.2-57.2)	54.7	الفلبين، 2007
(11.9-18.4)	14.8	(17.1-26.7)	21.5	(34.9-47.8)	41.2	(58.1-67.3)	62.8	(52.8-65.1)	59.1	ساموا، 2007
	NA		NA		NA	(63.7-66.4)	65.1	(33.7-36.7)	35.1	سنغافورة، 2000
(12.9-16.1)	14.4	(6.4-8.3)	7.3	(82.8-85.6)	84.2	(63.2-67.2)	65.2	(38.2-41.1)	39.7	كمبوديا الجديدة، 2005
(13.1-13.4)	13.3	(25.7-26.1)	25.9	(89.4-89.7)	89.5	(76.5-76.9)	76.7	(76.4-76.8)	76.6	توفالو، 2006
(12.5-14.6)	13.5	(16.7-18.9)	17.8	(34.9-37.7)	36.3	(74.6-77.1)	75.9	(57.9-60.8)	59.3	فانواتو، 2007
(3.9-9.1)	6.0	(7.8-17.3)	11.7	(88.9-93.8)	91.7		NA	(45.9-68.7)	57.7	فيتنام (هاتونج)، 2003
(8.5-11.8)	10.0	(13.2-16.8)	14.9	(75.3-81.1)	78.3	(52.0-58.1)	55.1	(39.5-45.5)	42.5	المجموع

*95% من فترة الامتحان

†سؤال لم يُطرح

§ممتلكات المملكة المتحدة

¶ممتلكات الولايات المتحدة

^^إقليم خاضع لإدارة الأمم المتحدة

††إقليم خاضع لإدارة صينية خاصة

§§كومنولث في اتحاد سياسي مع الولايات المتحدة

الجدول 6- معدل انتشار إجراءات الإقلاع عن التدخين والحصول على منتجات التبغ وشراؤها، والمناهج المدرسية المتصلة بالموضوع، بحسب إقليم المنظمة والدولة العضو والمنطقة أو الإقليم الجغرافي أو الإقليم الخاضع لإدارة الأمم المتحدة أو الإقليم ذي الإدارة الخاصة، أو الكومنولث - الترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب 2000-2007

إقليم المنظمة والدولة العضو والمنطقة أو الإقليم ذي الإدارة الخاصة، والسنة	مدخو السجائر الحاليون					
	الذين لم يرفض طلبهم شراء السجائر من محل تجاري بسبب سنهم خلال الشهر السابق للمسح		الذين اعتادوا شراء سجائرهم من محل تجاري		الراغبون في التوقف عن التدخين	
	(CI)	%	(CI)	%	(CI)	%
الإقليم الإفريقي	(51.5-60.6)	56.1	(46.9-77.3)	63.4	(24.7-45.7)	34.2
الجزائر (فلسطينية)، 2007	(67.4-77.7)	72.9	(46.4-74.8)	61.6	(43.8-56.4)	50.1
بنين (أنتياد، ليبريا)، 2003	(43.3-50.8)	47.0	+	—	(17.8-39.2)	27.2
بوتسوانا، 2001	(63.0-73.8)	68.7	—	—	—	—
بوركينا فاسو (أوغاندا غو)، 2006	(53.7-64.0)	58.9	—	—	(25.0-47.0)	35.2
كوموروس، 2007	(28.3-45.6)	36.5	—	—	(15.2-34.1)	23.4
الكونغو، 2006	(40.3-57.1)	48.6	(26.8-72.8)	49.7	(23.3-39.4)	30.7
كوت ديفوار (أسدجان)، 2003	(61.3-69.9)	65.7	(64.8-86.8)	77.7	(36.3-51.1)	43.6
إريتريا، 2006	(38.4-44.4)	41.4	—	—	(19.7-45.1)	31.0
إليوييا (أديس أبابا)، 2003	(53.8-65.5)	59.8	—	—	—	—
غانا، 2006	(47.2-51.7)	49.4	(36.1-71.5)	54.3	(23.5-46.8)	34.3
كينيا، 2001	(74.0-82.4)	78.5	(47.3-81.1)	66.3	(18.6-45.3)	30.3
ليسوتو، 2002	(34.6-43.7)	39.0	(42.8-78.6)	62.3	(23.7-38.0)	30.4
مالاوي، 2005	(54.7-65.1)	60.0	—	—	(19.6-40.3)	28.9
مالي (باماكوي)، 2001	(23.9-49.4)	35.6	(35.2-65.8)	50.5	(26.3-45.5)	35.3
موريتانيا، 2006	(35.5-43.8)	39.6	(45.4-69.4)	67.3	(26.6-38.6)	32.3

(44.0-58.6)	51.3	(38.4-80.1)	61.3	(41.7-60.0)	50.9	(50.4-68.0)	59.5	موريشيوس، 2003
(35.9-50.4)	43.0		—		—		—	موزمبيق، 2002
(28.7-33.8)	31.2	(60.0-79.6)	70.8	(25.9-36.7)	31.0	(65.4-80.1)	73.4	ناميبيا، 2004
(28.7-45.8)	36.8		—	(9.3-41.9)	21.4	(54.1-86.2)	73.1	النيجر، 2006
(37.1-47.3)	42.1		—	(23.6-62.8)	41.9		—	نيجيريا (ولاية كروس زيفر)، 2000
(49.8-60.7)	55.3		—	(24.0-53.2)	37.4	(45.6-93.3)	77.4	النيجال، 2007
(54.1-66.4)	60.4	(58.8-88.8)	77.1	(17.7-30.4)	23.4	(67.4-83.2)	76.1	نميشلفز، 2002
(40.2-47.9)	44.0	(52.2-77.6)	66.0	(45.2-61.1)	53.3	(59.5-73.1)	66.6	جنوب إفريقيا، 2002
(52.9-56.4)	54.6	(46.9-63.4)	55.3	(22.9-33.7)	28.0	(63.5-79.5)	72.2	سوازيلاند، 2005
(66.8-79.1)	73.4		—		—		—	توانيا (أروشا)، 2003
(33.4-55.7)	44.2		—	(13.7-33.5)	22.1	(69.8-85.2)	78.5	توغو، 2007
(67.2-73.7)	70.5		—	(12.8-26.9)	18.8	(57.1-80.8)	70.3	أوغندا، 2007
(41.3-51.9)	46.6		—	(11.7-33.7)	20.6		—	زامبيا (لويسكا)، 2002
(47.8-59.3)	53.6		—	(37.0-52.3)	44.5		—	زيمبابوي (هراتبي)، 2003
(50.0-58.3)	54.2	(64.1-82.6)	74.5	(16.3-24.4)	20.2	(47.3-59.0)	53.3	الإقليم الأمريكي
(40.7-46.9)	43.8		—		—		—	أنغيوا وباربودا، 2004
(12.4-27.1)	18.7	(81.3-92.5)	88.0	(51.8-73.6)	63.4	(34.8-51.7)	43.0	الأرجنتين، العاصمة (الغدا، ألي)، 2003
(43.2-55.5)	49.4		—	(8.0-40.7)	19.6		—	باهاماس، 2004
(37.5-45.4)	41.4		—	(5.3-15.9)	9.4	(31.9-75.8)	54.8	باربادوس، 2002
(51.1-63.3)	57.3		—	(15.3-27.9)	20.9	(63.0-85.7)	76.1	بنما، 2002
(44.4-54.0)	49.2	(70.6-85.4)	79.0	(46.9-59.2)	53.1	(51.0-69.6)	60.7	بوليفيا (لاپاز)، 2003
(33.4-42.7)	37.9	(95.3-98.6)	97.4	(32.8-48.3)	40.3	(27.0-52.9)	39.2	البرازيل (ريو دي جانيرو)، 2005
(40.3-52.8)	46.6		—		—		—	البحرين، العتراء، التريبيطانيق، 2001
(37.7-48.9)	43.2	(74.1-89.4)	83.1	(47.8-58.1)	53.0	(40.8-60.0)	50.4	تشيلي (سانتياغو)، 2003
(24.9-36.1)	30.2	(68.0-80.4)	74.7	(52.2-64.0)	58.2	(60.6-72.9)	67.1	كولومبيا (بوغوتا)، 2001
(41.2-51.2)	46.2	(60.1-77.4)	69.5	(31.5-44.2)	37.6	(45.4-62.0)	52.6	كوستاريكا، 2002
(84.3-89.9)	87.4	(41.8-85.3)	67.1	(35.5-53.0)	44.1	(47.1-66.0)	56.8	كوبا (هافانا)، 2004
(51.3-62.0)	56.8		—	(10.7-27.5)	17.6	(44.7-71.2)	58.6	دومينيكا، 2004
(52.3-59.8)	56.1	(53.0-83.1)	70.2	(12.1-27.7)	18.6	(31.6-69.9)	50.9	جمهورية الدومينيكان، 2004
(39.1-51.1)	45.0	(58.3-72.7)	65.9	(51.1-62.9)	57.1	(64.3-79.1)	72.3	إكوادور (كويتو)، 2001
(46.0-71.2)	59.2	(67.1-88.4)	79.7	(26.5-39.2)	32.5	(93.9-99.2)	97.7	إسلندادور، 2003
(41.9-52.3)	47.1		—	(13.4-27.4)	19.5	(51.5-76.2)	64.8	غرينادا، 2004
(42.0-56.4)	49.2	(60.1-86.9)	76.0	(47.1-69.0)	58.5	(51.6-70.7)	61.6	غواتيمالا (مدينة غواتيمالا)، 2002
(45.7-54.1)	49.9		—	(19.7-52.7)	34.4		—	غوايانا، 2004
(32.5-48.8)	40.4		—	(17.9-41.4)	28.2	(56.6-84.4)	72.6	هايتي (بورتاوبرينس)، 2005
(52.4-68.2)	60.6	(79.4-94.2)	88.8	(31.2-61.5)	46.0	(44.5-71.7)	58.8	هندوراس (تيغوسيغالبا)، 2003
(32.5-46.2)	39.1	(45.7-85.7)	69.2	(21.6-42.2)	30.9	(58.4-84.2)	73.3	جامايكا، 2006
(62.1-73.8)	68.2	(47.2-70.5)	59.3	(41.9-58.4)	50.1	(36.3-48.4)	42.2	المكسيك (مدينة مكسيكو)، 2006
	66.4		—		—		—	مونتسيرات، 2000
(55.1-75.6)	66.1	(61.0-88.8)	77.8	(21.3-40.3)	29.9	(44.5-74.3)	60.4	نيكاراغوا (منترومانانغو)، 2003
(60.8-68.3)	64.6	(57.6-88.1)	76.0	(36.2-56.5)	46.2	(41.6-66.4)	54.3	بناما، 2002
(63.5-75.1)	69.6	(79.7-92.8)	87.6	(38.6-55.6)	47.0	(37.3-58.0)	47.6	النبارغواي (أسونكيون)، 2003
(37.2-49.3)	43.2	(62.3-82.9)	73.9	(50.3-67.6)	59.3	(52.4-71.2)	62.2	النورو (ليما)، 2003
(44.8-61.6)	53.3		—	(5.2-29.9)	13.3		—	نورو (ليكو)، 2004
(36.4-46.2)	41.3		—	(5.2-40.0)	16.0		—	سانت كيتس ونيفيس، 2002
(43.2-53.7)	48.4		—	(8.9-24.8)	15.2	(41.0-72.9)	57.8	سانت لوسيا، 2007
(42.5-54.8)	48.6		—	(15.3-33.8)	23.3	(46.9-83.0)	67.5	سانت فينسنت ودي غرينادين، 2007

(43.5-51.8)	47.7	—	(15.5-33.8)	23.4	—	سورينام، 2004
(40.5-48.5)	44.5	—	(18.0-37.3)	26.5	(76.2-88.7)	83.4
(53.8-60.4)	57.1	(62.5-80.9)	72.6	(6.1-9.7)	(47.5-55.5)	51.5
(63.7-70.1)	67.0	(72.8-84.7)	79.4	(58.8-68.7)	(39.1-53.7)	46.3
(47.4-56.5)	51.9	—	(8.0-18.1)	12.2	(77.4-88.4)	83.6
(37.1-47.3)	42.1	(77.2-95.4)	89.3	(37.2-55.4)	(57.7-79.6)	69.8
(42.2-52.8)	47.5	(59.3-85.6)	74.7	(31.9-53.4)	(58.1-80.6)	70.5
(17.4-25.2)	21.0	—	—	—	—	—
(36.6-47.2)	41.8	(59.1-83.7)	73.2	45.6	(53.4-73.8)	64.3
(39.2-49.2)	44.1	—	—	45.1	(52.1-84.3)	70.8
(52.5-62.7)	57.7	(73.3-95.3)	88.2	42.6	(68.1-86.5)	78.7
(53.8-66.8)	60.5	—	—	36.1	(49.4-78.2)	65.2
(34.4-43.0)	38.6	—	—	53.8	(44.7-73.8)	60.1
(34.3-56.9)	45.3	(67.2-89.6)	80.8	46.9	(58.9-84.6)	73.7
(38.1-45.6)	41.8	(59.6-86.8)	75.7	40.2	(39.5-74.9)	58.2
(52.0-61.0)	56.5	—	—	15.9	(57.3-73.3)	65.7
(42.0-58.9)	50.9	(72.0-96.0)	88.7	22.5	(43.6-64.0)	54.0
(43.8-53.6)	48.7	—	—	14.1	—	—
(44.8-54.5)	49.7	—	—	29.8	—	—
(57.5-74.5)	66.5	—	—	—	—	—
(51.4-62.4)	57.0	—	—	—	—	—
(43.3-56.1)	49.7	—	—	29.2	(37.4-78.5)	59.6
(53.4-64.1)	58.8	(65.3-84.7)	76.4	47.5	(51.7-80.0)	71.7
(39.1-55.6)	47.3	—	—	40.3	—	—
(26.2-37.6)	31.6	(26.9-71.7)	49.1	45.0	(49.9-79.7)	66.4
(46.4-62.6)	54.6	(61.6-89.9)	79.1	28.4	(62.4-77.7)	70.6
(38.5-48.0)	43.2	(50.1-84.7)	70.2	43.9	(71.0-91.8)	84.0
(40.7-45.0)	42.8	(52.0-69.6)	61.2	32.3	(54.8-66.0)	60.5
(53.5-66.8)	60.3	(63.1-84.0)	75.0	27.5	(47.4-79.2)	64.9
(37.4-48.2)	42.7	(57.9-73.3)	66.0	44.1	(73.1-87.4)	81.3
(49.3-68.0)	63.8	(69.6-81.7)	76.3	61.7	(56.0-68.7)	62.5
(62.0-69.2)	65.7	(77.9-93.2)	87.4	52.8	(57.8-76.8)	68.0
(26.8-35.9)	31.1	—	—	72.3	(65.8-89.6)	80.3
(76.4-82.8)	79.8	(49.0-63.5)	56.4	47.0	(67.8-76.1)	72.1
(54.6-65.1)	60.0	(86.0-95.6)	92.0	57.1	(51.4-62.6)	57.1
(56.9-67.2)	62.2	(66.0-81.5)	74.5	61.9	(53.6-67.1)	60.5
(70.3-76.8)	73.7	(66.0-76.3)	71.5	55.5	(37.6-44.9)	41.2
(47.6-49.5)	48.6	(88.8-94.3)	92.0	51.4	(44.9-52.2)	48.6
(49.8-60.6)	55.3	(69.7-83.1)	77.1	39.6	(47.7-57.5)	52.6
(55.5-62.4)	59.0	(58.1-70.6)	64.6	41.2	(55.2-66.6)	61.0
(8.0-12.7)	10.1	(94.6-99.4)	98.1	53.5	(34.3-51.7)	42.8
(61.3-67.9)	64.7	(89.5-97.7)	95.0	49.1	(31.3-44.4)	37.6
(43.6-53.5)	48.6	(62.9-77.5)	70.7	60.1	(30.7-45.0)	37.6
(82.2-85.4)	83.9	(55.4-72.0)	64.1	76.9	(70.8-79.9)	75.7
(52.4-60.6)	56.6	(73.4-95.8)	88.8	34.9	(60.5-84.7)	74.5
NA††	—	(79.6-97.1)	92.0	78.9	(48.2-84.8)	69.5
(57.5-67.8)	62.8	(47.5-57.9)	52.7	45.4	(66.7-75.8)	71.5

سورينام، 2004
 ترينيداد وتوباغو، 2007
 الولايات المتحدة الأمريكية، 2004
 الألوروغواتي، 2007
 الجزائر، القذافي الأمريكية، 2004
 فنزويلا، 1999
 إقليم شرق المتوسط
 أفغانستان (كابل)، 2004
 البحرين، 2002
 جيوتي، 2003
 مصر، 2005
 قطاع غزة، 2005
 إيران، 2003
 العراق (كردستان)، 2006
 الأردن، 2007
 الكويت، 2005
 لبنان، 2005
 ليبيا، 2007
 المغرب، 2006
 مسقط، 2007
 الباكستان (إسلام آباد)، 2003
 قطر، 2007
 السعودية، 2007
 الصومال (أرض الصومال)، 2007
 السودان، 2005
 سوريا، 2002
 تونس، 2007
 الإمارات، 2005
 الضفة الغربية، 2005
 اليمن، 2003
 الإقليم الأوربي
 ألبانيا، 2004
 أرمينيا، 2004
 بيلاروسيا، 2004
 البوسنة والهرسك، 2003
 بلغاريا، 2002
 كرواتيا، 2007
 قبرص، 2005
 جمهورية التشيك، 2007
 إستونيا، 2003
 جورجيا، 2003
 اليونان، 2005
 هنغاريا، 2003
 كازاخستان، 2004
 كوسوفو**، 2004
 قرغيزستان، 2004
 لاتفيا، 2007

(30.0-40.4)	35.0	(47.9-63.9)	56.1	35.7	(63.4-77.5)	70.9	ليبنانيا، 2005	
(51.7-59.4)	55.6	(59.8-83.0)	73.0	59.6	(54.4-71.8)	63.5	مقدونيا، 2003	
(77.0-84.1)	80.8	(70.4-84.2)	78.1	64.9	(39.9-55.6)	47.7	مولدوفا، 2004	
(49.1-59.5)	54.4	(70.2-95.9)	88.1	59.6	(27.3-64.4)	45.2	مونتينيغرو، 2004	
(52.8-61.6)	57.3	(67.8-83.0)	76.2	51.0	(42.5-60.0)	51.3	بولندا، 2003	
(56.2-66.8)	61.6	(61.4-75.5)	68.9	59.9	(44.8-65.5)	55.4	رومانيا، 2004	
(57.4-70.1)	64.0	(69.3-79.9)	75.0	71.3	(59.0-71.5)	65.5	روسيا الاتحادية، 2004	
(60.9-67.2)	64.1	(91.0-96.6)	94.4	69.4	(48.1-60.1)	54.2	صربيا، 2003	
(66.8-73.1)	70.0	(73.8-85.6)	80.3	54.4	(57.9-67.7)	62.9	سلوفاكيا، 2003	
(58.5-68.3)	63.6	(86.8-95.6)	92.3	(53.4-66.3)	60.0	(37.3-48.0)	42.6	سلوفينيا، 2003
(76.1-88.6)	83.2	—	—	—	—	—	—	طاجيكستان، 2004
(50.9-54.7)	52.8	(80.5-90.8)	86.4	(40.6-52.4)	46.5	(60.4-69.9)	65.3	تركيا، 2003
(84.1-88.9)	86.7	(57.0-70.6)	64.1	(70.3-80.0)	75.5	(70.2-78.4)	74.5	أوكرانيا، 2005
(54.3-60.9)	57.7	(60.3-78.6)	70.2	(46.0-60.2)	53.2	(63.6-79.9)	72.5	إقليم جنوب شرق آسيا
(40.0-46.6)	43.3	—	—	—	—	—	—	بنغلاديش (دكا)، 2004
(52.7-66.5)	59.8	(42.2-74.2)	59.2	(24.8-49.8)	36.4	(81.0-96.7)	91.7	يونان، 2006
(28.3-39.1)	33.5	(26.6-57.4)	41.2	(17.6-32.1)	24.1	(63.9-81.5)	73.7	تيمور الشرقية، 2006
(51.9-57.0)	54.4	(62.4-80.7)	72.5	(44.1-59.1)	51.7	(61.9-78.1)	70.6	أفغانستان، 2006
(61.5-75.1)	68.7	(60.5-77.9)	69.9	(55.5-65.7)	60.7	(68.5-85.4)	78.1	إندونيسيا، 2006
(33.7-46.2)	39.8	—	—	(43.9-69.2)	57.0	(24.3-62.9)	42.5	مالديف، 2004
(66.1-73.3)	69.8	(68.1-84.0)	77.0	(65.0-79.6)	72.9	(81.1-94.4)	89.5	ميانمار، 2001
(5.9-18.1)	10.5	(88.1-99.1)	96.7	(73.8-90.4)	83.8	(3.5-14.7)	7.3	نيبال (بيراتانغار)، 2004
(75.8-83.3)	79.8	—	—	—	—	—	—	سريلانكا، 2003
(58.6-65.2)	61.9	(18.9-40.1)	28.3	(31.7-45.1)	38.1	(63.2-79.9)	72.3	تايلاند، 2005
(64.1-73.1)	68.8	(38.7-57.3)	47.9	(40.6-51.8)	46.1	(74.6-85.7)	80.7	إقليم غرب المحيط الهادئ
(47.4-66.6)	61.0	—	—	(0.0-10.1)	12.2	(77.4-88.4)	85.0	ساموا الأمريكية، 2005
(60.5-72.8)	66.9	—	—	—	—	—	—	كمبوديا، 2003
(57.3-67.9)	62.7	—	—	—	—	—	—	الصين (شنغهاي)، 2005
(51.5-60.5)	56.1	—	—	(10.0-18.2)	13.6	(90.0-97.7)	95.2	جزر كوك، 2003
(47.4-64.3)	56.0	—	—	(16.2-36.2)	24.9	(80.0-93.3)	88.2	فيجي، 2005
(42.0-50.0)	46.0	—	—	(5.3-12.2)	8.1	(69.3-81.1)	75.7	غوام، 2002
(64.6-74.4)	69.7	—	—	(28.2-46.9)	37.1	(78.2-96.4)	90.8	لاموس (بلدية هيتيان)، 2003
(55.8-69.7)	63.0	(83.5-97.6)	93.4	(53.8-74.2)	64.7	(32.9-51.9)	42.1	ماكافو، 2005
(68.1-74.6)	71.5	(31.6-47.2)	39.1	(53.4-63.6)	58.6	(75.0-84.5)	80.2	ماليزيا، 2003
(37.2-45.8)	41.4	(20.8-44.3)	31.3	(20.7-30.3)	25.2	(82.8-89.4)	86.5	ميكرونيسيا، 2007
(40.4-57.5)	48.9	(84.8-95.3)	91.4	(71.5-87.4)	80.6	(77.4-92.0)	86.2	منغوليا، 2003
(51.5-71.2)	61.9	—	—	(7.6-20.1)	12.6	(38.3-59.7)	48.9	نيوزيلندا، 2007
(53.1-59.3)	56.2	(52.9-73.6)	63.9	(12.3-19.2)	15.5	(75.2-83.1)	79.4	جزر ماريانا الشمالية، 2004
(84.2-89.0)	86.8	—	—	(10.7-22.3)	15.6	(70.4-84.2)	78.1	نالاو، 2005
(68.6-75.5)	72.2	(55.3-71.5)	63.8	(47.1-56.0)	51.6	(77.9-86.1)	82.3	بابوا غينيا الجديدة، 2007
(67.5-74.9)	71.4	(49.2-69.3)	59.6	(43.6-54.5)	49.0	(83.2-91.8)	88.2	الفلبين، 2007
(35.7-54.4)	44.9	—	—	(20.9-55.0)	36.3	(50.0-79.4)	66.2	ساموا، 2007
NA	—	(44.5-55.6)	50.0	(41.2-48.0)	44.6	(56.7-66.9)	61.9	سنغافورة، 2000
(61.3-72.0)	66.8	(16.9-35.9)	25.3	(29.5-41.8)	35.4	(62.9-78.5)	71.3	كوزوفا الجنوبية، 2005
(69.0-69.4)	69.2	—	—	(23.4-24.1)	23.7	(98.6-98.8)	98.7	توفالو، 2006
(52.5-55.4)	53.9	(52.7-66.5)	59.8	(27.5-34.2)	30.7	(81.3-87.2)	84.5	فانواتو، 2007
(65.6-77.5)	72.0	—	—	—	—	—	—	فيتنام (هانوي)، 2003

الاجموع	68.7	(60.1-75.9)	46.7	(39.9-53.6)	70.5	(60.3-78.8)	57.6	(53.6-61.5)
*95% من فترة الاستبيان								
†35< حالة في المتوسط								
§ ممتلكات المملكة المتحدة								
¶ ممتلكات الولايات المتحدة								
** إقليم خاضع لإدارة الأمم المتحدة								
†† سؤال لم يُطرح								
§§ إقليم ذو إدارة صينية خاصة								
¶¶ كومنولث في اتحاد سيامي مع الولايات المتحدة								

الجدول 7 - إجراءات المسح (الترصد) العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب التي يمكن استعمالها لرصد تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية.

المادة في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ	إجراءات التردد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب
--	--

المادة 20: البحوث والترصد وتبادل المعلومات
2: تقوم الأطراف (الموقعة على الميثاق) بإنشاء برامج للترصد الوطني والإقليمي والعالمي تتناسب مع حجم وأنماط ومحددات ونتائج استهلاك التبغ والتعرض لدخان التبغ. وبغية تحقيق هذه الغاية تقوم هذه الأطراف بإدماج برامج ترصد التبغ في برامج الترصد الصحي الوطنية والإقليمية والعالمية حتى تكون المعطيات قابلة للمقارنة ويمكن تحليلها في المستويين الإقليمي والدول تبعاً للمناسبة

تم وضع صيغة التردد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب من قبل منظمة الصحة العالمية، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، والرابطة الكندية للصحة العمومية، وبدأ العمل به عام 1999. واستكملت التردد المبدي حتى يومنا هذا 140 دولة عضواً بالمنظمة، وست مناطق إدارية، وإقليمان جغرافيان، وإقليم ذو إدارة خاصة، وإقليم كومنولث واحد. وأعيدت عملية المسح هذه في 66 بلداً. وبنهاية عام 2008 سوف تكون 48 بلداً آخر بصدد تكرار عملية المسح، كما ستكون 28 بلداً آخر قد استكملت عملية التردد لأول مرة.

الانتشار

المادة 21: الإبلاغ وتبادل المعلومات

- 1: يقدم كل طرف إلى مؤتمر الأطراف (الموقعة)، وعن طريق أمانة المؤتمر، تقارير دورية عن تنفيذ هذا الميثاق، على أن تتضمن هذه التقارير ما يلي: (د) معلومات عن التردد والبحوث على النحو المنصوص عليه في المادة 20 (البحوث والترصد وتبادل المعلومات).
- دخن السجائر يوماً من الأيام
- شرع في التدخين قبل سن العاشرة
- يدخن السجائر حالياً
- يستعمل التبغ حالياً بأشكال أخرى
- لم يدخن مطلقاً، ويحتمل شروعه في التدخين العام القادم

التعرض للتدخين الثانوي

المادة 8: الحماية من التعرض لدخان التبغ

- 2: على كل طرف أن يتبنى وينفذ في مناطق السلطة القضائية الوطنية التي يحددها القانون الوطني، كما يشجع في المستويات السيادية الأخرى على تبني وتنفيذ، إجراءات تشريعية وتنفيذية وإدارية فعالة، وسواها، تنص على الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل داخل المباني، وفي وسائل النقل العامة، وما
- تعرض لدخان التبغ الصادر عن الآخرين في منازلهم
- تعرض لدخان التبغ الصادر عن الآخرين في الأماكن العامة
- يرى ضرورة حظر التدخين من الأماكن العامة

يتلاءم مع ذلك من الأماكن العامة الأخرى

المدرسة

المادة 12: التثقيف، والاتصال، والتدريب، والوعي الجماهيري

- على كل طرف أن يعزز ويقوي الوعي الجماهيري بقضايا مكافحة التبغ مستعملاً في ذلك كافة وسائل الاتصال المتاحة، حسب الحال. وليلو هذه الغاية، على كل طرف أن يتبنى ويطبق إجراءات تشريعية أو تنفيذية أو إدارية فعالة، أو سواها، من أجل تعزيز: (و) الوعي الجماهيري، والحصول على المعلومات الخاصة بالعواقب الضارة صحياً، واقتصادياً، وبيئياً، المترتبة على إنتاج التبغ واستهلاكه.
- خلال العام الدراسي الماضي تلقى الطلاب تعليماً حول أخطار التدخين.
- خلال العام الدراسي الماضي ناقش الطلاب الأسباب التي تحمل من هم في سنهم على التدخين.
- خلال العام الدراسي الماضي تلقى الطلاب تعليماً حول آثار التدخين.

وسائل الإعلام، والإعلان

المادة 13: الإعلان عن التبغ وما يرتبط به من تشجيع ورعاية.

- 1: تقر الأطراف الموقعة بأن فرض حظر شامل على الإعلان والتشجيع والرعاية يمكن أن يقلل من استهلاك منتجات التبغ.

- خلال الشهر المنصرم شهد الشاب ممثلين يدخنون على التلفاز أو الفيديو أو السينما.
- خلال الشهر المنصرم، شهد إعلانات سحائر على لوحات الإعلانات.
- خلال الشهر المنصرم، شهد إعلانات سحائر في الصحف والمجلات.
- خلال الشهر المنصرم، شهد إعلانات سحائر في أحداث رياضية أو معارض أو حفلات أو أنشطة اجتماعية.
- يحمل أداة موسومة بشعار أحد أصناف السحائر.

الإقلاع

المادة 14: إجراءات الحد من الطلب في ما يخص الاعتماد على التبغ والإقلاع عنه.

- 1: على كل طرف من الأطراف، أن يضع وينشر دلائل إرشادية ملائمة وشاملة ومتكاملة تعتمد على البيئة العلمية وأفضل الممارسات، آخذة في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية؛ وعليه أن يتخذ الإجراءات الفعالة للتشجيع على الإقلاع عن تعاطي التبغ، وأن يوفر المعالجة الكافية لحالات الاعتماد على التبغ.

- مدخنون حاليون يرغبون في التوقف عن التدخين.
- مدخنون حاليون حاولوا التوقف عن التدخين خلال العام المنصرم.
- مدخنون حاليون سبق لهم تلقي المساعدة أو النصيحة من برنامج أو مهني متخصص ليعينهم على الإقلاع عن التدخين.
- مدخنون حاليون يدخنون أو يشعرون بالرغبة في تدخين سيجارة قبل أي شيء آخر في الصباح.

حصول الأحداث على السجائر وإتاحتها لهم

المادة 16 : البيع للأحداث والانتفاع منهم

- 1- على كل طرف (من الأطراف الموقعة) أن يتسنى ويطبق إجراءات تشريعية، أو تنفيذية، أو إدارية، أو سواها، في المستوى الملائم لحظر بيع منتجات التبغ إلى أشخاص دون السن التي يحددها القانون المحلي أو القانون الوطني، أو دون الثامنة عشرة.
 - 2- على كل طرف أن يحظر أو يشجع على حظر توزيع منتجات التبغ مجاناً على أفراد الجمهور، ولا سيما الأحداث منهم.
- مدخنون حاليون يحصلون على سجائرهم عادة بشرائها من محل تجاري، أو حانوت، أو بائع متجول
 - مدخنون حاليون لم يرفض طلبهم شراء السجائر بسبب سنهم.
 - طلاب عرضت عليهم سجائر مجانية من قبل ممثلي إحدى شركات السجائر.
-

الملحق أ

عدد مواقع أقاليم منظمة الصحة العالمية التي أتمت عملية المسح (الترصد) العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب

جدول عدد المواقع* التي تستكمل عملية المسح العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب، بحسب السنة وإقليم المنظمة – الخط القاعدي؛ والتكرار؛ وشملها هذا التقرير

الإقليم الإفريقي	الإقليم الأمريكي†	إقليم شرق المتوسط§	الإقليم الأوربي	إقليم شرق آسيا	إقليم غرب المحيط الهادئ¶	السنة
الخط القاعدي	الخط القاعدي	الخط القاعدي	الخط القاعدي	الخط القاعدي	الخط القاعدي	
تكرار	تكرار	تكرار	تكرار	تكرار	تكرار	
مشمولة هذا التقرير	مشمولة هذا التقرير	مشمولة هذا التقرير	مشمولة هذا التقرير	مشمولة هذا التقرير	مشمولة هذا التقرير	
2	1	1	3	1	2	1999
2	15	1	3	2	1	2000
8	9	3	1	1	1	2001
7	5	2	3	1	1	2002
5	4	4	10	1	6	2003
1	2	11	10	3	1	2004
2	1	7	2	1	3	2005
4	1	1	2	3	1	2006
3	4	7	3	4	2	2007
29	38	23	29	10	22	المجموع

* في هذا التقرير يشير "الموقع" إلى 140 دولة عضواً بمنظمة الصحة العالمية، و6 مناطق إدارية (ساموا الأمريكية، والجزر العذراء التابعة للولايات المتحدة، والجزر العذراء البريطانية، وغوام، ومنتسرات، وبويرتوريكو)، وإقليمين جغرافيين (قطاع غزة والضفة الغربية)، وإقليم إداري ذي صفة خاصة (ماكاو)، ومنطقة كومنولث واحدة (جزر ماريانا الشمالية).

† أنشأت المكسيك خطاً قاعدياً في مستوى الدولة عام 2000 ثم توسعت إلى مدينة مكسيكو في 2006 (المعطيات مذكورة في هذا التقرير ولكنها لم تحسب كتكرار أعلاه)؛ وأنشأت البرازيل خطاً قاعدياً في مستوى الدولة عام 2002 ثم توسعت إلى ريو دي جانيرو في 2005 (المعطيات مذكورة في هذا التقرير ولكنها لم تحسب كتكرار أعلاه)؛ وأنشأت الولايات المتحدة خطاً قاعدياً في عام 2000، وكررت في عام 2002 (لم تحسب كتكرار أعلاه) وفي عام 2004 (المعطيات مذكورة في هذا التقرير ومحسوبة كتكرار في الجدول).

§ أنشأت الأردن خطاً قاعدياً في 1999، وكررت في 2003 (لم تحسب كتكرار أعلاه)، وفي 2007 (المعطيات مذكورة في هذا التقرير واحتسبت كتكرار أعلاه).

¶ أنشأت الصين خطاً قاعدياً في مستوى المحافظة عام 1999 ثم توسعت إلى شنغهاي في 2005 (المعطيات مذكورة في هذا التقرير ولكنها لم تحسب كتكرار أعلاه)؛ وأنشأت الفلبين خطاً قاعدياً عام 2000، وكررت في 2004 (غير محسوبة كتكرار أعلاه) وفي 2007 (المعطيات مذكورة في هذا التقرير ومحسوبة كتكرار أعلاه).

أ- لم أحاول شراء السجائر خلال الأيام الثلاثين

الماضية (شهر كامل)

ب- نعم، رفض أحدهم أن يبيعي السجائر بسبب سني

ج- لا، لم يمنعني سني من شراء السجائر

8- خلال الأيام الثلاثين الماضية (شهر كامل) هل استعملت

أي منتج من منتجات التبغ في التدخين غير السجائر

(مثل السيجار أو النارجيلة، أو السيجاريلو (سيجار

رفيع) أو السيجار الصغير، أو الغليون)؟

أ- نعم

ب- لا

9- خلال الأيام الثلاثين الماضية (شهر كامل) هل استعملت

أي منتج لا دخان له من منتجات التبغ (مثل مضغعة

التبغ، أو السعوط، أو الغموس)

أ- نعم

ب- لا

10- أين تدخن عادة؟ (اختر إجابة واحدة فقط)

أ- لم أدخن السجائر مطلقاً

ب- في المنزل

ج- في المدرسة

د- في العمل

هـ- في منازل الأصدقاء

و- في المناسبات الاجتماعية

ز- في المساحات العامة (مثل المتزهات أو مراكز

التسوق أو زوايا الشوارع)

ح- أماكن أخرى

11- هل تدخن أو تشعر بالرغبة في تدخين سيجارة قبل أي

شيء في الصباح؟

أ- لم أدخن سيجارة مطلقاً

ب- لم أعد أدخن السجائر

ج- لا، لا أدخن أو لا أشعر بالرغبة في تدخين

سيجارة قبل أي شيء في الصباح

ز- كل أيام الشهر الثلاثين

4- خلال الأيام الثلاثين الماضية (شهر كامل)، في الأيام التي

دخنت فيها، كم سيجارة اعتدت أن تدخن؟

أ- لم أدخن السجائر خلال الأيام الثلاثين الماضية

(شهر كامل)

ب- أقل من سيجارة واحدة في اليوم

ج- سيجارة واحدة في اليوم

د- 2 إلى 5 سجائر في اليوم

هـ- 6 إلى 10 سجائر في اليوم

و- 11 إلى 20 سيجارة في اليوم

ز- أكثر من 20 سيجارة في اليوم

5- خلال الأيام الثلاثين الماضية (شهر كامل) كيف اعتدت

الحصول على سجائرك؟ (اختر إجابة واحدة فقط)

أ- لم أدخن السجائر خلال الأيام الثلاثين الماضية

(شهر كامل)

ب- اشتريتها من محل تجاري أو حانوت أو من

بائع متجول

ج- اشتريتها من مأكنة بيع

د- أعطيت شخصاً نقوداً ليشتريها لي

هـ- اقترضتها من شخص آخر

و- سرقها

ز- أعطاني إياها شخص أكبر مني

ح- حصلت عليها بطريقة أخرى

6- خلال الأيام الثلاثين الماضية (شهر كامل)، ما هي

أصناف السجائر التي اعتدت تدخينها؟ (اختر إجابة

واحدة فقط)

أ- لم أدخن السجائر خلال الأيام الثلاثين الماضية

ب- لم أعتد صنفاً بعينه

ج- كذا وكذا (أضف الأصناف الخمسة الأكثر

شيوعاً)

د- أصناف أخرى

7- خلال الأيام الثلاثين الماضية (شهر كامل) هل رفض أي

شخص أن يبيعك السجائر بسبب سنّك؟

- د- نعم، في بعض الأحيان أدخن أو أشعر برغبة
في تدخين سيجارة قبل أي شيء في الصباح
ه- نعم، أنا دائماً أدخن أو أشعر بالرغبة في
تدخين سيجارة قبل أي شيء في الصباح

تستفسر الأسئلة السبعة عشر التالية عن معرفتك وموقفك
إزاء التبغ

- 12- هل يدخن والداك؟
أ- كلاهما لا يدخن
ب- كلاهما يدخن
ج- الأب فقط
د- الأم فقط
ه- لا أدري
- 13- إذا عرض عليك أحد أفضل أصدقائك سيجارة، فهل
تدخنها؟

- أ- لا، قطعاً
ب- قد لا أدخنها
ج- قد أدخنها
د- نعم، قطعاً
- 14- هل ناقش معك أي من أفراد أسرتك الآثار الضارة
للتدخين؟
- أ- نعم
ب- لا

- 15- هل تظن أنك سوف تدخن سيجارة في وقتٍ ما خلال
الاثني عشر شهراً القادمة؟
- أ- لا، قطعاً
ب- قد لا أدخنها
ج- قد أدخنها
د- نعم، قطعاً

- 16- هل تظن أنك سوف تدخن السجائر خلال خمس
سنوات قادمة؟
- أ- لا، قطعاً
ب- قد لا أفعل

- ج- قد أفعل
د- نعم، قطعاً
- 17- ما أن يشرع أحد في التدخين، فهل تظن أنه يصعب
عليه الإقلاع عنه؟
- أ- لا، قطعاً

- ب- قد لا يصعب عليه
ج- قد يصعب عليه
د- نعم قطعاً
- 18- هل تظن أن لدى الصبيان المدخنين قلةً أم كثرة من
الأصدقاء؟

- أ- لديهم كثرة من الأصدقاء
ب- لديهم قلة من الأصدقاء
ج- لا يختلفون في ذلك عن غير المدخنين
- 19- هل تظن أن لدى البنات المدخنات قلةً أم كثرة من
الأصدقاء؟

- أ- لديهن كثرة من الأصدقاء
ب- لديهن قلة من الأصدقاء
ج- لا يختلفن في ذلك عن غير المدخنات
- 20- هل يساعد تدخين السجائر الإنسان على الشعور بمزيد
من الارتياح أم بقلة الارتياح، في المناسبات أو الحفلات
أو اللقاءات الاجتماعية الأخرى.

- أ- مزيد من الارتياح
ب- قلة من الارتياح
ج- لا يختلف في ذلك عن غير المدخنين
- 21- هل تظن تدخين السجائر يجعل الصبيان يطهرون بمظهر
أكثر أم أقل جاذبية؟
- أ- أكثر جاذبية
ب- أقل جاذبية
ج- لا يختلفون في ذلك عن غير المدخنين

- 22- هل تظن تدخين السجائر يجعل البنات يظهرن بمظهر
أكثر أم أقل جاذبية؟
- أ- أكثر جاذبية
ب- أقل جاذبية

ج- لا يختلفن في ذلك عن غير المدخنات
23-هل تظن أن تدخين السجائر يزيد وزنك أم ينقصه؟

أ- يزيد الوزن
ب- ينقص الوزن

ج- لا فرق في ذلك

24-هل تظن أن تدخين السجائر مضرٌ بصحتك؟

أ- لا، قطعاً

ب- قد لا يضر

ج- قد يضر

د- نعم، قطعاً

25-هل يدخن أحد أقرب أصدقائك السجائر؟

أ- لا يدخن أيُّ منهم

ب- يدخن بعضهم

ج- يدخن معظمهم

د- يدخن جميعهم

26-عندما ترى رجلاً يدخن فماذا تظن به؟ (اختر إجابة واحدة فقط)

أ- يفتقر إلى الثقة

ب- أحق

ج- خاسر

د- ناجح

هـ- ذكي

و- ذكر حقاً

27-عندما ترى امرأة تدخن فماذا تظن بها؟ (اختر إجابة واحدة فقط)

أ- تفتقر إلى الثقة

ب- حمقاء

ج- خاسرة

د- ناجحة

هـ- ذكية

و- متحضرة

28-هل تظن أن من المأمون أن تدخن سنة أو سنتين فقط، مؤكداً أنك ستقلع بعد ذلك؟

أ- لا، قطعاً

ب- لا، على الأرجح

ج- نعم، على الأرجح

د- نعم، قطعاً

الأسئلة الأربعة التالية تستفسر عن مدى تعرضك لتدخين الآخرين

29-هل تظن أن الدخان الذي يصلك من سجائر الآخرين مضرٌ لك؟

أ- لا، قطعاً

ب- قد لا يضر

ج- قد يضر

د- نعم، قطعاً

30-خلال الأيام السبعة الماضية، ما عدد الأيام التي دخن فيها آخرون في منزلك وبحضورك؟

أ- 0

ب- 1 إلى 2

ج- 3 إلى 4

د- 5 إلى 6

هـ- 7

31-خلال الأيام السبعة الماضية، ما عدد الأيام التي دخن فيها آخرون بحضورك، في أماكن غير منزلك؟

أ- 0

ب- 1 إلى 2

ج- 3 إلى 4

د- 5 إلى 6

هـ- 7

32-هل تؤيد حظر التدخين في الأماكن العامة (كالمطاعم، وحافلات الركاب، والسيارات العادية، والقطارات، وفي المدارس، وفي الملاعب، وفي قاعات رياضة بناء الأجسام، وفي الحلبات الرياضية، وفي أماكن اللهو)؟

أ- نعم

ب- لا

تستفسر الأسئلة الستة التالية عن موقفك من الإفلاق عن

التدخين

33-هل تريد الإفلاق عن التدخين الآن؟

- أ- لم أدخن السجائر مطلقاً
ب- لا أدخن في الوقت الحاضر

- ج- نعم
د- لا

34-خلال العام الماضي، هل حاولت الإفلاق عن تدخين

السجائر؟

- أ- لم أدخن السجائر مطلقاً
ب- لم أدخن خلال العام الماضي

- ج- نعم
د- لا

35-منذ متى توقفت عن التدخين؟

- أ- لم أدخن السجائر مطلقاً
ب- لم أتوقف عن التدخين
ج- منذ 1-3 شهور
د- منذ 4-11 شهراً
هـ- منذ عام واحد

و- منذ عامين

ز- منذ ثلاثة أعوام أو أكثر

36-ما السبب الرئيسي الذي جعلك تقرر الإفلاق عن

التدخين (اختر إجابة واحدة فقط)

- أ- لم أدخن السجائر مطلقاً
ب- لم أتوقف عن التدخين

- ج- لتحسين صحتي
د- لتوفير المال

هـ- لأن عائلتي لا تحب التدخين

و- لأن أصدقائي لا يحبون التدخين

ز- لسبب آخر

37-هل تظن أن في استطاعتك التوقف عن التدخين إن

أردت ذلك؟

- أ- لم أدخن السجائر مطلقاً

ب- لقد توقفت عن تدخين السجائر فعلاً

- ج- نعم
د- لا

38-هل سبق لك أن تلقيت أي مساعدة أو نصيحة

لإعانتك على الإفلاق عن التدخين؟ (اختر إجابة واحدة فقط)

- أ- لم أدخن السجائر مطلقاً

ب- نعم، من برنامج أو من مهني متخصص

ج- نعم، من صديق

د- نعم، من أحد أفراد العائلة

هـ- نعم، من برامج أو مهنيين، ومن أصدقاء أو

أفراد العائلة

و- لا

تستفسر الأسئلة التسعة التالية عن اطلاعك على رسائل

وسائل الإعلام حول التدخين

39-خلال الأيام الثلاثين الماضية (شهر كامل)، كم رسالة

من رسائل ووسائل الإعلام المناهضة للتدخين رأيت أو

سمعت (مثل التلفاز والإذاعة، ولوحات الإعلانات،

والملصقات، والصحف، والمجلات والأفلام)

أ- الكثير

ب- القليل

ج- لم أرَ أو أسمع شيئاً

40-عندما تذهب إلى مناسبات رياضية، أو معارض، أو

حفلات موسيقية، أو مناسبات أو لقاءات اجتماعية،

فهل تقع عينك كثيراً على رسائل مناهضة للتدخين؟

أ- لا أذهب مطلقاً إلى مناسبات رياضية، أو

معارض، أو حفلات موسيقية، أو أنشطة أو

لقاءات اجتماعية

ب- كثيراً ما يحدث ذلك

ج- في بعض الأحيان

د- لا يحدث ذلك مطلقاً

41- عندما تشاهد التلفاز، أو الفيديو، أو أفلام السينما، فهل

ترى الممثلون يدخنون في حالات كثيرة؟

أ- لا أشاهد التلفاز أو الفيديو أو أفلام السينما
مطلقاً

ب- كثيراً ما أرى ذلك

ج- أحياناً

د- لا أراهم يدخنون مطلقاً

42- هل لديك شيء (قميص قطني، قلم، حقيبة ظهر، إلخ.)

موسوم بشعار صنف من السجائر؟

أ- نعم

ب- لا

43- خلال الأيام الثلاثين الماضية (شهر كامل)، وأثناء

مشاهدتك أحداثاً رياضية أو برامج أخرى على التلفاز،

كم مرة رأيت أسماء أصناف سجائر؟

أ- لا أشاهد التلفاز مطلقاً

ب- كثيراً ما أرى هذه الأسماء

ج- أحياناً

د- لم أر هذه الأسماء مطلقاً

44- خلال الأيام الثلاثين الماضية (شهر كامل) كم إعلاناً

عن السجائر رأيت على لوحات الإعلانات؟

أ- كثيراً

ب- قليلاً

ج- لم أر مطلقاً

45- خلال الأيام الثلاثين الماضية (شهر كامل)، كم إعلاناً

أو عرض ترويج للسجائر، رأيت في الصحف أو

المجلات؟

أ- كثيراً

ب- قليلاً

ج- لم أر مطلقاً

46- عندما تذهب إلى مناسبات رياضية، أو معارض، أو

حفلات موسيقية، أو لقاءات اجتماعية فهل ترى كثيراً

من إعلانات السجائر؟

أ- لا أشهد مطلقاً مناسبات رياضية، أو معارض،

أو حفلات موسيقية، أو أحداث اجتماعية

ب- كثيراً ما أرى هذه الإعلانات

ج- أحياناً

د- لا أراها مطلقاً

47- هل حدث أن عرض عليك ممثل أحد أصناف السجائر

سيجارة مجاناً؟

أ- نعم

ب- لا

تستفسر الأسئلة الأربعة التالية عن ما تعلمته في المدرسة

عن التدخين

48- خلال هذا العام الدراسي، هل تعلمت في أي حصة

دراسية شيئاً عن أخطار التدخين؟

أ- نعم

ب- لا

ج- لست متأكداً

49- خلال العام الدراسي الحالي، هل ناقشت في أي حصة

دراسية الأسباب التي تدعو من هم في سنك للتدخين؟

أ- نعم

ب- لا

ج- لست متأكداً

50- خلال العام الدراسي الحالي، هل تعلمت شيئاً في أي

حصة دراسية عن الآثار السيئة للتدخين: كأن تجعل

أسنانك صفراء اللون، أو أنها نسب التجاعيد، أو تجعل

رائحتك كريهة؟

أ- نعم

ب- لا

ج- لست متأكداً

51- منذ متى كانت آخر مرة ناقشت فيها موضوع التدخين

والصحة كجزء من أحد الدروس؟

أ- لم يحدث مطلقاً

ب- في هذا الفصل الدراسي

ج- في الفصل الدراسي السابق

- د- منذ فصلين دراسيين
- ه- منذ ثلاثة فصول دراسية
- و- منذ أكثر من عام مضى

تستفسر الأسئلة الثلاثة الأخيرة عن بعض المعلومات الخلفية

الخاصة بك شخصياً

52- كم عمرك؟

- أ- 11 عاماً أو أقل
- ب- 12 عاماً
- ج- 13 عاماً
- د- 14 عاماً
- ه- 15 عاماً
- و- 16 عاماً
- ز- 17 عاماً أو أكثر

53- ما جنسك؟

- أ- ذكر
- ب- أنثى

54- في أي مرحلة دراسية أو صف دراسي أنت الآن؟

- أ- اذكر حسب المعتمد محلياً
- ب-

الملحق ج
أقاليم ومواقع منظمة الصحة العالمية
التي كررت عملية المسح العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب

جدول أقاليم ومواقع منظمة الصحة العالمية التي كررت عملية المسح العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب، بحسب السنة				
الإقليم/الموقع	الخط القاعدي	التكرار الأول	التكرار الثاني	المشمول في هذا التقرير
الإقليم الإفريقي				
جنوب إفريقيا	1999	2002		2002
زيمبابوي	1999	2003		2003
غانا	2000	2006		2006
بوركينا فاسو	2001	2006		2006
مالاوي	2001	2005		2005
موريتانيا	2001	2006		2006
النيجر	2001	2006		2006
سوازيلاند	2001	2005		2005
توغو	2002	2007		2007
النمغال	2002	2007		2007
أوغندا	2002	2007		2007
الإقليم الأمريكي				
باربيدوس	1999	2002		2002
كوستا ريكا	1999	2002		2002
أنتيغوا وباربودا	2000	2004		2004
الأرجنتين	2000	2003		2003
جزر البهاما	2000	2004		2004
بوليفيا	2000	2003		2003
تشيلي	2000	2003		2003
دومينيكا	2000	2004		2004
غرينادا	2000	2004		2004
غيانا	2000	2004		2004
جامايكا	2000	2006		2006
البيرو	2000	2003		2003
ـ ورواندا	2000	2004		2004
ترينيداد وتوباغو	2000	2007		2007
الولايات المتحدة	2000	2002	2004	2004
كوبا	2001	2004		2004
هايتي	2001	2005		2005
سانتا لوسيا	2001	2007		2007
سانت فنسنت و غرينادين	2001	2007		2007

2004		2004	2001	الجزر العذراء (الناطقة بالولايات المتحدة)
2007		2007	2001	الأوروغواي
				إقليم شرق المتوسط
2007	2007		1999	الأردن
2005			2001	مصر
2005		2005	2001	الكويت
2005		2005	2001	لبنان
2006		2006	2001	المغرب
2005		2005	2001	قطاع غزة
2007		2007	2001	السعودية
2005		2005	2001	السودان
2007		2007	2001	تونس
2005		2005	2001	الضفة الغربية
2005		2005	2002	الإمارات
2007		2007	2002	عمان
2007		2007	2003	ليبيا
2007		2007	2004	قطر
2007		2007	2004	الصومال
				الإقليم الأوربي
2003		2003	1999	بولندا
2004		2004	1999	الاتحاد الروسي
2005		2005	1999	أوكرانيا
2005		2005	2001	ليتوانيا
2007		2007	2002	جمهورية التشيك
2007		2007	2002	لاتفيا
2007		2007	2003	كرواتيا
				إقليم جنوب شرق آسيا
2003		2003	1999	سريلانكا
2006		2006	2000	الهند
2006		2006	2000	إندونيسيا
2004		2004	2001	نيبال
2006		2006	2004	بروتان
				إقليم غرب المحيط الهادئ
2005		2005	1999	فيجي
2007		2007	2000	مكرونيزيا
2004		2004	2000	جزر مارشال الشمالية
2005		2005	2000	بالاو
2007	2007	2004	2000	الفلبين
2005		2005	2001	مكاو

المنسقون الإقليميون للترصد العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب

المكاتب الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية: الإقليم الإفريقي، نيفو راماناندرابي، الإقليم الأمريكي، كيرستين شوت؛ إقليم جنوب شرق آسيا، ديرندرا ن. سينها؛ إقليم غرب المحيط الهادئ، جوناثان سانتوس.

الإقليم الإفريقي: جميل زغيلش (الجزائر)؛ فيلومينا ولسون (أنغولا)؛ فكتور هونكونو (بنين)؛ تيبوغو مولي، تيلوييتو راموكاتي، إبرهام رابالاي (بوتسوانا)؛ لاردا ثودور كانغوي، ماثياس سومي، درابو ماكسيم، فيتالين كبدوا، آرونا ويدراوغو (بور كينا فاسو)؛ أحمد وليدي (جزر القمر)؛ روزالي ليكي-بوبو (الكونغو)؛ آكا ميشيل يسوه، باسكال بوغوي (كوت ديفوار)؛ أسغودون موسازغي (إريتريا)؛ سيفانيت منغستو عرياب، عبد الرحمن عبدو (إثيوبيا)؛ إديث ولنغتون، س.أو. ساكي (غانا)؛ جويس ناتو، زرا أوما أوغويم (كينيا)؛ إيتوملنغ كيماي، مالتيتا توواني، ماحولو لياكا (ليسوتو)؛ باتريك كانيمبو، آدمسون مولا، جون كاييتو، إستر شازوا (مالاوي)؛ ميتري ماهاماني إبراهيم سيسي، ديارا نازوم (مالي)؛ الحاج ديوب (موريتانيا)؛ ديوان محيي (موريشوس)؛ أوغستو نيونز (موزمبيق)؛ تايي أمامبو، إليزابيث إندونغو، ستانلي سيفيولا موغامبو (ناميبيا)؛ داغا ماغاي (النيجر)؛ إيمان-أوبونغ إيكام (نيجيريا)؛ فريدا موكيتي (جمهورية تانزانيا)؛ شيخ إبراهيم نيانغ، سامبا كور سار (السنغال)؛ باراتي فيسواناثان، باسكاللافيت (سيشيل)؛ دهران سوارت، فريد كوممان (جنوب إفريقيا)؛ أفريكا ماغونغو، ديفيد بريتشارد، سيدني نكامبولي (سوازيلاند)؛ أوسيني تيدجاني، عبدو عباداماسي (توغو)؛ ليليان مبابولونغي، فريدريك موسوني (أوغندا)؛ رتشارد زولو، ميكو مسوني (زامبيا)؛ بيبوكاي تشيكوكوا، كريستوفر زيشيري، إدوين ج.ف. سيدولي، شونغومونياني (زيمبابوي).

الإقليم الأمريكي: كولن أوكيف، جوان موزس (أنتيغوا وباربودا)؛ هوغو أ. ميغويز (الأرجنتين)؛ جوديث سكافيللا، لاري وليامز (جزر البهاما)؛ إلين م. كنغ، بيتر ويكام، شون دانييل، روتشيل روش (باربادوس)؛ كيماي أفيلا (بيليز)؛ فرانكلين ألكازار ديل كاستيلو (بوليفيا)؛ لويزا غولدفارب، فاليسكا كاراهو فيغويريدو، أدليمارا مانوسو ألونزي، ليتيسيا كاسادو كوستا، ليز ماريا دي ألميدا (البرازيل)؛ آيفي جورج، شيلال. ساميل (الجزر العذراء البريطانية)؛ لويز كاريس، كلوديا غونزاليز فيدمير (تشيلي)؛ كارلوسخوزيه كاسترو، كارولينا ويزنر، كونستانزا باردا راموس، راؤول موريللو (كولومبيا)؛ خوليو بيخارانو (كوستاريكا)؛ لوسيا لانيسيز كوتيتا (كوبا)؛ جوان هنري (دومينيكا)؛ راكيل بيمنتي (جمهورية الدومينيكان)؛ سيلفيا كوريلا راميريز، باتريشيو جاكومي (الإكوادور)؛ كارمن إيلينا مورينو (إلسلفادور)؛ أليستير أنطون (غرينادا)؛ ميرنا غراسيا، إيرما بيريز، ميغل غارسيز، آنا غارسيز (غواتيمالا)؛ شراداناند هافيراشاد (غيانا)؛ غيلبرت جان تشارلز، جيرالد ليربور

(هايتي)؛ ماريا غيرتودس (هندوراس)؛ كارين برندرغاست، إلين غريزل (جامايكا)؛ ريدل فالديس سالغادو، بلانكا فيلا-كونتيراس جيزس فيليب غونزالز رولدان لوز ميريام ريناليس شيغيماتسو (المكسيك)؛ ألماي أوغارو (مونتسيرات)؛ ماركوس ميريونو إدياكويز، سيلفيا نافاريزفلوريس (نيكاراغوا)؛ رينا روا (باناما)؛ غراسيلا غامارا (باراغواي)؛ الفونسو زاباليتا (بيرو)؛ ميلاغروس سانشيز (بويرتو ريكو)؛ بيترونيليا إدواردز (سانت كيتس و نيفيس)؛ إلفينا لورنس، سيريان لاندي (سانت لوتشيا)؛ باتسي ويلي (سانت فنسنت والغرينادين)؛ جيروld فليت، كريس رامبالي، م. مانغرو (سورينام)؛ ليو أليني، نيكول كوبر (ترينيداد و توباغو)؛ جوليا شين آرون (الجزر العذراء التابعة للولايات المتحدة)؛ راكل ماغري، غرييلا أوليفيرا (الورغواي)؛ ريكاردو غرانيرو، ليغيا دي بنتو (فنزويلا).

إقليم شرق المتوسط: سيد علي شاه علوي (أفغانستان)؛ صلاح علي عبد الرحمن، خادم الحلوجي، مها المعلا (البحرين)؛ سميرة علي هيغو، عبد الرحمن محمد أبو بكر (جيبوتي)؛ نيفين منير دوس، سامي غانم، محمد محرز مصطفى (مصر)؛ سماح عريقات، صلاح شاكرا عيسى سوباني، معين القريري (قطاع غزة و الضفة الغربية)؛ أحمد علي باحاج، علي أصغر فرشاد، حسن أزاربيور مصولح (إيران)؛ ديليارا برزاني، سارهانغ جلال (العراق)؛ هبة أيوب، إمام الجعغير (الأردن)؛ سامي الناصر (الكويت)؛ جورج سعادة، نجيب غصن (لبنان)؛ محمد صلاح، أحمد بني، محمد صلاح (لبنان)؛ سناء شرقاوي، نور الدين شوقي، عبد الخالق مجردة (المغرب)؛ سحر عبدو حلمي، عيسى الشويلي، جواد اللواتي، صلاح المزاحمي (عمان)؛ شهزاد آلان خان، محمد يعقوب قريشي (باكستان)؛ أحمد محمد الملا، أحمد الإبراهيم، حمدة قطبة (قطر)؛ عبد الله محمد البيضة، عبد الله محمد الربيع (السعودية)؛ علي شيخ عمر، موسى يوسف شروي، علي شيخ عمير قابل، محمد سعيد محمد (الصومال)؛ إبراهيم عبد المجيد محمد قناوي، إلهام عبد الله بشر (السودان)؛ بسام أبو الذهب (الجمهورية العربية السورية)؛ محمد نبيل بن سهم، عليا محجوب زروق، محمد مقداد منجي حمروني (تونس)؛ بسام أبي صعب، هالة حيدر، عائشة المطوع (الإمارات العربية المتحدة)؛ أحمد علي-بعاج، محمد الخولاني (اليمن).

الإقليم الأوروبي: رولاند شوبيركا (ألبانيا)؛ ألكسندر بزرجيان (أرمينيا)؛ إيرينا زاستنسكايا (روسيا البيضاء)؛ أنطوانيتا مانولوف (بلغاريا)؛ تانيا كوريش، ديانا ماير (كرواتيا)؛ أورانيا كولوكوتروني، إليدوفوروس سوتريادس (قبرص)؛ هانا سوفينوفا (جمهورية التشيك)؛ كادي ليب، كريستين لبيب (إستونيا)؛ عائدة راميش-كاتاك، زيفانا غافريش (جمهورية البوسنة والهرسك)؛ إلينا كوسيفسكا (مقدونيا)؛ نانا نيكولايشفيلي، أكاتي غامكريليدزي (جورجيا)؛ إليدوفوروس سوتريادس (اليونان)؛ أغنس نيميث، جوديت كيس (هنغاريا)؛ كازبك توليبايف، ألما جيلكايداروفا (كازاخستان)؛ إيفانا يوفانوفيتش، ناصر رمضان (إقليم كوسوفو تحت إدارة الأمم المتحدة)؛ عائشة توكوبايف (قرغيزستان)؛ إيفيتا بودولي (لاتفيا)؛ أنتاناس غوستاوتاس (ليتوانيا)؛ أغيميا لياييفيتش (مونتينيغرو)؛ الجبل

الأسود)؛ كرزستوف برزيوزنيك (بولندا)؛ فورفومومي كالميك (جمهورية مولدافيا)؛ ليبيا ديمترييفيتش-
تانسكوفيتش، أنديلكا دجيلينوفيتش (جمهورية صربيا)؛ إيلانا ميرستيان (رومانيا)؛ إيلينا سكفورتسوف، كونستانتين
فيتالييفيتش فيشنسكي، إيرينا بارفينوفا، أندريه ديمين (الاتحاد الروسي)؛ تيبور باسكا (سلوفاكيا)؛ مويتشا
يوريشيتش (سلوفينيا)؛ زولفيا نيسانباييفا (طاجيكستان)؛ توكر إرغودر، ميسوت ييلديريم (تركيا)؛ كونستانتين
كراسوفسكي، نادجدا بولكا، تاتيانا أندرييفا (أوكرانيا).

إقليم جنوب شرق آسيا: ذوالفقار علي (بنغلادش)؛ سونام بونتشو (بوتان)؛ نونيك كوسوماوارداني (تيمور
الشرقية)؛ ديرندرا سينها، براكاش غوبتا، أورمي سن، سورندرا شاستري، فندان غاجالاكشمي، مونيك أرورا،
ميرا آغي، رامشوار شارما، م. براكاساما، ج. غوروراج، آرون تشادورفيدي، سانجيف ميسرا، ميهير شاه، راجيش
ديكسيت، ر. ثولاسيداسان، س.ك. جيندال (الهند)؛ تياندرأ يوغا أديتاما (إندونيسيا)؛ أحمد وحيد، ميمون أبو بكر
(المالديف)؛ نيو نيو كيانغ (ميانمار)؛ م.ر. باندي (نيبال)؛ ب.و. غوناسيكيرا (سري لانكا)؛ نيثات سيريتشوتيراتانا
(تايلاند).

إقليم غرب المحيط الهادئ: سيفيا سونيا (ساموا الأمريكية)؛ سين سوفان، سانغ فين تاك (كمبوديا)؛ جيانغبنغ
صن، جيانغ يوان (الصين)؛ إدوينا تانغاروا (جزر كوك)؛ ليرندا هادلي إينام، ماري آن إيبيريام (ولايات ميكرونيزيا
الاتحادية)؛ إيليزابيسي موفونو، موزس سالوسالو (فيجي)؛ فرانسيس فكتور إبريس، جولن ألماندرس (غوام)؛ صن ها
لي (كوريا)؛ خاتانافون باندوانغسي، أنوثاي كونغساياساك، كيركيو بوها، خامبوني إنسيكسينغمي (لاوس)؛
تشان تان موي (ماكاو)؛ مانيماران كريشان (ماليزيا)؛ دوندوغ جارغالسيخان، ل. إردنييار، بالام إختويا،
تسوغزولما باياندورج (مونغوليا)؛ أندرو موريهو وا (نيوزيلندا)؛ إيسامو أبراهام (جزر ماريانا الشمالية)؛ فاليري
ويس، أندرو تابلوال، سيلفيا ماتيناغ أندريز (بالاو)؛ جيسيكيا يايوبو، جيمس وانغي (بابوا غينية الجديدة)؛ مارينا
ميغيل-باكوبلود (الفلبين)؛ نانسي مكدونالد، هربرت بترز، تومافيموليايلي بوليكا (ساموا)؛ تشنغ تشي يونغ، فو
لنغ لي، كافن تشيونغ، لام سيان ليان (سنغافورة)؛ تيمانا آفانيتيلي (توفالو)؛ ونش غاراي (فانواتو)؛ هان ثي هاي
(فيتنام).

فريق الدعم من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: جولييت لي، فيرونكا لي، ميليسا لويس.

دعم معهد مثلث البحوث: دون سميث، ماثيوسنس.

