

اثر اسانس آویشن شیرازی بر روی احتمال رشد سالمونلا تیفی موریم در محیط آبگوشت قلب و مغز

افشین آخوندزاده بستی^{۱*}، دود رضویلر^۲، علی میثاقی^۳، رضا عباسی فر^۴، بهراد رادمهر^۵، فر حناز خلیقی سیگارودی^۶

- ۱- استادیار گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشکده دامپزشکی تهران
- ۲- استاد گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشکده دامپزشکی تهران
- ۳- استادیار گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشکده دامپزشکی تهران
- ۴- دستیار دکترای بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی تهران
- ۵- دستیار دکترای بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی تهران
- ۶- مریم پژوهش، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

*آدرس مکاتبه: تهران، دانشکده دامپزشکی، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۴۵۳
تلفن: (۰۲۱) ۶۴۳۸۱۴۱، نمبر: (۰۲۱) ۶۹۳۳۲۲

پست الکترونیک: aakhond@ut.ac.ir

چکیده

توجه و علاقه فزاینده به جایگزینی نگهدارنده‌های شیمیایی (ضدموکربی و ضداسیداسیون) با انواع طبیعی، موجب مطالعات زیادی در مورد منابع گیاهی و جستجوی انواع عصاره‌ها و اسانس‌های گیاهی شده است، تا بتوان جایگزینی مناسب و طبیعی برای نگهدارنده‌های شیمیایی پیدا نمود. در این مطالعه، لگاریتم درصد احتمال رشد سالمونلا تیفی موریم در محیط آبگوشت قلب و مغز متأثر از غلظت‌های مختلف (صفر، ۰/۰۳ و ۰/۰۶ درصد) اسانس آویشن شیرازی در طی ۲۱ روز نگهداری در سه درجه حرارت (۳۵، ۲۵ و ۱۵ درجه سانتی‌گراد) مورد بررسی قرار گرفت. لگاریتم درصد احتمال رشد سالمونلا تیفی موریم به‌طور معنی‌داری ($p < 0.05$)، آنالیز واریانس (ANOVA) تحت تاثیر غلظت‌های مختلف اسانس قرار گرفت. به‌طوری‌که در غلظت صفر درصد اسانس در درجات حرارت ۳۵، ۲۵ و ۱۵ درجه سانتی‌گراد به ترتیب $1/07$ ، $1/07$ و $0/06$ بود. در حالی‌که در غلظت $0/03$ درصد به ترتیب $-2/93$ ، $-3/24$ و $-3/24$ و در غلظت $0/06$ درصد به ترتیب $4/23$ ، $4/23$ و $4/23$ بود. بر طبق نتایج به‌دست آمده، درصد احتمال رشد سالمونلا تیفی موریم با افزایش غلظت اسانس کاهش پیدا کرد.

کل واژگان: اسانس آویشن شیرازی، سالمونلا تیفی موریم، لگاریتم درصد احتمال رشد

مقدمه

مطالعه، لگاریتم درصد احتمال رشد (Log Probability Percentage, Log P%) سالمونلا تیفی موریم (*Salmonella typhimurium*) (یکی از باکتری‌های موثر در عفونت‌های منتقله از راه مواد غذایی) در یک محیط آبگوشت قلب و مغز (Brain Heart Infusion Broth, BHI) غلظت‌های مختلف (صفر، ۰/۰۳ و ۰/۰۶ درصد) اسانس آویشن شیرازی در طی ۲۱ روز نگهداری در درجات حرارت ۳۵، ۲۵ و ۱۵ درجه سانتی‌گراد مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش کار

طرح آزمایش

بررسی اثرات اسانس آویشن شیرازی بر روی یکی از فاکتورهای رشدی یعنی Log P% سالمونلا تیفی موریم در محیط BHI متأثر از غلظت‌های مختلف (صفر، ۰/۰۳ و ۰/۰۶ درصد) اسانس، در طی ۲۱ روز نگهداری در درجات حرارت ۳۵، ۲۵ و ۱۵ درجه سانتی‌گراد.

تهیه اسانس و آنالیز آن

گیاه آویشن شیرازی از استان فارس در فصل تابستان جمع‌آوری شد و توسط گیاهشناس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی تایید نام علمی گردید. پس از تهیه اسانس گیاه به روش Steam distillation آنالیز اسانس توسط دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیف نگار جرمی (GC/MS) انجام شد. دستگاه GC/MS از نوع Thermoquest Finnigan با ستون مویینه به طول ۳۰ متر و قطر داخلی ۲۵۰ میکرومتر و ضخامت لایه داخلی ۰/۲۵ میکرومتر با برنامه دمایی ۵۰°C تا ۲۶۵°C با افزایش تدریجی ۰/۲۵ در هر دقیقه و نگهداری ستون در ۲۶۵°C به مدت ۳۰ دقیقه استفاده شد. دمای اتفاق تزریق ۲۵۰°C و گاز

در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان مواد غذایی توجه زیادی به استفاده از نگهدارنده‌های طبیعی (از جمله گیاهی) به جای شیمیایی در محصولات خود نموده‌اند. این امر از یک‌طرف به علت تمایل زیاد مصرف‌کنندگان به استفاده از مواد غذایی فرآوری شده بدون نگهدارنده و یا حتی‌المقدور با نگهدارنده‌های طبیعی و از طرف دیگر توجه هرچه بیشتر مسئولان و متولیان بهداشتی به این موضوع می‌باشد [۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴]. اسانس‌های به دست آمده از گونه‌های گیاهان معطر دارای مصارف زیادی در صنایع صابون‌سازی، عطرسازی، صنایع غذایی و غیره می‌باشند [۳]. تحقیقات زیادی در مورد اثرات ضدبacterیایی و نگهدارنده‌گی اسانس‌های گیاهی از جمله اسانس‌های به دست آمده از گیاهان خانواده *Lamiaceae* انجام شده است [۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۲، ۱۱، ۶]. آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) یکی از گیاهان این خانواده می‌باشد که بومی ایران، افغانستان و پاکستان است. گیاه Zataria multiflora Boiss. گیاهی بوته‌ای و دارای ساقه‌های متعدد، نازک، سخت و بسیار منشعب، به ارتفاع ۴۰ تا ۸۰ سانتی‌متر، گردینه‌پوش، سبز متمایل به سفید و معطر است. برگ آن کوتاه، دارای دمبرگ کوتاه، دور یا بیضی شکل با طول و عرض ۵-۷ میلی‌متر، در قاعده مقطع تقریباً قلبی شکل و در انتهای دور و توکچه‌دار است. گلهای آن سفید و کوچک گویچه‌ای بسیار متراکم و واقع در گل‌آذینه‌های باریک تسبیح مانند، ساده و برآکته‌ها پهن‌دراز است. کاسه گل غشایی کوتاه به طول ۲ میلی‌متر، ۵ پهلو و در زاویه‌ها مژکدار، دارای دندانه‌های مثلثی کوتاه می‌باشد. پرچم‌ها ۴ عدد و دو بهدو مساوی است. جام گل سفید و اندکی طویل‌تر از کاسه گل می‌باشد [۱۸]. از این گیاه در طب سنتی به عنوان آنتی‌سپتیک یاد شده است و به عنوان طعم‌دهنده مواد غذایی استفاده می‌شود [۵]. در این



باکتری در هر میلی‌لیتر بود (که بعد با کشت pour plate نیز تایید می‌شد)، لوله cuvett حاوی تقریباً 1×10^7 باکتری در هر میلی‌لیتر مشخص می‌شد. سپس از این لوله، سریال‌های رقت 10^0 تا 10^{-2} (رقت) با استفاده از لوله‌های رقت حاوی ۹ میلی‌لیتر آبگوشت BHI حاوی غلظت‌های مورد نظر (صفر، 0.02% و 0.06% درصد) اسانس که نحوه تهیه آن در ذیل آمده، تهیه می‌شد [۲].

تهیه محیط آبگوشت BHI با غلظت‌های مورد نظر اسانس

ابتدا جهت تهیه ۱۰۰ میلی‌لیتر آبگوشت پایه تقریباً مورد نیاز برای یک حالت، ۳/۷ گرم پودر محیط کشت BHI را در ۹۰ میلی‌لیتر آب مقطر در یک ارلن با حرارت ملایم حل نمودیم و سپس غلظت‌های مورد نظر (صفر، 0.02% و 0.06% درصد) اسانس، 10^0 درصد DMSO (به عنوان امولസیون‌کننده برای تمام حالت‌ها) و 0.05 درصد آگار آگار (به عنوان تثبیت‌کننده برای تمام حالت‌ها) را اضافه کردیم [۴، ۱۰]. در نهایت با استفاده از آب مقطر به حجم مورد نظر (100 میلی‌لیتر) رسیدیم. سپس محتویات تهیه شده در اrlen را در لوله‌های (رقت) در پیچ‌دار (هریک به میزان ۹ میلی‌لیتر) پخش کردیم و در اتوکلاو 121 درجه سانتی‌گراد 15 دقیقه) استریل نمودیم. قابل توضیح است، از آنجایی‌که سه غلظت اسانس برای 3 درجه حرارت در این آزمایش در نظر گرفته شد، بنابراین در مجموع نه حالت داشتیم. برای هر حالت نیز، دقیقاً 72 میلی‌لیتر آبگوشت (با غلظت مورد تظر اسانس) برای تهیه 8 رقت هر کدام 9 میلی‌لیتری، مورد نیاز بود [۲].

تلقیح آبگوشت BHI و گرمخانه گذاری

همان‌گونه که گفته شد از لوله cuvett با جذب نوری که مشخص‌کننده 1×10^7 باکتری در هر میلی‌لیتر بود، سریال‌های رقت 10^0 تا 10^{-2}

حاصل هلیم با سرعت $1/5$ میلی‌لیتر در دقیقه بود. شناساگر EI با انرژی یونیزاسیون 70 الکترون‌ولت و دمای منبع یونیزاسیون 250° بود.

ارگانیسم مورد مطالعه

کشت لیوفلیزه سالمونلا تیفی موریم شماره 138 فاژ تایپ 2 (توسط انسستیتو پاستور فرانسه) تهیه شده از گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی تهران جهت این بررسی مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا این کشت لیوفلیزه در محیط آبگوشت BHI در 37 درجه سانتی‌گراد به مدت 18 ساعت، دو مرتبه به طور متواالی تجدید کشت داده شد. سپس کشت دوم به میزان پنج به یک با گلیسرین استریل مخلوط شد و در قسمت‌های مساوی در لوله‌های میکروسانتریفیوژ اپندرف استریل در -20° درجه سانتی‌گراد نگهداری شد.

تهیه میزان تلقیح باکتریایی

تهیه میزان تلقیح باکتری مورد آزمایش، با انتقال باکتری از لوله میکروسانتریفیوژ اپندرف به محیط آبگوشت BHI و نگهداری به مدت 18 ساعت در 37 درجه سانتی‌گراد انجام گرفت. مجدداً کشت دومی از این کشت 18 ساعت‌هه اول، در آبگوشت BHI دیگر (به مدت 18 ساعت، 37 درجه سانتی‌گراد) تهیه شد. سپس لوله‌های cuvett حاوی 5 میلی‌لیتر آبگوشت BHI استریل تهیه شد. سپس، مقادیر مختلفی از کشت آبگوشت 18 BHI ساعت‌هه دوم بر روی لوله‌های cuvett مختلف مذکور برده شد. با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (Milton Roy company, USA) در طول موج 600 نانومتر، جذب نوری لوله‌های مذکور خوانده شد. از محتویات این لوله‌های cuvett، شمارش باکتریایی به روش pour plate انجام شد و در آخر، لوله cuvett حاوی تقریباً 1×10^7 باکتری در هر میلی‌لیتر مشخص شد. بدین ترتیب در هر بار انجام آزمایش (تعیین لگاریتم درصد احتمال رشد)، با مشخص شدن جذب نوری که معادل تقریباً 1×10^7



استفاده در این مطالعه با استفاده از GC-MS در جدول شماره ۱ نشان داده شده است. همان‌گونه که در جدول آمده، بیشترین ترکیب تشکیل‌دهنده اسانس، کارواکرول carvacrol (۷۱/۱۲ درصد) است.

نتایج حداقل Log P% سالمونلاتیفی موریم مورد مطالعه در آبگوشت BHI متأثر از غلظت‌های مختلف (صفر، ۰/۰۳ و ۰/۰۶ درصد) اسانس مذکور در طی ۲۱ روز نگهداری در درجات حرارت ۳۵، ۲۵ و ۱۵ درجه سانتی‌گراد در جدول شماره ۲ نشان داده شده است. در این جدول، روز رسیدن به حداقل Log P% است. تاثیر معنی‌دار ($p < 0.05$) غلظت‌های مختلف اسانس بر روی Log P% با استفاده از آنالیز واریانس نشان داده شد.

بحث

اسانس‌های گیاهی یکی از منابع بالقوه واجد ترکیبات ضدبacterیایی می‌باشند و برای این منظور بسیار موثر و مفید هستند [۱]. مقایسه نتایج گزارش شده در مورد خواص ضدبacterیایی اسانس‌های مختلف بسیار مشکل می‌باشد. از دلایل آن می‌توان به تفاوت در روش‌های مختلف بررسی خواص ضدبacterیایی اسانس‌ها، منابع تهیه آنها و سویه‌های bacterیایی به‌کار برده شده نام برد [۱۵، ۱۳، ۱۱، ۱۰]. به‌طور کلی، ترکیبات اسانس‌های گیاهی بر حسب منطقه جغرافیایی رویش این گیاهان، واریته گیاهی، سن گیاه در هنگام تهیه اسانس، روش خشک کردن و استخراج اسانس متفاوت می‌باشد [۱]. مدل‌های مختلفی در مطالعات مختلف به منظور بررسی اثرات ضدبacterیایی و نگهدارنده‌گی اسانس‌های گیاهی استفاده شده است. در برخی از این روش‌ها از مدل‌های آزمایشگاهی مثل محیط کشت و در برخی دیگر از مدل‌های غذایی برای بررسی اثرات ضدبacterیایی اسانس‌ها استفاده شده است [۸، ۹، ۱۲، ۱۶، ۱۷]. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده نتایج به‌دست آمده در مطالعات مختلف بعضًا متفاوت می‌باشد.

در مطالعه حاضر، از روش ۲۴ لوله‌ای شمارش

(RQ) با استفاده از لوله‌های RQ حاوی ۹ میلی‌لیتر آبگوشت BHI حاوی غلظت‌های مورد نظر (صفر، ۰/۰۳ و ۰/۰۶ درصد) اسانس تهیه شد. از آنجایی‌که از روش ۲۴ لوله‌ای شمارش بیشترین تعداد احتمالی (Most Probable Number, MPN) برای تعیین لگاریتم درصد احتمال رشد باکتری استفاده شد، لذا محتویات (۹ میلی‌لیتری) هر یک از لوله‌های در پیچ‌دار، به‌طور استریل در قسمت‌های مساوی ۲ میلی‌لیتری در داخل ۳ لوله سرپوش‌دار (Becton Dickson ۱۶×۱۰۰ mm) استریل ریخته و بدین ترتیب مجموع $3 \times 8 = 24$ لوله برای هر حالت به‌دست آمد [۲]. هر مجموعه ۲۴ لوله‌ای در هر یک از حرارت‌های مورد نظر در مطالعه یعنی ۳۵، ۲۵ و ۱۵ درجه سانتی‌گراد به‌مدت ۲۱ روز نگهداری شدند. در طی این مدت ۱۲ دفعه (روزهای صفر، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۱) تمام لوله‌ها جهت مشاهده دورت رشدی قابل روئیت مورد بررسی قرار گرفتند [۲].

محاسبه لگاریتم درصد احتمال رشد (Probability Percentage, Log P%)

Log P% از روی تعداد لوله‌های مثبت (کدورت قابل روئیت حاصل از رشد باکتری) در طی ۲۱ روز نگهداری، با استفاده از فرمول:

$$\text{Log P\%} = 2 - (\log I/3 - \log MPN/3)$$

محاسبه شد [۲، ۱۴]؛

$\log I/3$ = لگاریتم میزان دوز تلقیح در یک میلی‌لیتر

$\log MPN/3$ = لگاریتم تعداد احتمالی باکتری‌ها در یک میلی‌لیتر

آنالیز آماری

اثر غلظت‌های مختلف اسانس بر روی Log P% با استفاده از آنالیز واریانس و با کمک نرم افزار SPSS 10.0 for Windows, SPSS Inc.) ارزیابی شد.

نتایج

نتیجه آنالیز ترکیبات اسانس آویشن شیرازی مورد



**جدول شماره ۱- نتایج آنالیز اسانس آویشن شیرازی مورد مطالعه
با استفاده از GC-MSj**

درصد	اندیس بازداری	نام ترکیب
۰/۱۹	۹۳۰	Thujene
۴/۲۶	۹۳۷	Alpha-Pinene
۰/۴۳	۹۷۶	Beta-Pinene
۰/۸۵	۹۸۵	Beta-myrcene
۲/۳۷	۱۰۲۴	Eucaliptol
۷/۳۴	۱۰۰۵	Gama-Terpinene
۰/۶۸	۱۰۹۰	Linalool
۰/۴۷	۱۲۲۶	Thymol methyl ether
۰/۴۶	۱۲۴۳	Carvacrol methyl ether
۷۱/۱۲	۱۲۹۹	Carvacrol
۰/۴۱	۱۴۱۸	Trans-Caryophyllene
۲/۳۲	۱۵۸۲	Globulol
۹۱/۹۰		جمع

**جدول شماره ۲- مداکثر لگاریتم درصد احتمال رشد (Log P%) سالمونلاتیفی موریم در آبگوشت BHI
متاثر از غلظت‌های مختلف اسانس آویشن شیرازی در طی ۲۱ روز نگهداری در درجات حرارت مختلف و (روز رسیدن به مداکثر Log P%).**

D	Log P%	حداکثر غلظت اسانس آویشن شیرازی (درصد)	درجہ حرارت بر حسب سانتیگراد
.	۱/۰۷	.	۳۵
.	-۲/۹۳	۰/۰۳	
۱	-۴/۲۳	۰/۰۶	
۱	۱/۰۷	.	۲۵
۱	-۳/۲۴	۰/۰۳	
۵	-۴/۲۳	۰/۰۶	
۳	۰/۴۱	.	۱۵
۵	-۳/۲۴	۰/۰۳	
۱۵	-۴/۲۳	۰/۰۶	

فاکتورهای رشدی باکتریایی یعنی Log P% استفاده شد [۲، ۱۴]. در این بررسی همان‌گونه که گفته شد، به منظور ایجاد و حفظ (ثبتیت) حالت امولسیون اسانس مذکور در محیط BHI در طی مطالعه به ترتیب از DMSO و آگار آغاز استفاده شد [۱۰، ۱۴].

MPN، بر اساس شمارش لوله‌ها با کدورت قابل روئیت (به علت رشد باکتری سالمونلاتیفی موریم تلقیح شده در محیط BHI با غلظت‌های مختلف اسانس در طی ۲۱ روز نگهداری در درجات حرارت ۱۵، ۲۵ و ۳۵ درجه سانتیگراد) برای تعیین یکی از



۰۴ نانومتر و سپس کشت بر روی (Triptic Soy agar) مورد بررسی قرار گرفت. آنها نشان دادند که کارواکرول اثرات ضد باکتری قوی بر هر دو سویه مورد مطالعه با MIC ۲۵۰ ماکروگرم در میلیلیتر داشت. در همین تحقیق، کارواکرول با غلظت ۳ درصد در ۲۰ Tween یک درصد، اثر کشنده‌گی قوی را بر سویه‌های مقاوم به ریفامپیسین در یک نمونه غذای ماهی (fish cube) نشان داد [۷].

در مطالعه دیگری، Karaman و همکاران (۲۰۰۱)، اثرات باکتریو استاتی قوی اسانس Thymus revolutus را بر روی ۱۱ باکتری گرم منفی و گرم مثبت نشان دادند. آنها علت احتمالی این اثرات را میزان بالای کارواکرول موجود در اسانس بیان نمودند. مطالعه مشابه، توسط رسولی و همکاران در سال ۲۰۰۲ بر روی اثرات باکتریوسیدی اسانس Thymus pubescus (با میزان بالای کارواکرول) بر روی باکتری‌های گرم مثبت و منفی (با استفاده از روش disk diffusion) انجام شد و همانند مطالعه قبلی، احتمال اثر باکتریوسیدی قوی اسانس مورد مطالعه، میزان بالای کارواکرول موجود در اسانس بیان شد [۶]. نتایج مشابه دیگری توسط Baganboula و همکاران در سال ۲۰۰۴ بر روی اثرات اسانس و ترکیبات کارواکرول و تیمول بر روی باکتری شیگلا سونئی (*Shigella sonnei*) و شیگلا فلکسنری (*Shigella flexneri*) به دست آمد [۱].

از آنجایی که کارواکرول در اسانس استخراج شده از آویشن شیرازی مورد مطالعه ما، ترکیب اصلی و بیشترین جزء تشکیل‌دهنده (۷۱/۱۲ درصد) می‌باشد، چنین بیان می‌شود که احتمال اثر جلوگیری از رشد اسانس مذکور در غلظت‌های مورد مطالعه ما نیز همین میزان بالای کارواکرول موجود در اسانس باشد.

با توجه به نتایج به دست آمده در تحقیق، اسانس مورد نظر در غلظت‌های انک (۰/۰۳ و ۰/۰۶ درصد)، دارای اثر جلوگیری از رشد معنی‌داری ($p < 0.05$) بود. لذا چنین نتیجه‌گیری می‌شود که این اسانس

در ضمん برای در نظر گرفتن اثرات احتمالی (حتی ناچیز) ضدباکتریایی این دو ترکیب، کلیه محیط‌های BHI تهیه شده، حتی محیط‌های (حالات‌های) بدون DMSO و آگار بودند. بر طبق نتایج به دست آمده، اسانس آویشن شیرازی مورد مطالعه، اثر معنی‌داری ($p < 0.05$) را در غلظت‌های مورد استفاده (صفر، ۰/۰۳ و ۰/۰۶ درصد)، بر روی Log P% سالمونلا تیفی موریم در طی ۲۱ روز نگهداری در درجات حرارتی مختلف مورد مطالعه نشان داد. به‌طوری‌که در ۳۵ درجه سانتی‌گراد در طی ۲۱ روز نگهداری، حداقل Log P% باکتری در غلظت صفر درصد اسانس ۱/۰۷ بود در حالی‌که این میزان در غلظت ۰/۰۳ درصد ۲/۹۳ و در غلظت ۰/۰۶ درصد ۴/۲۳ بود که به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. در درجه سانتی‌گراد در طی ۲۱ روز نگهداری، حداقل Log P% در حضور صفر، ۰/۰۳ و ۰/۰۶ درصد اسانس به ترتیب ۱/۰۷، ۱/۰۷-۳/۲۴ و ۱/۰۷-۳/۲۴ درجه سانتی‌گراد به ترتیب ۱/۰۷-۳/۲۴ و ۱/۰۷-۳/۲۴ بود، که به میزان قابل توجهی نیز کاهش پیدا کرد. مطالعات مختلفی در مورد اثرات ضدباکتریایی اسانس‌های گیاهی خانواده Lamiaceae (که گیاه آویشن شیرازی مورد مطالعه ما هم در این خانواده قرار دارد) و برخی از ترکیبات شناخته شده مهم در اسانس‌های این خانواده از جمله کارواکرول و تیمول (thymol) وجود دارد. در مطالعه انجام شده توسط Kim و همکاران در سال ۱۹۹۵، اثرات ضدباکتریایی و Minimum Inhibitory Concentration (MIC) و Minimum bacteriocidal Concentration (MBC) کارواکرول بر روی سالمونلا تیفی موریم و سویه مقام Triptic Soy agar آن در محیط به استفاده از دیسک‌های کاغذی آغازته به غلظت‌های مورد نظر کارواکرول و تعیین منطقه جلوگیری از رشد (از روی اندازه‌گیری کورت رشد با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج



دامپزشکی تهران به منظور تامین هزینه انجام این تحقیق و آقای مهندس یزدانی و آقای دکتر رضازاده در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی.

احتمالاً می‌تواند به عنوان یک نگهدارنده و ضدباکتری مناسب لاقل علیه برخی از باکتری‌های گرم منفی از جمله باکتری مورد مطالعه، در برخی از مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

تشکر و قدردانی

با تشکر و قدردانی از معاونت پژوهشی محترم
دانشکاه تهران و معاونت پژوهشی محترم دانشکده

منابع

1. Bagamboula CF, Uyttendaele M and Debevere J. Inhibitory effect of thyme and basil essential oils, carvacrol, thymol, estragol, linalool and *p*-cymene towards *Shigella sonnei* and *S. flexneri*. *Food Microbiol.* 2004; 21: 33-42.
2. Basti AA and Razavilar V. Growth response and modeling of the effects of selected factors on the time-to-detection and probability of growth initiation of *Salmonella typhimurium*. *Food Microbiol.* 2004; 21: 431-8.
3. Cimanga K, Kambu K, Tona L, Apers S, De Bruyne T, Hermans N, Totte J, Pieters L and Vlietinck AJ. Correlation between chemical composition and antibacterial activity of essential oils of some aromatic medicinal plants growing in Democratic Republic of Congo. *J. Ethnopharmacol.* 2002; 79: 213-20.
4. Delaquis PJ, Stanich K, Girard B and Mazza G. Antimicrobial activity of individual and mixed fractions of dill, cilantro, coriander and eucalyptus essential oils. *Int. J. Food Microbiol.* 2002; 74: 101-9.
5. Hosseinzadeh H, Ramezani M and Salmani G-a. Antinociceptive, anti-inflammatory and acute toxicity effects of *Zataria multiflora* Boiss extracts in mice and rats. *J. Ethnopharmacol.* 2000; 73: 379-85.
6. Karaman S, Digrak M, Ravid U and Ilcim A. Antibacterial and antifungal activity of essential oils of *Thymus revolutus* Celak from Turkey. *J. Ethnopharmacol.* 2001; 76: 183-6.
7. Kim JM, Marshall MR, Cornell JA, Preston III JF and Wel CI. Antibacterial activity of carvacrol, citral and Geraniol against *Salmonella typhimurium* in culture medium and fish cube. *J Food Sci.* 1995; 60: 1364-8.
8. Koutsoumanis K, Lambropoulou K and Nyhas G-JE. A predictive model for the non-thermal inactivation of *Salmonella enteritidis* in a food model system supplemented with a natural antimicrobial. *Int. J. Food Microbiol.* 1999; 49: 63-74.
9. Lemay M-J, Choquette J, Delaquis PJ, Gariepy C, Rodrigue N and Saucier L. Antimicrobial effect of natural preservatives in a cooked and acidified chicken meat model. *Int. J. Food Microbiol.* 2002; 78: 217-226.
10. Mann CM and Marham. A new method for determining inhibitory concentration of essential oils. *J. Applied Microbiol.* 1998; 84: 538 - 44.
11. Marilena M, Bersani C and Comi G. Impedance measurements to study the antimicrobial activity of essential oils from *Lamiaceae* and *Composita*. *Int. J. Food Microbiol.* 2001; 67: 187-95.
12. Palmer AS, Steward J and Fyfe. The potential application of plant essential oils as



- natural preservatives in soft cheese. *Food Microbiol.* 2001; 18: 463-70.
- 13.** Rasooli I and Mirmostafa SA. Antibacterial properties of *Thymus pubescens* and *thymus sepyllum* essential oils. *Fitoterapia* 2002; 73: 244-50.
- 14.** Razavilar V and Genigeorgis C. Prediction of *Listeria* spp. growth as affected by various levels of chemicals, pH, temperature and storage time in model broth. *Int. J. Food Microbiol.* 1998; 40: 149-57.
- 15.** Tassou C, Koutsoumanis K and Nychas G-JE. Inhibition of *Salmonella enteritidis* and *Staphylococcus aureus* in nutrient broth by mint essential oil. *Food Research Int.* 2000; 33: 273-80.
- 16.** Tassou C and Nychas G-JE. Antimicrobial activity of essential oil of mastic gum (*Pistacia lentiscus* var. *chia*) on gram positive and gram negative bacteria in broth and in model food system. *Int. Biodeterioration and Biodegradation* 1995; 411 - 20.
- 17.** Valero M and Salmeron MC. Antibacterial activity of 11 essential oils against *Bacillus cereus* in tyndallized carrot broth. *Int. J. Food Microbiol.* 2003; 85: 73-81.
۱۸. کمیته تدوین فارماکوپه گیاهی ایران. فارماکوپه ایران. چاپ اول. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت غذا و دارو). ۱۳۸۱، جلد اول، صفحه ۵۱.