

اثر ضد قارچی عصاره تام مтанولی، فراکسیون های مтанولی، آبی و کلروفرمی سر *Ephedra pachyclada* Boiss شاخه های هوایی گیاه

پگاه مسلمی^۱، سید رضا حسینی دوست^۲، زینوس عسگرپناه^۳، مهدی رزاقی ابیانه^۴

^۱ دانشجوی دکتری حرفه‌ای داروسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی

^۲ استاد، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی

^۳ استادیار، گروه فارماکوگنوزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی

^۴ دانشیار، گروه قارچ شناسی، انسیستیتو پاستور ایران

چکیده

سابقه و هدف: افزایش استفاده از داروهای ضد قارچ علیه عفونت های قارچی و عوارض جانبی جدی بعضی از این داروها و نیز بروز مقاومت نسبت به آنها، توجه محققین را به یافتن درمان های کمکی و جایگزین از جمله استفاده از گیاهان دارویی معطوف کرده است. در این مقاله اثر ضد قارچی عصاره تام مтанولی و فراکسیون های اتیل استاتی، کلروفرمی، مтанولی و آبی بخش های هوایی گیاه هوم بررسی شد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی، از بخش های هوایی *Ephedra pachyclada* عصاره و فراکسیون های ذکر شده و به روش ماسراسیون تهیه گردید. جهت تعیین اثرات ضد قارچی غلظت های ۳۱/۲۵، ۶۲/۵، ۱۲۵، ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم/میلی لیتر از عصاره تام و فراکسیون های مختلف تهیه گردید و بر روی ۵ سوش قارچی، شامل کاندیدا آلبیکننس، فوزاریوم اکسیسپوریوم، آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس، به روش *Disc diffusion* مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: عصاره تام مтанولی، فراکسیون مтанولی و آبی و کلروفرمی بر روی قارچ کاندیدا آلبیکننس اثر خوبی داشت، اما بر روی سایر سوش ها هیچ گونه اثر ضد قارچی نداشت.

نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که این گیاه محتوی مواد ضد قارچ کاندیدا آلبیکننس است. ادامه تحقیقات در جهت شناسایی و جداسازی ماده موثره موجود در عصاره گیاه مورد نظر و تعیین اثر ضد قارچی آن پیش نیاز نتیجه گیری کاربردی تر نتایج این تحقیق است.

واژگان کلیدی: اثر ضد قارچی، عصاره، افدر، آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس فلاووس، فوزاریوم، اکسیسپوریوم، کاندیدا آلبیکننس

مهم ترین و قدیمی ترین بیماری های عفونی هستند که درمان آنها مستلزم داروهای اختصاصی بوده و فرایند تولید و عرضه هریک نیازمند زمان و هزینه قابل توجه است. قارچ هایی نظیر آسپرژیلوس فلاووس، آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس فومیگاتوس، فوزاریوم اکسیسپوریوم و کاندیدا آلبیکننس از جمله عوامل عفونی قارچی هستند و مقاومت های دارویی در مورد آنها به طور نگران کننده ای رو به افزایش است (۲).

امروزه بخش بزرگی از داروهای مصرفی در کارخانه های شیمیایی سنتز می شوند، تخمین زده می شود که دست کم

مقدمه

شیوع مقاومت دارویی در میان عوامل عفونی یک مشکل عمومی محسوب می گردد که سلامت مردم را در همه نقاط گیتی تحت تاثیر قرار می دهد. بروز و گسترش مقاومت های دارویی در بسیاری از عوامل عفونی مثل باکتری ها، قارچ ها، تک یاخته ها و ویروس ها دیده شده است (۱). عفونت های قارچی از جمله

آدرس نویسنده مسئول: تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی، گروه میکروبیولوژی، دکتر سید رضا حسینی دوست (email: rhdoust@iaups.ac.ir)

تاریخ دریافت مقاله: ۹۳/۲/۳۰
تاریخ پذیرش مقاله: ۹۳/۷/۲

کاندیدازیس به صورت حاد، تحت حاد یا مزمن و اسپورادیک بوده و ممکن است دهان، گلو، پوست، واژن، انگشتان، ناخن‌ها، نای، ریه یا دستگاه گوارش را در برگیرد (۱۱). البته کاندیدا البیکنس جزو فلور نرمال بدن محسوب می‌شود و در شرایطی منجر به بیماری‌های موضعی به خصوص در واژن و نواحی پوستی می‌گردد (۱۲). بیمارانی که سیستم ایمنی طبیعی دارند نسبت به درمان موضعی با نیستاتین، آمفوتریسین B و یا ایمیدازول‌ها به خوبی پاسخ می‌دهند. عفونت‌های عمقی تر به درمان سیستمیک نیاز دارند و در بسیاری از موارد فلوكونازول خوارکی می‌تواند در درمان کاندیدازیس کاملاً موثر باشد (۱۱). با توجه به شیوع مقاومت دارویی در سویه‌های قارچی بیماری‌زاء امروزه تحقیق در مورد مواد و ترکیبات ضد قارچی موجود در گیاهان مورد حمایت و تشویق مراکز و مجامع پژوهشی بوده و تاکنون داروهای متعددی در این راستا مورد آزمایش قرار گرفته‌اند (۱۳). امروزه تعداد زیادی از داروهای ضد قارچی و ضد باکتریایی موثر برای درمان این عوامل عفونی به کار گرفته‌می‌شوند، اما با توجه به تنوع ژنتیکی ایجاد شده در عوامل بیماری‌زای قارچی و پیدایش سویه‌های مقاوم و همچنین عوارض جانبی ناشی از مصرف این داروها، جایگزین کردن آنها توسط داروهای ضد قارچی با منشا گیاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و انجیزه‌ای برای تحقیقات در زمینه یافتن داروهای گیاهی بدون عوارض جانبی شده است. با توجه به اثر ضد قارچی دیگر گونه‌های جنس افردا، در این مقاله اثر ضد قارچی عصاره تمام مтанولی، فراکسیون مтанولی، آبی و کلروفرمی حاصل از بخش هوایی *Ephedra pachyclada* علیه آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس فلاووس، فوزاریوم اکسیسپوریوم و کاندیدا بررسی شد.

مواد و روشها

در این پژوهش تجربی، اثر ضد قارچی عصاره تمام مтанولی و فراکشن‌های مтанولی و آبی و کلروفرمی روی قارچ‌های نامبرده بررسی شد و حداقل غلظت مهار کننده عصاره‌های موثر بر روی قارچ‌ها مطالعه شد.

گیاه افردا در فصل تابستان از استان هرمزگان (کوه گنو) جمع آوری شد. سپس نمونه‌های گیاهی توسط آب مقطر شستشو داده شد و با پارچه تمیزی آب آنها گرفته شد و سپس داخل پارچه سفید رنگ تمیزی به مدت ۵-۴ روز در دمای محیط و در سایه و دور از نور و رطوبت خشک شد. در انتهای توسط

۱/۳ فرآورده‌های دارویی، یا منشا گیاهی دارند و یا پس از استخراج از گیاه تغییر شکل یافته اند و یا از روی ماده موثره گیاه تهیه شده اند. البته به نظر می‌رسد کارهای بیشتری در این زمینه نیاز باشد. به طور مثال، از ۳۵۰ هزار گونه گیاهی کشورمان، فقط در حدود ۸-۱۰ هزار گونه از نظر دارویی بررسی شده‌اند (۳). گیاه افردا پاچیکلادا (*Ephedra pachyclada*) در تیره افرداش به دلیل داشتن آکالوئیدهایی همچون افردرین، سودوافدرین و نورسوودافدرین مورد توجه زیادی هستند. گیاه افردا (ریش بز؛ ارمک) از خانواده افرداش بوده و از جمله گیاهان دارویی مهم محسوب می‌گردد و از این جنس ۱۲ گونه در ایران گزارش گردیده است. این گیاه به نام‌های محلی هوموخ، قاتورفویروقی و کچی سقلی نامیده می‌شود. این گیاه اثر بازنده برونیش، ضد سرفه، ضد آسم و ضد تب دارد (۴).

افدرها گیاهانی بوته‌ای، به ارتفاع ۰/۰ تا یک متر گاهی درختچه‌ای کوچک، دارای ساقه بند و برگ‌های کوچک و نازک در محل بند می‌باشند. گلهای آنها عموماً به صورت شاتون‌های نر و ماده بر روی دو پایه جدا از هم ظاهر می‌شوند. قسمت مورد استفاده دارویی این گیاه قسمت‌های سبزی باشد (۵). ماده مؤثر آن افردرین و پسدوافدرین می‌باشد. فرم کلریدرات افردرین در درمان بیماری آسم استفاده می‌گردد و مقدار آن به تناسب محل رویش گیاه تغییرمی‌نماید (۶). گونه‌های مهم آسپرژیلوس از نظر پژوهشی، آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس نیجر هستند. این آسپرژیلوس‌ها از جمله قارچ‌های بیماری‌زا هستند که از طریق ورود اسپور به بدن انسان باعث آلدگی شده و عفونت آن به ویژه در افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی مهاجم و بسیار جدی است. حتی در افراد سالم نیز آسپرژیلوس می‌تواند عفونت موضعی در ریه، سینوس‌ها و سایر نقاط بدن ایجاد کند (۷). آسپرژیلوزیس مهاجم حاد ریوی، آسپرژیلوزیس انسداد برونیشی و التهاب برونیشی، آسپرژیلوزیس مغزی، آسپرژیلوزیس پوستی، آسپرژیلوس‌های ریوی، آسپرژیلوزیس نکروز دهنده مژمن ریوی می‌باشد (۸). داروهای انتخابی برای درمان عفونت‌های آسپرژیلوس، آمفوتریسین B، وریکونازول و ایتراکونازول هستند (۸،۹). فوزاریوم‌ها (فوزاریوم مونیلیفورم، فوزاریوم سولانی، فوزاریوم اکسی سپوروم) نیز می‌توانند عفونت‌های منتشره قارچی ایجاد کند و عمدتاً به آمفوتریسین B مقاوم و به وریکونازول نسبتاً حساس هستند (۱۰). کاندیدا البیکنس از جمله کاندیداهای مهم است که در انسان عفونت‌های اولیه و ثانویه ایجاد می‌کند. سیر بالینی

شد و سپس تعداد اسپور قارچ‌ها با لام نئوبار شمارش شد و سوسپانسیونی معادل 1×10^6 cfu/ml در هر میلی لیتر تهیه شد (۱۵).

برای سنجش قطره‌های رشد، بر روی محیط کشت مولر هینتون آگار کشت متراکم تهیه گردید. سپس ۲۰ میکرولیتر از غلظت‌های مختلف عصاره یا فراکشن‌های آن به دیسک بلانک آنتی بیوتیک (۴ میلی‌متری) وارد و اجازه داده شد تا تحت شرایط آسپتیک خشک شوند. این دیسک‌ها تا زمان استفاده در ظروف مخصوص و در دمای یخچال نگهداری شدند. غلظت نهایی عصاره تمام و فراکسیون‌های مربوطه در هر دیسک به ترتیب ۵۰۰، ۲۵۰، ۱۲۵، ۶۲/۵ و ۳۲/۲۵ میلی‌گرم بود. پلیت‌های محتوی کاندیدا آلبیکنس در انکوباتور با دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد و پلیت‌های محتوی سایر سوش‌ها در انکوباتور با دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد گرمخانه گذاری شدند. قطره‌های عدم رشد در کاندیدا گرمخانه گذاری شدند. قدرت قارچ‌های عدم رشد در هزار بعد از ۴۸ ساعت و در سایر سوش‌ها بعد از یک هفته قرائت و اندازه گیری گردید.

جهت تعیین MIC، غلظت‌هایی از عصاره تمام یا فراکشن‌هایی که دارای قطره‌های عدم رشد بیش از ۱۰ میلی‌متر بودند، انتخاب شدند. غلظت مورد نظر عصاره در درون چاهک‌های پلیت‌های ۹۶ خانه‌ای به کمک RPMI از یک هشتادم تا یک در هزار دویست و هشتادم رقیق شده و ۱۰۰ میکرولیتر از سوسپانسیون نیم مک فارلند به هر چاهک اضافه گردید. پس از گرمخانه گذاری چاهک‌هایی که هیچگونه رشدی از قارچ مربوطه در آن وجود نداشت، به عنوان MIC آن غلظت تعیین گردید. MFC عصاره‌های مورد نظر نیز به همین ترتیب تعیین گردید.

یافته‌ها

عصاره تمام متنالوی، فراکشن متنالوی، آبی، کلروفرمی سر شاخه هوایی گیاه *Ephedra pachyclada* بر روی آسپرژیلوس نیجر، آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس فلاووس و فوزاریوم اکسیسپوریوم به روش دیسک دیفیوژن بی تاثیر بود و فقط بر روی کاندیدا آلبیکنس اثر خوبی نشان داد.

نتایج به دست آمده از بررسی اثرات ضد قارچی عصاره تمام متنالوی و فراکشن‌های متنالوی، آبی، کلروفرمی سر شاخه هوایی گیاه *Ephedra pachyclada* بر روی کاندیدا آلبیکنس به روش disc diffusion و MIC در جدول ۱ و ۲ آمده است.

آسیاب برقی کاملاً پودر شده و در ظرف‌های شیشه‌ای تیره رنگ و در بسته و مقاوم در برابر نور و رطوبت نگهداری شدند. عصاره تمام متنالوی گیاه با روش ماسرسایون طی ۱۰ روز تهیه گردید. به این ترتیب که ابتدا یک تکه پنبه در انتهای دستگاه پرکولاتور قرار داده و سپس پودر گیاه را به طور یکنواخت در پرکولاتور ریخته و با وارد کردن فشار یکنواخت به سطح پرکولاتور دستگاه از پودر پر شد. سپس حلال متنالوی بر روی پودر ریخته شد تا اندازه‌ای که روی سطح آن را بپوشاند. در این بررسی، از متنالول جهت تهیه عصاره تمام ۹ روز در ۳ مرحله‌ی ۳ روزه استفاده شد. برای تهیه فراکسیون‌ها از روش Liquid-Liquid Fractionation استفاده شد. به این صورت که ۱۰ میلی‌لیتر حلال کلروفرم را بر روی عصاره تمام متنالوی خشک شده ریخته آنقدر هم زدیم و با کاغذ صافی صاف کردیم. پس از آنکه حلال بی رنگ شد، حلال بعدی یعنی اتیل استات را اضافه کردیم و پس از بی رنگ شدن از حلال‌های دیگر متنالول و آب استفاده کردیم. جهت تهیه فراکسیون‌های مورد نظر از حلال‌هایی چون کلروفرم – اتیل استات، متنالول و آب استفاده شد.

پس از جمع آوری عصاره تمام و فراکسیون‌ها، آنها را توسط دستگاه Rotary evaporator در درجه حرارت ۳۵ درجه سانتی‌گراد و ۱۰۰ دور در دقیقه تغليظ کرده و با قراردادن عصاره‌های تغليظ شده در هوای آزاد، عصاره‌ها بسته به میزان فرار بودن حلال بین ۱-۱۰ روز کاملاً حلال خود را از دست داده و خشک شدند. برای تغليظ نمونه‌های آبی از بن ماری استفاده شد. لازم به ذکر است که به منظور ممانعت از کپک زدگی عصاره آبی از رها کردن آن در هوای آزاد به مدت طولانی خودداری شد. در زمان‌هایی که عصاره از بن ماری به جهت ادامه کار در روز آتی خارج می‌شد، عصاره‌ها را در یخچال قرار داده و تا روز بعد در همان جا نگه داری می‌شد. عصاره تمام و فراکسیون‌های تهیه شده از گیاه درون ظرف پلاستیکی که از قبل توزین شده بود، ریخته شده و برای مرحله بعد یعنی بررسی اثر ضد قارچی در یخچال نگهداری شد (۱۴).

سوش‌های قارچی استاندارد از آزمایشگاه قارچ شناسی انسستیتو پاستور ایران تهیه و روی محیط کشت سابروکستروز آگار، محیط مولر هینتون آگار و محیط (Qlab) RPMI کشت و نگهداری شدند. کشت ۴۸ ساعته جهت تهیه سوسپانسیون، استفاده شد. بدین صورت که مقداری آب مقطر استریل به لوله‌ها افزوده شد. سپس سطح کلنی‌ها توسط پیپت پاستور استریل خراشیده شد و مایع رویی در یک لوله استریل ریخته

ناچیز است. از این رو استفاده از این ماده موثر احتمالاً اثر مهار کنندگی به مراتب افزون تری خواهد داشت و در آن شرایط با اثر داروهایی مثل کتوکونازول قابل مقایسه خواهد بود.

تحقیقات مشابه نشان می دهند که عصاره سایر گونه های جنس افرا از جمله *Ephedra major* قادر به مهار رشد قارچ آسپرژیلوس و تولید آفلاتوکسین از آن است (۱۸، ۱۹). یکی از گونه های جنس افرا به نام *Ephedra alata* نیز اثربسیار خوبی را بر روی مهار رشد آسپرژیلوس و تولید آفلاتوکسین نشان داده است (۲۰، ۲۱). در پژوهشی دیگر در سال ۱۹۹۵ اثر ضد قارچ قابل توجهی از اسانس بخش هوایی *Ephedra sinica* مشاهده شد (۲۲). از این پژوهش ها و نیز مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت که گیاهان جنس افرا دارای مواد موثره ضد قارچ خوبی می باشند.

امروزه با توجه به تنوع ژنتیکی ایجاد شده در عوامل بیماری زای قارچی و پیدایش سویه های مقاوم (۲۳) و همچنین عوارض جانبی ناشی از مصرف این داروها، جایگزین کردن آنها توسط داروهای ضد قارچی با منشا گیاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به بررسی های انجام گرفته در خصوص اثر بازدارنده عصاره تام متابولی و فراکشن های آبی متابولی و کلروفرمی *Ephedra pachyclada* مشخص گردید که تمام عصاره ها و فراکشن های مورد نظر بر روی آسپرژیلوس نیجر و آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس و فوزاریوم اکسیسپوریوم بی تاثیر می باشند. پژوهش حاضر مشخص کرد که عصاره آبی و متابولی نسبت به کلروفرمی اثر مهار کنندگی بیشتری بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس دارند. این نتایج نشان می دهد که حلال قطبی حلal مناسب تری است.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از کارشناسان محترم بخش قارچ شناسی انسیستیتو پاستور ایران تشکر و قدردانی می شود

REFERENCES

- Hosseini Doust R, Saberi M, Hosseini MJ, Mohabati Mobarez A. Surveillance of current antibiotic resistance among clinical isolates *S. aureus*, *E. coli*, and *P. aeruginosa* collected from five Iranian cities. Journal of Pharmaceutical and Health Sciences 2012;1: 53- 62.
- Scheld WM, Craig WA, Hughes JM, eds. Emerging infections. Washington, D.C: ASM Press; 2001. P.229-72.
- Murray P, Rosenthal K, Phaller M, eds. Medical mycology. Translated by: Ghadjari A. Tehran: Aeej Publication; 2010. P.89-90. [In Persian]
- Teles F, Seixas J. The future of novel diagnostics in medical mycology. J Med Microbiol 2014 Nov 23. ahead of print

جدول ۱. نتایج اثر غلظت های مختلف عصاره تام متابولی، فراکشن متابولی، فراکشن آبی و فراکشن کلروفرمی گیاه *Ephedra pachyclada* بر روی کاندیدا آلبیکنس به روش دیسک دیفیوژن و مقایسه با اثر دیسک ۱۰ میکروگرم بر دیسک کتوکونازول (قطر هاله عدم رشد بر حسب میلی مترو میانگین سه مرتبه آزمایش)

عصاره	۳۱/۲۵ [*]	۶۲/۵ [*]	۲۵۰ [*]	۱۲۵ [*]	۵۰۰ [*]
عصاره تام متابولی	۱۷/۶	۱۲/۳	۱۵/۶	۱۵/۳	۱۰/۳
فراکشن متابولی	۱۹/۶	۱۷/۶	۱۵/۶	۱۴/۶	۱۱/۳
فراکشن آبی	۲۳	۲۱/۳	۱۸/۶	۱۷	۱۴/۶
فراکشن کلروفرمی	۱۶/۶	۱۱/۳	۱۴/۶	۹/۶	۸/۶

* ۱۰ µg/disk † mg/ml

جدول ۲. حداقل غلظت مهار کننده و کشنده عصاره های مختلف گیاه *Ephedra pachyclada* بر *Candida albicans* (میزان MIC و MFC بر حسب mg/ml)

فراکشن	فراکشن آبی	فراکشن	کلروفرمی	عصاره تام متابولی
۱/۲۵	۱/۲۵	۱/۲۵	۵	۲/۵
۲۰	۱۰	۲۰	MFC	

بحث

گزارش های متعددی مقاومت های دارویی را در گونه های مختلف میکروار گانیسم ها نشان می دهند. این امر اهمیت تجویز علمی داروهای ضد میکروبی و تحقیق در مورد خواص ضد میکروبی گیاهان بومی با هدف کاربردی کرن استفاده از آنها در درمان عفونت های میکروبی را نشان می دهد (۱۸). این تحقیق موثر بودن عصاره تام متابولی و فراکشن های متابولی آبی و کلروفرمی تهیه شده از بخش های هوایی گیاه بر کاندیدا آلبیکنس را نشان داد. البته با توجه به غلظت نسبتا بالای عصاره ها و فراکشن های مربوطه، قطر هاله عدم رشد در مقایسه با داروهای ضد قارچی همچون کتوکونازول زیاد نیست. ولی باید توجه داشته باشیم که گرچه این مقدار باز دارنگی از رشد قارچ به ظاهر قابل توجه نیست، ولی نتیجه اثر غلظتی از عصاره گیاه می باشد که مقدار ماده موثر آن بسیار

5. Skladny H, Buchheidt D, Baust C, Krieg Schneider F, Seifarth W, Leib Mosch C, et al. Specific detection of Aspergillus, species in blood and bronchoalveolar lavage samples of immunocompromised patient by two-step PCR. *J Clin Microbiol* 1999; 37: 3865-71.
6. Emami M, ed. Medical mycology. Tehran: Tehran University Publication; 1998. P.96-97. [In Persian]
7. Zeini F, Mahbod A, Emami M, eds. Comprehensive medical mycology. Tehran: Tehran University Publications; 1999. P.318. [In Persian]
8. Shadzi S, ed. Medical mycology. Tehran: Tehran University Publication; 2007. P.54-60. [In Persian]
9. Sullivan DJ, Moran GP, Pinjon E, Al-Mosaied A, Stokes C, Vaughan C, Coleman DC. Comparison of the epidemiology, drug resistance mechanisms, and virulence of *Candida dubliniensis* and *Candida albicans*. *FEMS Yeast Res* 2004; 4:369-76.
10. Anaissie EJ, McGinnis MR, Pfaller MA, eds. Clinical Mycology. New York: Churchill Living Stone; 2009. P.301-302.
11. Feyzi MT. Introduction of the *Stureja bakhtiarica* and its ecological characteristic in Isfahan province. Proceeding of National Iranian Congress of Medical Plants, Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences; 2002. P.179.
12. Dassanayake RS, Ellepolo AN, Samaranayake YH, Samaranayake LP. Molecular heterogeneity of fluconazole resistant and susceptible oral *Candida albicans* isolates within a single geographic locale. *APMIS* 2002; 110: 315-24.
13. Morshhauser J. The genetic basis of floconazol resistance development in *Candida albicans*. *Biochimica Biophysica Acta* 2002; 1587: 240-48.
14. Ajello L, Hay JR, eds. Topley and Wilson's microbiology and microbial infection. Vol 14. 9th ed. Oxford: Oxford University Press, Inc; 1998. P.69-275.
15. Momeni T, ed. Plants extract. Tehran: Shahid Farhad Reza publication; 2000. P.10-20. [In Persian]
16. Asadi M, ed. Flora of Iran. Tehran: Research Institute of Forests and Rangelands; 1998. P.29-30. [In Persian]
17. Zargari A, ed. Medical plants. Tehran: Tehran University Publication; 1991. P.78. [In Persian]
18. Salehi MH, ed. Medical plants and phototherapy. Tehran: Tehran university publication; 2008. P.145-49. [In Persian]
19. Samsam Shariat SH, ed. Extraction of effective compounds from medical plants. Tehran: Mani Publication; 2007. P.10-20. [In Persian]
20. Furletti V, Teixeria I, Obando-pereda G, Mardegan R. Action of *Coriandrum sativum* L, essential oil upon oral *Candida albicans* biofilm formation. *Evid Based complement Alternat Med* 2011; 17: 903-909.
21. Bagheri G, Bigdeli M. Inhibitory effects of *Ephedra major* host on *Aspergillus parasiticus* growth and aflatoxin production. *Mycopathologia* 2009;168:249-55.
22. Al-Qarawi AA, Abd-Allah EF, Hashem A. *Ephedra alata* as biologically-based strategy inhibit aflatoxiogenic seed-borne mold. *Afr J Microbial Res* 2011; 5:2297-303.
23. Guozhen Z, Ding FY, Lizhen WX. A study on antifungal activity of essential oil from *Ephedra sinica* and *Asarum heterotropoides*. *J Plant Protez* 1995; 4:4-14.