

بررسی مهار رشد سلول‌های سرطانی پستان با استفاده از پلاسمای اتمسفری سرد

آویده محمدی^۱، شیوا ایرانی^۲، سید محمد اطیابی^۳

^۱ کارشناس ارشد بیوفیزیک، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

^۲ استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

^۳ استادیار، گروه فناوری‌های نوین، بخش پایلوت بیوتکنولوژی، انتستیتو پاستور ایران، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: سرطان پستان شایع‌ترین سرطان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در میان زنان است. با توجه به عوارض جانبی درمان‌های رایج، محققان به دنبال یافتن روش‌هایی با کمترین عوارض و بالاترین میزان مرگ در این سلول‌ها هستند، بدون آنکه آسیبی به سلول‌های سالم برسانند. بر این اساس از اثر پلاسمای اتمسفری سرد بر روی سلول‌های سرطانی پستان رده MCF-7 استفاده شد. در این روش از امواج الکترومغناطیس برای مهار رشد سلول‌های سرطانی استفاده می‌شود. هدف از این تحقیق، بررسی مهار رشد سلول‌های سرطانی پستان با استفاده از پلاسما جت اتمسفری سرد بود.

روش بررسی: در این پژوهش، از ترکیب گاز هلیوم و اکسیژن برای ایجاد پلاسما در دمای اطاق به صورت تابش نقطه‌ای برای درمان سلول‌های سرطانی پستان (MCF-7) در زمان‌های ۳۰، ۴۵ و ۶۰ ثانیه استفاده شد و با استفاده از تست MTT درصد زنده ماندن سلول‌های تیمار شده بررسی شد. داده‌ها با نرم افزار SPSS و روش آماری One Way ANOVA تحلیل شد.

یافته‌ها: درصد زنده ماندن سلول‌های سرطانی درمان شده با پلاسما جت اتمسفری سرد به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به سلول‌های سرطانی درمان نشده با پلاسما کاهش یافت و زمان بهینه برای سلول‌های سرطانی ۴۵ ثانیه گزارش شد.

نتیجه‌گیری: استفاده از پلاسما جت اتمسفری سرد می‌تواند روش درمانی مناسبی برای سلول‌های سرطانی پستان به شمار آید.

واژگان کلیدی: سرطان پستان، سلول MCF-7، پلاسما جت، پلاسمای سرد.

مقدمه

میان بیش از ۱۳۰۰ بیمار در هر سال جان خود را از دست می‌دهند (۳). این شیوع بالا مهم‌ترین علت بررسی راه‌های متفاوت درمان این بیماری است. درمان‌های رایج شامل جراحی، هورمون درمانی، رادیوتراپی و شیمی درمانی است که صرف نظر از عوارض جانبی، مهمترین نقص آن، عملکرد غیرانتخابی این روش‌هاست، زیرا علاوه بر سلول‌های سرطانی، سلول‌های سالم را نیز مورد هدف قرار می‌دهند (۴). بهترین روش القای مرگ سلولی در سلول‌های سرطانی، استفاده از روش انتخابی است که بالاترین میزان مرگ را در سلول‌های سرطانی القا کند.

پلاسما یک گاز شبه خنثی است که تقریباً ۹۹٪ جهان را تشکیل می‌دهد. پلاسما حالتی از ماده است (حالت چهارم ماده) که در دمای بسیار بالا به وجود می‌آید و در این وضعیت

سرطان پستان شایع‌ترین نوع سرطان در میان زنان ساکن در کشورهای توسعه یافته است که متأسفانه ۱۲٪ از سرطان‌های پستان در سنین ۲۰ تا ۳۴ سالگی رخ می‌دهند (۱). سرطان پستان، بعد از سرطان ریه، شایع‌ترین سرطان در میان هر دو جنس در ایران است (۲). سرطان پستان شایع‌ترین بدخیمی در میان زنان ایرانی است و پنجمین عامل منجر به مرگ در میان سایر بدخیمی‌هاست. سالانه هشت هزار و نود مورد جدید مبتلا به سرطان پستان شناخته می‌شوند که از این

آدرس نویسنده مسئول: تهران، انتستیتو پاستور ایران، بخش پایلوت بیوتکنولوژی دکتر سید محمد اطیابی

(email: mohammadatyabi@yahoo.com)

تاریخ دریافت مقاله: ۹۳/۱۰/۹

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۴/۱/۱۷

جت با سلول‌ها و بافت‌های زنده بدن موجب می‌شود که در روندهایی نظیر استریلیزاسیون، درمان زخم (۹، ۱۰)، انعقاد خون و سفید کردن دندان‌ها کاربرد پیدا کند. در سال ۲۰۱۰، کیم و همکارانش اثر پلاسماهای غیر حرارتی را بر روی سلول‌های سرطانی مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که این نوع پلاسما اثرات ضد تکثیری و القای آپوپتوز بر روی سلول‌های سرطانی دارد.

در این پژوهش، هدف بررسی تاثیر درمانی پلاسمای اتمسفری سرد بر روی سلول‌های MCF-7 می‌باشد از ترکیب گازهای هلیوم و اکسیژن در شارش زمان‌های مختلف بود.

مواد و روشها

دستگاه پلاسمای مورد استفاده در پژوهش حاضر پلاسما جت اتمسفری سرد بود که از جمله مزایای آن کاربری آسان، قیمت اقتصادی مناسب، سرعت بالا و باریک بودن نازل بود، به طوری که شارش سوزنی آن امکان دسترسی پلاسما به کل فضای چاهک را ایجاد می‌کرد.

برای ایجاد پلاسمای سرد، از گاز سبک هلیوم با خلوص ۹۹/۹۹ درصد استفاده شد. برای اینکه گاز هلیوم به صورت کامل یونیز گردد، درصدی گاز اکسیژن به آن اضافه شد تا مخلوط گاز هلیوم٪ ۹۵ و اکسیژن٪ ۵ وارد نازل دستگاه و بر اثر ایجاد میدان الکتریکی به پلاسما تبدیل شود. برای ایجاد میدان الکتریکی از یک منبع تغذیه با ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت شهری و خروجی ۱۳ کیلوولت پیک تو پیک استفاده گردید. ایجاد میدان الکتریکی در نازل دستگاه اتفاق افتاد. مخلوط گاز با فشار ۰/۷ لیتر در ساعت وارد نازل دستگاه شد و در مجاورت سیم پیچ درون لوله پیرکس که ایجاد میدان می‌نمود، به پلاسما تبدیل و از لوله پیرکس به طول دو سانت به رنگ پرنگ پر رنگ خارج گردید (شکل ۲).

سلول‌های سرطانی پستان رده MCF-7 از بانک سلولی انسنتیتو پاستور ایران تهیه و در محیط کشت DMEM و FBS ۱۰% در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و ۵٪ CO_2 نگهداری شدند. محیط کشت هر ۴۸ ساعت تعویض گردید و کشت ادامه داده شد تا سلول‌ها به تراکم٪ ۸۰ در هر فلاسک رسیدند.


بعد از رسیدن سلول‌ها به تراکم مطلوب، تعداد 1×10^4 سلول به هر چاهک پلیت ۹۶ خانه ای منتقل شد و در محیط کشت مناسب به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شد. سپس به مدت ۱۵، ۳۰ و ۴۵ ثانیه سلول‌ها تحت تابش پلاسمای اکسیژن و هلیوم قرار گرفتند. برای هر مدت حداقل سه بار تکرار در نظر گرفته شد

ساختر مولکولی خود را از دست می‌دهد. پلاسما گازی است یونیزه شامل فوتون‌ها، الکترون‌ها، یون‌های مثبت و منفی، اتمها، رادیکال‌های آزاد و مولکول‌های برانگیخته و غیربرانگیخته که دائم در حال برهم کنش با یکدیگر هستند (۵).

پلاسما انواع گوناگونی شامل پلاسمای داغ، گرم و پلاسمای سرد دارد. بیشتر پلاسماهای از نوع داغ و درحدود چهار هزار درجه سانتی گراد هستند، که فقط مصرف صنعتی دارد. پلاسمای سرد یا غیر حرارتی نوعی پلاسمای تولید شده با تخلیه الکتریکی است. دمای پایین این نوع پلاسما، وجود گونه‌های فعال، ماهیت غیرتعادلی و عدم نیاز به رآکتورهای خلا بزرگ باعث شده که در فعالیت‌های زیستی و پژوهشی به این نوع پلاسما توجه ویژه شود. ازانواع پلاسماهای غیرحرارتی اتمسفری می‌توان به کرونا، میکروهالو کاتد، پلاسما جت‌های فشار اتمسفری، تخلیه الکتریکی قوس‌های خزندۀ، تخلیه الکتریکی سد دی الکتریک و سوزن‌های پلاسما اشاره کرد (۸).

در میان انواع روش‌های تولید پلاسمای سرد در زیست پژوهشی، پلاسما جت بسیار مورد توجه قرار گرفته که به دلیل قابل حمل بودن، توانایی شارش نقطه‌ای و مصرف پایین انرژی است (شکل ۱). پلاسمای خروجی از نازل دستگاه پلاسما جت مستقیماً به سمت هدف شارش می‌کند. میزان شارش نیز به وسیله جریان و فشار گاز قابل کنترل و تغییر است و می‌تواند دوز خاصی را به منطقه خاصی از بدن انتقال دهد، و بدون نیاز به محافظت دی الکتریک بر روی الکترودها و سیم‌ها عمل کند.

پلاسما جت‌ها شامل دو الکترود متحوالمرکز هستند که در میان آنها مخلوطی از گازها جریان دارند. در شکل ۱ دستگاه پلاسما جت نمایش داده است.



شکل ۱. دستگاه پلاسما جت

پلاسما جت اتمسفری به دلیل داشتن دمای پایین در حد دمای اطاق کاربردهای پژوهشی متفاوتی دارد. تعامل پلاسما

وسیله دستگاه ELISA reader (مدل بیوتک) سنجیده شد. نتایج حاصله توسط نرم افزار آماری SPSS و روش آماری آنالیز واریانس (ANOVA)، در سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ تحلیل شد.

و یک چاهک هم با سه بار تکرار بدون درمان با پلاسمما به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. سلول‌های تحت درمان با پلاسمما به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شدند و بعد از آن تست MTT روی آنها انجام شد.

یافته‌ها

بررسی مورفولوژی سلول‌های درمان شده با پلاسمما
بررسی مورفولوژیک سلول‌های کشت داده شده در محیط کشت اختصاصی، و سلول‌های تکثیر یافته قبل و بعد از قرارگیری در معرض شارش پلاسمما توسط میکروسکوپ معکوس از نظر مورفولوژی بررسی شد.

سلول‌ها در مدت ۱۵ ثانیه درمان با پلاسمما، تنها تحت استرس بودند و در زمان ۳۰ ثانیه کاهش قابل ملاحظه‌ای در تعداد سلول‌ها به چشم خورد و بیانگر جدا شدن سلول‌ها از سطح پلیت بود. در زمان ۴۵ ثانیه، بیشترین میزان جدا شدن سلول‌ها از سطح و هم چنین از دست رفتن ارتباطات بین سلولی در چاهک مشاهده شد. براین اساس، زمان ۴۵ ثانیه مناسب‌ترین زمان قرارگیری سلول‌ها در معرض تابش پلاسمما با استفاده از مشاهدات حاصل از میکروسکوپ معکوس بود (شکل ۳).

بررسی درصد زنده ماندن سلول‌های درمان شده با پلاسمما

به منظور بررسی تاثیر پلاسممای اتمسفری سرد بر روی سلول‌های سرطانی MCF-7 از روش MTT استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش زمان اعمال پلاسمما، درصد زنده ماندن سلول‌ها به طور معنی‌داری کاهش می‌یابد. هم چنین، این درصد بین سلول‌های درمان شده و سلول‌های سرطانی که درمان نشده بودند، معنی‌دار بود. در درمان به مدت ۴۵ ثانیه با پلاسمما جت سرد، کمترین میزان سلول‌های زنده مشاهده شد (شکل ۴). همان طور که در شکل ۴ مشاهده می‌شود، همه سلول‌ها از سطح جدا شده و علامت چروکیدگی در آنها ظاهر شده است که نشانه مرگ سلولی است، در حالی که سلول‌هایی که با پلاسمما تیمار نشده‌اند و در این تحقیق بعنوان کنترل در نظر گرفته شده‌اند، کاملاً ارتباط سلول – سطح و سلول – سلول حفظ شده است.


ارتباط معنی‌داری بین گروه شاهد و نمونه تحت تیمار در ۳۰ ثانیه مشاهده شد که با علامت^{*} نمایش داده شده است. به علاوه، ارتباط معنی‌داری بین گروه شاهد و نمونه تحت تیمار در ۴۵ ثانیه مشاهده شد که با حرف a نمایش داده شده است (نمودار ۱).



شکل ۲. چینش دستگاه پلاسمما جت اتمسفری سرد استفاده شده در این مطالعه


بررسی درصد زنده ماندن سلول‌های درمان شده با پلاسمما و سلول‌های کنترل، با استفاده از روش MTT (tetrazolium ۴,5-dimethylthiazol-2-yl]-bromide diphenyl) شد. در این روش، رنگ زرد تترازولیوم محلول در آب توسط سوکسینات دهیدروژناز میتوکندری سلول‌های زنده و فعال، احیاء و به ترکیب رنگی فرومازان نامحلول تبدیل می‌شود. این رنگ با حلآلی حل شده و شدت رنگ در طول موج ۵۷۰ نانومتر مناسب با میزان سلول‌های زنده، سنجیده می‌شود.

بر این اساس، ۱۰ µL محلول MTT و ۹۰ µL میکرولیتر محیط کشت کامل (۱۰٪ FBS، ۱٪ آنتی‌بیوتیک) به هر چاهک پلیت ۹۶ خانه‌ای افروده شد. سپس پلیت در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴ ساعت انکوبه شد. سپس محیط کشت خارج شده و ۱۰ µL محلول دی متیل سولفوکساید(DMSO) به هر چاهک افزوده شد. جذب نوری در طول موج ۵۷۰ nm به



شکل ۳. تصاویر حاصل از میکروسکوپ معکوس سلول های MCF-7 تحت تاثیر پلاسمای اتمسفری سرد. A: نمونه شاهد، یعنی سلول هایی که تحت درمان با پلاسما قرار نگرفتند، B: درمان با پلاسما به مدت ۱۵ ثانیه، C: درمان با پلاسما به مدت ۳۰ ثانیه، D: درمان با پلاسما به مدت ۴۵ ثانیه.

هستند و در کلیه این موارد درمانی سلول های سالم نیز مانند سلول های سرطانی تحت تاثیر قرار می گیرند.



نمودار ۱. نمودار تست MTT حاصل از قرار گرفتن سلول های MCF-7 تحت تاثیر پلاسمای اتمسفری سرد در زمان های ۱۵، ۳۰ و ۴۵ ثانیه.



شکل ۴. جدا شدن سلول ها از سطح پلیت بر اثر تیمار با شارش پلاسما جت سرد در زمان ۴۵ ثانیه

بحث

سرطان یکی از بزرگترین مشکلات بهداشت و درمان در ایران و جهان است و سرطان پستان شایع ترین سرطان و دومین عامل مرگ و میر در میان زنان در ایران و جهان است. درمان های رایج شامل جراحی، رادیوتراپی، شیمی درمانی و هورمون درمانی است که همگی دارای عوارض جانبی متعددی

روش فلوراسیوتومتری و رنگ فلورسانس مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که پلاسمای هلیوم به همراه گاز اکسیژن بسیار موثر بوده و روشی نوید بخش در درمان سرطان پستان می تواند باشد. کیم و همکارانش، اثر پلاسماهای غیر حرارتی را بر روی ۳ رده سلولی SW 480، LoVo و HTC-116 در سرطان کولورکتال مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که این نوع پلاسما اثرات ضد تکثیری و القاء آپوپتوز بر روی این رده ها دارد، در سلول های تحت تیمار با پلاسما کاهاش در فعالیت های تهاجمی مشاهده شد و فسفریلایسیون بتا کاتئنین افزایش یافت، البته با توجه به این مطلب که تجزیه بتاکاتئنین در فعالیت های ضد تکثیری پلاسما نقش دارد (۱۶). با توجه به مطالعات ذکر شده، این تحقیق در تاثیر پلاسما اتمسفری سرد بر روی سلول های MCF-7 مورد بررسی قرار گرفت. پلاسما حالتی از ماده است (حالت چهارم ماده) که در دمای بسیار بالا به وجود می آید و در این وضعیت ساختار مولکولی مفهوم خودرا از دست می دهد. در حالت پلاسما، اتم ها و ذرات زیراتومی مانند الکترون، نوترون و پروتون آزادانه در محیط حرکت کرده و تغییر موقعیت می دهند. پلاسما انواع گوناگون دارد: پلاسماهای سرد، گرم و داغ، بیشتر پلاسماهای در فشار معمولی داغ هستند (در حدود چندین هزار درجه سانتی گراد)، بنابراین انتقال آنها مشکل است. اما پلاسماهای سرد در دمای آزمایشگاه به کمک یک استوانه که به پمپ تخلیه وصل شده است، ایجاد می شود که برای تولید آن از گازهای نجیب مانند آرگون، هلیوم، نئون و کریپتون استفاده می شود. دمای پایین این نوع پلاسما، وجود گونه های فعال، ماهیت غیر تعادلی آن و عدم نیاز به رآکتورهای خلا بزرگ باعث شد که در فعالیت های زیستی و پزشکی به این نوع پلاسما توجه بسیاری شود. از کاربردهای پلاسماهای غیر حرارتی می توان به اثر درمانی پلاسما سرد بر روی بیماری سرطان اشاره کرد (۱۷).

مکانیسم عملکرد پلاسما هنوز به درستی مشخص نشده، اما بیشتر محققان این نحوه عملکرد را به مواد تشکیل دهنده پلاسما مانند پراکسید هیدروژن، رادیکال های هیدروکسیل، آئیون های سوپر اکسید، اکسیژن تک تایه، نیتریک اکسید و پراکسی نیتریک، رادیکال های پراکسیل، الکتوکسیل و گونه های فعال اکسیژن مرتبه دانسته اند و نقش گونه های فعال اکسیژن (ROS) را پر رنگ تر دانسته اند. هر یک از این مواد با اثر بر روی غشا و DNA باعث مرگ سلول های سرطانی می گرددند. ROS هم می تواند منجر به تکثیر و هم می تواند باعث مرگ شود، ولی هنوز مکانیزم آن معلوم نیست. در شرایط عادی، ROS تولید شده توسط آنتی اکسیدان هایی مثل

در سال های اخیر رویکردهای نوینی برای درمان سرطان پیشنهاد شده و به کار برده شده که از این میان می توان عملکرد انتخابی به پلاسمای اتمسفری سرد اشاره کرد که عملکرد مناسب و تقریباً انتخابی دارد و هیچ نوع آثار تحریب بر روی بافت سالم ندارد. براساس مطالعات صورت گرفته، پلاسما قادر به مهار رشد سلول های سرطانی می باشد. استافل و همکارانش در سال ۲۰۰۳ تحقیقاتی بر روی سوزن پلاسما انجام دادند و آن را بر روی سلول های سرطانی به کار برده و جدا شدگی سلول ها را مشاهده کردند (۱۲). فریدمن و همکارانش در سال ۲۰۰۷ به کمک FE-DBDs (تخلیه سد دی الکتریک) در هوای آپوپتوز سلول های ملانومای پوست را مشاهده کردند (۱۳). Floating-electrode DBD عمل می کند که یکی از الکترودها، دی الکتریکی است که از قدرت الکتروود حفاظت می کند و دیگری الکتروود را فعال می کند که می تواند پوست انسان، حیوان یا اندام خارج از بدن یا سطح پوست باشد که تخلیه در آن صورت می گیرد. فریدمن و همکارانش از این روش برای القای آپوپتوز در سلول های ملانومای پوست استفاده کردند. قطعه قطعه شدن DNA پس از ۳۰ ثانیه در معرض شارش پلاسما قرار گرفتن، ایجاد می شود. افزایش gamma-H2A.X، ۳ ساعت بعد از تیمار نشان داد که آسیب های DNA مثل شکست دو رشته ای DNA ایجاد شده است و همچنین شکست caspase3 به طور واضح مشاهده شد. همچنین وقتی سلول های تحت تیمار با پلاسما قرار گرفتند، اجتماع P53 نیز مشاهده شد که یک زن مهار کننده توموری است و یک مثال معمول برای حسگرهای مولکولی در پاسخ به DNA است (۱۴). در سال ۲۰۱۱ کیم و همکارانش تاثیر القای آپوپتوز به وسیله میکروپلاسماجت انعطاف پذیر مجهر ز به فیبر نوری را بر روی سلول های کارسینومای ریه بررسی کردند. علی رغم قطر کوچک داخلی و سرعت آهسته جریان گاز، پلاسما جت های تولید شده به طور قابل ملاحظه ای در القاء آپوپتوز موثر عمل کردند و در بررسی کشت کارسینومای موشی و سلول های فیربولاستی هیچ نوع نکروزی مشاهده نشد. این تلاش ها درمان سرطان را به وسیله این نوع پلاسماهای فیبر نوری امکان پذیر می کند و امکان استفاده از آندوسکوپی میکروپلاسما را افزایش می دهد (۱۵). کیم و همکارانش در سال ۲۰۱۰، پلاسماهای غیر حرارتی با پالس DC با قدرت ددها کیلو هرتز را بر روی سلول های MCF-7 در سرطان پستان مورد استفاده قرار دادند. در پژوهش کیم و همکارانش، ولتاژ بالا از سیم تنگستن عبور داده شد و جریان گاز ۰/۱ لیتر بر دقیقه بود. مرگ سلولی با

حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ میکرومولار موجب توقف رشد سلولی می‌شود و افزایش مقاومت به پراکسید هیدروژن را مشخص می‌کند، در حالی که غلظت‌های بالای پراکسید هیدروژن اثر سمی شدیدی بر روی سلول‌ها دارد. رابینسون و همکارانش کشف کردند که اگر سلول‌ها با پراکسید هیدروژن تیمار شوند، مسمومیت در برابر پراکسید هیدروژن کاهش می‌یابد؛ این سازش احتمالاً به این دلیل است که تیمار سلول‌ها با پراکسید هیدروژن، باعث بیان بالای در آنتی اکسیدان‌ها مثل کاتالاز یا گلوتاتیون‌ها پروکسیدازها می‌شود (۲۲).

با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان اظهار داشت که کاهش درصد فعالیت متابولیکی سلول‌های درمان شده با پلاسمای می‌تواند در ارتباط با ایجاد ROS در سلول‌ها باشد و با افزایش مدت زمان قرار گیری سلول‌های MCF-7 در معرض پلاسمای اتمسفری سرد، میزان ROS تولید شده نیز افزایش می‌یابد که منجر به کاهش رشد سلول‌های سرطانی می‌شود. بنابراین، استفاده از پلاسمای جت اتمسفری سرد می‌تواند جایگزین مناسبی نسبت به دیگر روش‌های درمانی برای سرطان سینه باشد.

تشکر و قدردانی

مجریان پژوهش از کلیه عزیزانی که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند، به ویژه آقایان دکتر محمود قرآن نویس، فرهاد شهگلی و شهریار میرپور، کمال تشکر و قدردانی می‌کنند.

REFERENCES

- Hickey M, Peate M, Saunders CM, Friedlander M. Breast cancer in young women and its impact on reproductive function. *Hum Reprod Update* 2009; 15:323-39.
- Nafissi N, Saghafinia M, Kalantar Motamed M, Akbari ME. A survey of breast cancer knowledge and attitude in Iranian women. *J Cancer Res Ther* 2012; 8: 46-49.
- Akbari ME, Khayamzadeh M, Khoshnevis SJ, Nafisi N, Akbari A. Five and ten years survival in breast cancer patient's mastectomies vs. breast conserving surgeries personal experience. *Iran J Cancer Prev* 2008; 1:53-56.
- Lowe SW, and Lin AW. Apoptosis in cancer. *Carcinogenesis* 2000; 21: 485-95.
- Nehra V, Kumar A, Dwivedi H. Atmospheric non-thermal plasma sources. *International Journal of Engineering* 2008; 2: 53-68.
- Compton KT, Langmuir I. Electrical discharges in gases part I. Survey of fundamental processes. *Reviews of Modern Physics* 1930; 2: 123-242.
- Ahn H, Kim K, Moon E, Yang S, Lee J. Atmospheric pressure plasma jet induces apoptosis mitochondria via generation of free radicals. *PLOS one* 2011; 6: 2815-19.
- Radetic M, Jocic D, Jovancic P, Trajkovic R, Petrovic Z LJ. The effect of low-temperature plasma pretreatment on wool printing. *Textile Chem Col* 2000; 32: 55-60.
- Fridman G, Peddinghaus M, Balasubramanian M, Ayan H, Fridman A, Gutsol A, et al. Blood coagulation and living tissue sterilization by floating-electrode dielectric barrier discharge in air. *Plasma Chemistry and Plasma Processing* 2006; 26:425-42.

و بیتامین‌های C و E، گلوتاتیون و آنزیم‌هایی مثل سوپراکسید، دسموتاز، پراکسیداز و کاتالاز کنترل می‌شود. (۱۸) در حالت عدم تعادل سلولی که سطح اکسیدان از آنتی اکسیدان بیشتر شود، باعث آسیب هسته، DNA، میتوکندری، پروتئین‌ها و چربی‌ها می‌شوند. اگر این آسیب‌ها قابل جبران نباشند، مرگ سلولی اتفاق می‌افتد.

انواع ROS‌ها واکنش پذیری شیمیایی متفاوتی دارند. استرس اکسیداتیو یکی از نمونه‌های آن است که در نتیجه افزایش بیش از حد تولید رادیکال‌های آزاد و ROS یا کاهش عوامل آنتی اکسیدان ایجاد می‌گردد. در حقیقت، عدم تعادل بین تولید رادیکال‌های آزاد و مواد پراکسیدان از یک سو و سیستم‌های دفاع آنتی اکسیدانی از سوی دیگر منجر به بروز استرس اکسیداتیو می‌گردد (۱۹). در حال حاضر، حضور ROS در غلظت‌های پایین در پیام‌های داخلی سلول به اثبات رسیده است (۲۰).

تنها سلول‌های خاصی قادر به تولید ROS و استرس‌های اکسیداسیونی برای تحریک تکثیر سلولی هستند که به غلظت ROS درون سلولی واپسخ است. در برخی موارد، ROS باعث تکثیر سلولی می‌گردد که شواهد حاکی از این است که به بیان تغییر یافته ژن‌های واپسخ به رشد ارتباط دارد (۲۱).

داویس و همکارانش گزارش کرده‌اند که طابق زودگر با استرس اکسیداتیو پراکسید هیدروژن در غلظت‌های پایین حدود ۳ تا ۱۵ میکرومولار، رشد سلولی را ۴۰ تا ۲۵ درصد تحریک می‌کند، در حالی که غلظت پراکسید هیدروژن از

10. Topala I, Nastuta A. Helium atmospheric pressure plasma jet: Diagnostics and application for burned wounds healing. *Chemistry and Biology* 2012; 335-45.
11. Kim S, Chung TH, Bae SH, Leem SH. Induction of apoptosis in human breast cancer cells by a pulsed atmospheric pressure plasma jet. *Appl Physics Lett* 2010; 97:1.
12. Stoffels E, Kieft I, Sladek R. Superficial treatment of mammalian cells using plasma needle. *Journal of Physics D: Applied Physics* 2003; 36: 2908-13.
13. Kim J, Kruhalak M, Dotiwala F, Nassen Zweig A, Habar JE. Heterochromatin is revactory to γ -H2AX modification in yeast and mammals. *J Cell Biol* 2007; 178: 209-18.
14. Kim JY, Foy P, Hawkins TH, Wei Y, Jinhua L, Kim SO. Apoptosis of lung carcinoma cells induced by a flexible optical fiberbased cold microplasma. *Biosensors and Bioelectronics* 2011; 28.
15. Lu AG, Feng H, Wang PX, Ham DP, Chen XH, Zheng MH. Emerging roles of the ribonucleotidereductase M2 in colorectal cancer and ultraviolet-induced DNA damage repair. *World J Gasteroentrol* 2012; 18: 4704-13.
16. Fridman G, Shereshevsky A, Jost MM, Brooks AD, Fridman A, Gutsol A, et al. Floating electrode dielectric barrier discharge plasma in air promoting apoptotic. Behavior in melanoma skin cancer cell lines. *Plasma Chemistry and Plasma Processing* 2007; 27: 163-76.
17. Rao MV, Davis KR. The physiology of ozone induced cell death. *Planta* 2001; 213: 682-90.
18. Kohen R. Skin antioxidants: their role in aging and in oxidative stress--new approaches for their evaluation. *Biomed Pharmacother* 1999; 53: 181-92.
19. Bhalla DK. Ozone- induced lung inflammation and mucosal barrier disruption: toxicology, mechanisms and implications. *J Toxicol Environ Health B Crit Rev* 1999; 2: 31-86
20. Hawkins CL, Brown BE, Davies MJ. Hypochloride- and hypobromide-mediated radical formation and its role in cell lysis. *Arch Biochem Biophys* 2001; 395: 137-45.
21. Robinson JM, Ohira T, Badwey JA. Regulation of the NADPH-oxidase complex of phagocytic leukocytes. Recent insights from structural biology, molecular genetics, and microscopy. *Histochem Cell Biol* 2004; 122: 293-304.