


التهاب السحايا بالمكورات السحائية

معلومات للتجمعات الحاشدة

مصدر
العدوى



التهاب السحايا بالمكورات السحائية أحد الأشكال الجرثومية للتهاب السحائي. وهو عدوى خطيرة تصيب البطانة الرقيقة التي تحيط بالمخ والحبل الشوكي. وقد يتسبب في ضرر دماغي شديد، بل يؤدي إلى الوفاة في 50% من الحالات إذا لم يُعالج. ويمكن أيضًا أن يُسفر عن أوبئة واسعة النطاق.

أنواع التعرُّض والوقاية

ينتقل التهاب السحايا من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ الذي يخرج من أنف الشخص المصاب وفمه عند السعال أو العطس أو التحدُّث. ويحدث ذلك بالأخص عند مخالطة أشخاص مصابين مخالطة وثيقة لمدة طويلة، وكذلك في التجمعات الحاشدة.

سبل الوقاية:


ارتداء كمادات خلال التجمعات الحاشدة لتجنب انتقال العدوى عن طريق الجهاز التنفسي.



تناول مضادات حيوية عندما يصفها لك الطبيب. فالمضادات الحيوية يمكن أن تقلل من انتقال العدوى بين المخالطين عن قرب، إذا ما جرى تناولها على وجه السرعة. ويجب إعطاء سيبروفلوكساسين أو سيفترياكسون بديلًا لذلك.



الحصول على التطعيم، خصوصًا قبل حضور التجمعات الحاشدة، مثل الحج والعمرة.



الأعراض

أكثر أعراض التهاب السحايا شيوعًا هي:



تقيؤ



صداع



تشوش الذهن



الحساسية للضوء



حمى شديدة



رقبة متيبسة

اطلب المشورة الطبية، وابدأ فورًا في تناول ما يصفه لك الطبيب من علاج. فالعلاج المبكر بالمضادات الحيوية له أهمية بالغة في إنقاذ الأرواح والحد من المضاعفات.



الإجراءات الواجب اتخاذها
في حالة ظهور الأعراض: