



التهاب السحايا بالمكورات السحائية

معلومات للنازحين داخليًا

مصدر
العدوى

التهاب السحايا بالمكورات السحائية أحد الأشكال الجرثومية للالتهاب السحائي. وهو عدوى خطيرة تصيب البطانة الرقيقة التي تحيط بالمخ والنخاع الشوكي. وقد يتسبب في ضرر دماغي شديد، بل يؤدي إلى الوفاة في 50% من الحالات إذا لم يُعالج. ويمكن أيضًا أن يُسفر عن أوبئة واسعة النطاق.

أنواع التعرُّض والوقاية



ينتقل التهاب السحايا من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ الذي يخرج من أنف الشخص المصاب وفمه عند السعال أو العطس أو التحدُّث. ويمكن أن ينتشر التهاب السحايا (بالمكورات السحائية) انتشارًا سريعًا بالرذاذ التنفسي في المخيمات والمجتمعات المؤقتة للنازحين داخليًا.


سبل الوقاية:



تجنب التدخين




ارتداء كمامات لتجنب انتقال العدوى عن طريق الجهاز التنفسي، وخاصة في حالة الإبلاغ عن وجود حالات



تجنب المخالطة الوثيقة لكل شخص تظهر عليه الأعراض (ويشمل ذلك تجنب التقبيل أو العطس أو السعال)



إبلاغ الطبيب في حالة الاشتباه في ظهور الأعراض على أحد الأفراد



الحصول على اللقاح

الأعراض



تقيؤ



صداع



تشوش الذهن



الحساسية للضوء



حمى شديدة



زقبة مُتَيْبِّسَة

اطلب المشورة الطبية فورًا. وفي المخيمات، تجنب التعامل مع الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض.



الإجراءات الواجب اتخاذها
في حالة ظهور الأعراض: