

# داء الكلب

معلومات للجمهور العام



**مصدر العدوى**  
ينتقل داء الكلب بعضة حيوان مصاب أو عن طريق لعابه (مرض حيواني المصدر).

## انتقال المرض وسبل الوقاية

ينتقل المرض بالعضات أو اللدغات أو الخدوش أو عندما يلامس لعاب حيوان مصاب الأغشية المخاطية (أي العينين أو الأنف أو الفم) أو الجروح ملامسة مباشرة.

سبل الوقاية:

- تلقي التطعيم قبل التعرض لمصدر المرض؛
- الحد من التعرض للحيوانات والكلاب البرية؛
- تطعيم الحيوانات الأليفة المنزلية (مثل الكلاب والقطط والقوارض).

الكلاب مصدر

**95%**

من حالات الإصابة بالمرض بين البشر.



وثمة أنواع أخرى يمكن أن تسبب داء الكلب، منها:



القيوط

الثعالب

الظربان

الراكون

الخفافيش

## الأعراض



زُهاب الماء.

قُرب إفراز اللعاب، وصعوبة البلع؛

شلل طفيف أو جزئي، وهلوسات؛

أما بعد مرور ما بين شهر إلى 3 أشهر، فإن الأعراض تظهر، وهي حمى مصحوبة بألم ووخز غير عادي، أو تنميل، أو إحساس بالحرقنة (مَذل) في موضع الجرح؛

لا تظهر أعراض لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر بعد العدوى (تختلف فترة الحضانة).

إذا تعرضت للعض من حيوان يُشتبه بأنه مسعور، فاطلب الرعاية الطبية فوراً؛ واحصل على العلاج الوقائي بعد التعرض الذي تشمل تلقي لقاح. لا تنتظر أبداً إلى حين ظهور الأعراض، لأنه ما إن تظهر الأعراض، فلا يوجد علاج.



الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة ظهور الأعراض: